SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

1ª EDIÇÃO

GUIA FARMACOTERAPÊUTICO

DAS UNIDADES DE FARMÁCIA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA
PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

GUIA FARMACOTERAPÊUTICO DAS UNIDADES DE FARMÁCIA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2016 - 2017
PRIMEIRA EDIÇÃO

CONSELHO ADMINISTRATIVO SPDM

Presidente
Ronaldo Ramos Laranjeira

Vice Presidente
Gaspar de Jesus Lopes Filho

Conselheiros
Clóvis Ryuichi Nakaie
Beatriz Amaral de Castilho
Denise de Freitas
Heimar de Fátima Marin
Walter José Gomes

Instituições Afiliadas da SPDM
Dr. Nacime Salomão Mansur
Superintendente das Instituições Afiliadas da SPDM

ELABORAÇÃO

Coordenadores da Equipe Técnica de elaboração

Dr. Nacime Salomão Mansur
Superintendente das Instituições Afiliadas da SPDM

Sra. Maria Alice Ferreira Lopes
Coordenadora Administrativa das Instituições Afiliadas da SPDM

Dr. Luiz Fernando Haigag Djabraian
Diretor Técnico das Unidades de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

Dra. Graziella Coppo
Gerente de Farmácia das Unidades de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

Dra. Aline Pierobon
Gerente Técnica Administrativa das Unidades de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

Dra. Taiz Jacob Tuasca e Dr. André Meiji Kajiwara
Coordenadores Técnicos Administrativos das Unidades de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

Equipe Técnica Local de elaboração

Comissão Geral de Atenção Farmacêutica das Unidades de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

Comissão Local de Atenção Farmacêutica da Unidade de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
AME Maria Zélia

Comissão Local de Atenção Farmacêutica da Unidade de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
NGA Várzea do Carmo

Comissão Local de Atenção Farmacêutica da Unidade de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
Campinas

Comissão Local de Atenção Farmacêutica da Unidade de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
Guarulhos

Comissão Local de Atenção Farmacêutica da Unidade de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
Vila Mariana

LISTA DE ABREVIATURAS

AAS – Ácido Acetil Salicílico
ADH – Hormônio Antidiurético
AE – Ambulatório de Especialidades
AINE – Anti-inflamatório Não Esteroidal
ALT – Alaninoaminotransferase
AMA – Assistência Médica Ambulatorial
AME – Ambulatório Médico de Especialidades
ANS – Agência Nacional de Saúde
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ART – Artigo
AV – Avenida
AVC – Acidente Vascular Cerebral
CAPS – Centro de Atenção Psicossocial
CEAF – Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
CEL – Coronel
CEP – Código de Endereçamento Postal
CF – Comissão de Farmacologia
CID – Código Internacional de Doença
CK – Creatinoquinase
CODES – Coordenadoria de Demandas Estratégicas do Sistema Único de Saúde
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente
CPK – Creatinofosfoquinase
CRT – Centro de Referência e Treinamento
CS – Centro de Saúde
DNA – Ácido Desoxirribonucleico
DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
DRS – Departamento Regional de Saúde
DST – Doença Sexualmente Transmissível

ECA – Enzima Conversora de Angiotensina
ECG – Eletrocardiograma
EEG – Eletroencefalograma
FAC – Farmácia de Alto Custo
FC – Fibrose Cística
FNT – Fator de Necrose Tumoral
G – Grama
GI – Gastrointestinal
GT – Glutamiltranspeptidase
GM – Gabinete do Ministério
HDL – Lipoproteína de Alta Densidade
HMG – Hemoglobina
HSP – Hospital São Paulo
ICC – Insuficiência Cardíaca Congestiva
IMAO – Inibidor da Monoamino Oxidase
ITU – Infecção do Trato Urinário
IV – Intravenoso
Kg – Quilograma
LDH – Lactato Desidrogenase
LDL – Lipoproteína de Baixa Densidade
LME – Laudo de Medicamentos Excepcionais
MAO – Monoamina Oxidase
Mcg – Micrograma
Mg – Miligrama
mL – Mililitro
MS – Ministério da Saúde
NEL – Não especificado em literatura
NP – Não possui
NGA – Núcleo de Gestão Assistencial
OMS – Organização Mundial de Saúde
ONA – Organização Nacional de Acreditação

OSS – Organização Social de Saúde
PAM – Posto de Atendimento Médico
PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde
PORT – Portaria
RAM – Reação Adversa a Medicamento
RDC – Resolução da Diretoria Colegiada
RENAME – Relação Nacional de Medicamentos
S/N – Sem Número
SES/SP – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
SNC – Sistema Nervoso Central
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
SS – Secretaria de Saúde
STS – Supervisão Técnica de Saúde
SUS – Sistema Único de Saúde
SVS/MS – Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
TEL – Telefone
TGO – Transaminase Glutâmico Oxalacética
TGP – Transaminase Glutâmico Pirúvica
TP – Tempo de Protombina
TVP – Trombose Venosa Profunda
UBS – Unidade Básica de Saúde
UI – Unidades Internacionais
UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo
USP – Universidade de São Paulo
VO – Via Oral

APRESENTAÇÃO E AGRADECIMENTOS

APRESENTAÇÃO

É com muito orgulho que a Comissão de Atenção Farmacêutica apresenta a Primeira Edição do Guia Farmacoterapêutico, desenvolvido pelas Unidades de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica sob gestão da SPDM.

O Guia Farmacoterapêutico tem como missão facilitar as atividades do dia a dia dos profissionais da área da saúde, apresentando informações técnicas sobre o elenco de medicamentos padronizados.

Este material contém a lista de todos os medicamentos padronizados, com os CID's, quantidades máximas dispensadas, informações sobre reações e interações medicamentosas.

Aproveitamos ainda, para inserir informações básicas sobre os procedimentos necessários para a retirada dos medicamentos do Componente Especializado, Dose Certa, Saúde Mental, Especialidades, Fibrose Cística e do Protocolo de Processos Administrativos.

Esperamos que ele contribua para o desenvolvimento das atividades diárias e que facilite na prestação de orientação aos usuários das Unidades de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

AGRADECIMENTOS

Ao Superintendente das Instituições Afiliadas SPDM, Doutor Nacime Salomão Mansur, pelo constante incentivo e importante apoio na realização deste trabalho.

À Coordenadora Administrativa das Instituições Afiliadas, Senhora Maria Alice Ferreira Lopes, pelo estímulo e suporte na elaboração deste guia.

À Administração das Unidades de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, nas pessoas dos Doutores Luiz Fernando Haigag Djabraian, Graziella Coppo, Aline Pierobon, Taiz Jacob Tuasca e André Meiji Kajiwara, por tornar possível a realização desta Primeira Edição do Guia Farmacoterapêutico.

Aos Coordenadores Locais que, mesmo diante de todas as dificuldades, incentivaram a participação dos profissionais, colaborando para o desenvolvimento deste trabalho.

Aos Membros das Comissões Locais de Atenção Farmacêutica pelo empenho e dedicação na realização das atividades.

A todos os profissionais e colaboradores que, de forma anônima, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho.

MENSAGEM DO SUPERINTENDENTE

O presente Guia Farmaterapêutico da Unidade de Farmácia, de excelente qualidade técnica, é fruto da experiência institucional e de algumas pessoas no gerenciamento das Unidades de Farmácia de Alto Custo do Governo do Estado de São Paulo.

A evolução gerencial da Unidade de Farmácia trouxe ganhos substanciais para a racionalização do gasto público, na padronização técnica, na consolidação do conhecimento e no treinamento e capacitação das pessoas.

A orientação dos profissionais de saúde, particularmente, na assistência farmacêutica, tem profundo significado no entendimento estratégico da segurança aos pacientes.

Certamente, melhor treinamento e capacitação, bem como aprimoramento constante e difusão do conhecimento, são fundamentais para a correta prescrição medicamentosa e para a prevenção de possíveis erros de administração dos fármacos, de graves repercussões para pacientes e profissionais de saúde.

Aspecto importante de orientação aos profissionais são as informações relativas aos medicamentos sujeitos à controle especial, com descrição detalhada e receituário específico para cada medicação e os formulários de solicitação, seja de Componente Especializado, seja do Protocolo do Processo Administrativo. Tais informações melhoram a prestação dos

serviços, orientando adequadamente os pacientes prevenindo retrabalhos e desgastes do usuário, com o sistema de saúde.

A amplitude do Guia Terapêutico das Unidades de Farmácia, com temas de interesse, tratados de forma organizada e objetiva, será de extrema valia aos profissionais de saúde, pacientes e gestores do sistema de saúde, público e privado, preenchendo uma lacuna na referência à assistência farmacêutica mais especializada, traduzindo maior eficácia e melhor assistência ao paciente.

Cumprimentos efusivos aos autores por esta excelente contribuição para construção de um sistema de saúde digno, de qualidade e compromisso social.

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur
Superintendente | Instituições Afiliadas SPDM

aulista para o
to da Medicina

1

A INSTITUIÇÃO SPDM

1 A INSTITUIÇÃO SPDM

Colaboradores: Luiz Fernando Haigag Djabraian | Graziella Coppo
Aline Pierobon | Taiz Jacob Tuasca | André Meiji Kajiwara

1.1 SOBRE A SPDM

A Entidade SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA é uma Associação Civil, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal, respectivamente pelos Decretos nº 57.925, de 04 de março de 1966, nº 40.103, de 17 de maio de 1962, e nº 8.911, de 30 de julho de 1970.

A SPDM tem sua sede social e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo manter filiais com prévia aprovação do Conselho Administrativo, homologada pela Assembleia Geral dos Associados. O prazo de duração da SPDM é indeterminado.

A SPDM tem como objetivos:

• Desenvolver atividades assistenciais de natureza médico-hospitalar, diagnóstica e ambulatorial a todas as pessoas que delas necessitem, sem distinção de nacionalidade, cor, gênero ou religião;

• Promover ações e prestar serviço de saúde, inclusive ao Sistema Único de Saúde (SUS), e assistência social, gratuitamente ou não, de atenção às necessidades da criança, adolescente e da família;

FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS - CEAF
VILA MARIANA
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO

• Desenvolver o ensino e a pesquisa na área das ciências da saúde, apoiando investigação científica, bem como contribuindo para a qualificação profissional;

• Manter o Hospital São Paulo (HSP), Hospital Universitário da Universidade Federal São Paulo (UNIFESP), bem como outros hospitais, centros de assistência e unidades afins;

• Contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e programas, visando garantir a universalidade e as oportunidades de acesso à saúde, necessárias ao desenvolvimento humano e social do cidadão, podendo firmar convênios, contratos, parcerias e demais instrumentos jurídicos com outras instituições de natureza pública e/ou privada, nacional e/ou internacional, de ensino, pesquisa e/ou assistência à saúde;

• Colaborar, a seu exclusivo critério, com atividades da UNIFESP relacionadas à área da saúde, no "Campus" São Paulo/Vila Clementino, assim como de instituições conveniadas, ouvida a Assembleia Geral;

• Ministrar cursos, produzir e disponibilizar material didático e científico, assim como tecnologia na área das ciências da saúde;

• Prestar serviços de consultoria, desenvolver, assessorar e gerenciar serviços e sistemas de saúde de natureza pública ou privada;

• Prestar serviços de consultoria, elaboração, planejamento ou assessoria em projetos arquitetônicos, ambientais e de infra-estrutura em áreas físicas ou imóveis destinados à assistência, ensino e/ou pesquisa na área da saúde.

Atualmente, a SPDM é a maior entidade filantrópica de prestação de serviços de saúde do Brasil - com mais de 32 mil colaboradores, atuando em diversos municípios e segmentos do setor, para melhoria da qualidade de vida da população.

Gerencia Unidades Hospitalares, Ambulatoriais e de Farmácia de Alto Custo, construídas e equipadas, pelo Estado e por alguns municípios, com o objetivo de levar o que há de mais avançado em conhecimento médico para as populações mais necessitadas, além de ser um posto avançado de capacitação de recursos humanos.

Desde 1998, a SPDM é credenciada como Organização Social de Saúde (OSS) para gerenciar unidades de saúde, construídas e equipadas pelo Estado ou Município. Essa nova forma de atendimento à população, dentro dos princípios de universalidade e equidade, iniciou-se com a gestão do Hospital Geral de Pirajussara, localizado entre as cidades de Taboão da Serra e Embu. Devido ao êxito da gestão, outros dois contratos foram celebrados, com o Hospital

Estadual de Diadema e com o Hospital das Clínicas Luzia Pinho de Melo (Mogi das Cruzes).

Para validação e reconhecimento de seu processo de qualidade, busca a certificação de órgãos acreditadores nacionais e internacionais. Atualmente, possui Unidades com Acreditação Canadense e Unidades acreditadas pela Organização Nacional de Acreditação de Hospitais (ONA).

1.2 EXPERIÊNCIA DA SPDM - GESTÃO DE FARMÁCIA

Em 29 de novembro de 2005, a SPDM assumiu a gestão da Farmácia de Dispensação do Programa de Medicamentos Excepcionais (Farmácia de Alto Custo – FAC) do Núcleo de Gestão Assistencial Maria Zélia (NGA Maria Zélia).

Em 02 de maio de 2006, passou à gestão da SPDM a Farmácia de Dispensação do Programa de Medicamentos Excepcionais do Núcleo de Gestão Assistencial Várzea do Carmo (NGA Várzea do Carmo); em 03 de julho de 2006, esta Unidade de Farmácia absorveu os pacientes da Unidade de Farmácia do Posto de Atendimento Médico Centro – PAM Centro, pacientes renais crônicos e transplantados, em sua grande maioria. A partir de 1º de agosto de 2007, iniciou-se, nesta Unidade, o Projeto de Entrega de Medicamento em Casa, conforme diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP).

Em 14 de março de 2008, iniciou-se a gestão da SPDM na Unidade de Farmácia de Medicamentos Excepcionais do Município de Campinas, onde estavam cadastrados pacientes de Campinas, de 42 municípios da Região, de 10 Clínicas de Hemodiálise e de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Em março de 2010, seguindo as mesmas políticas adotadas pela Unidade Várzea do Carmo, ocorreu a implementação do Programa

Medicamento em Casa na Unidade Maria Zélia.

Em 17 de maio de 2010, iniciou-se a gestão SPDM na Unidade de Farmácia de Medicamentos Excepcionais de Guarulhos, prestando serviço de Assistência Farmacêutica aos munícipes de Guarulhos.

Em 05 de março de 2014, iniciou-se a gestão SPDM na Unidade de Farmácia de Medicamentos Excepcionais Vila Mariana.

Dessa forma, a gestão das Unidades de Farmácia vem experimentando mudanças, como contribuição da SPDM, no intuito de aprimoramento dos processos existentes e, assim, colaborar na eficiência e eficácia do Programa de Medicamentos Excepcionais do Governo do Estado de São Paulo.

Unidade Vila Mariana
Av. Dr. Altino Arantes, 1344 | 04042-005– Vila Clementino – São Paulo
Horário de Funcionamento: 07 às 19 horas, de 2ª a 6 ª feira
Telefone: (11) 5074-4700
vilamariana@ceaf.spdm.org.br

Unidade Guarulhos
Av. Emílio Ribas, 1126 | 07020-010 – Gopoúva – Guarulhos
Horário de Funcionamento: 07 às 19 horas, de 2ª a 6 ª feira
Telefone: (11) 2408-5886 | 2408-5883 | 2408-5887
guarulhos@ceaf.spdm.org.br

Ambulatório Médico de Especialidades Maria Zélia
Rua Jequitinhonha, 368 | 03021-040 – Catumbi – São Paulo
Horário de Funcionamento: 07 às 19 horas, de 2ª a 6 ª feira
Sábados, das 08 às 14 horas
Telefone: (11) 3583-1800 - opção 02
farmacia.altocusto@amemz.spdm.org.br
farmacia.medcasa@amemz.spdm.org.br

Núcleo de Gestão Assistencial Várzea do Carmo
Rua Leopoldo Miguez, 327 | 01518-020 – Cambuci – São Paulo
Horário de Funcionamento: 07 às 19 horas, de 2ª a 6 ª feira
Telefone: (11) 3555-0155
varzeadocarmo@ceaf.spdm.org.br
medicamentoemcasa@saude.sp.gov.br

Unidade Campinas
Rua Cel. Setembrino de Carvalho, 123 | 13041-480 – Ponte Preta - Campinas
Horário de Funcionamento: 07 às 19 horas, de 2ª a 6 ª feira
Telefone: (19) 3232-5118
campinas@ceaf.spdm.org.br

1.3 MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO

• Distribuir e dispensar medicamentos, em conformidade com os critérios das boas práticas de Farmácia e diretrizes estabelecidas pelos programas de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde.

• Promover a busca contínua da qualidade, visando aperfeiçoar a Assistência Farmacêutica, atendimento, sistema de distribuição, dispensação e gestão.

• Desenvolver pessoas e contribuir para uma saúde pública digna com compromisso social.

VISÃO

Tornar-se um centro de distribuição e ser reconhecido como polo de referência de dispensação de medicamentos, atendimento e assistência farmacêutica.

VALORES

• Respeito às pessoas e ao bem público;
• Comprometimento socioambiental;
• Ética;
• Honestidade;
• Compromisso;
• Equidade.

1.4 COMISSÕES

1.4.1 COMISSÃO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA

A Atenção Farmacêutica, um novo modelo centrado no paciente, surgiu como alternativa que busca melhorar a qualidade do processo

de utilização de medicamentos alcançando resultados concretos.

Analisando as funções do profissional Farmacêutico no processo de Atenção à Saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estende o benefício da Atenção Farmacêutica para toda a comunidade, reconhecendo a relevância de sua participação, junto à equipe de saúde, na prevenção de doenças e promoção da saúde. Na óptica da OMS, a Atenção Farmacêutica é:

"um conceito de prática profissional na qual o paciente é o principal beneficiário das ações do Farmacêutico. A Atenção Farmacêutica é o compêndio das atitudes, os comportamentos, os compromissos, as inquietudes, os valores éticos, as funções, os conhecimentos, as responsabilidades e as habilidades dos Farmacêuticos na prestação da farmacoterapia com o objetivo de obter resultados terapêuticos definidos na saúde e na qualidade de vida do paciente" (OMS, 1993).

OBJETIVOS:

• Promover a orientação sobre o uso racional dos medicamentos aos pacientes e cuidadores;

• Informar e conscientizar os pacientes e cuidadores sobre a conservação e o correto armazenamento dos medicamentos;

• Promover a educação continuada dos pacientes, com relação às suas patologias, por meio dos "Encontros de Atenção à Saúde";

• Escriturar o Guia Farmacoterapêutico e realizar sua revisão;

• Desenvolver a humanização.

1.4.2 COMISSÃO DE FARMACOVIGILÂNCIA

Segundo a OMS:

"A Farmacovigilância é uma metodologia de identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou qualquer problema possível relacionado com fármacos."

1.4.2.1 – Definições

Reação Adversa:

Qualquer efeito nocivo, não intencional e indesejado de uma droga, observado com doses terapêuticas habituais em seres humanos para fins de tratamento, profilaxia ou diagnósticos.

Erros de Medicação:

Qualquer evento evitável que pode causar dano ao paciente ou levar ao uso inadequado do medicamento.

Desvio de Qualidade:

Afastamento dos parâmetros de qualidade estabelecidos para um produto como mudanças de coloração, odor, sabor, precipitação, dificuldade de homogeneização, problemas de desintegração e dissolução, formação de gases, fotossensibilidade e termossensibilidade.

Consideram-se desvios de qualidade a presença de partículas estranhas, falta de informação no rótulo, rótulo com pouca adesividade ao material de embalagem, problemas de registro, troca de rótulo ou de conteúdo, rachaduras e bolhas no material de acondicionamento.

1.4.2.2 – Formulários Padronizados Disponíveis no Capítulo 8 – Anexos.

Anexo 1 – Ficha de Notificação de Reação Adversa.

Anexo 2 – Ficha de Notificação de Desvio de Qualidade de Medicamentos – SES.

Anexo 3 – Ficha de Notificação de Desvio de Qualidade de Materiais e Medicamentos – SPDM.

OBJETIVOS:

• Implementar e acompanhar as ações de Farmacovigilância nas Unidades de Farmácia do Componente Especializado da

Assistência Farmacêutica – CEAF;

- Notificar Desvios de Qualidade dos Medicamentos;
- Notificar possíveis Reações Adversas a Medicamentos;
- Elaborar material didático e auxiliar no treinamento de pacientes e profissionais sobre o assunto;
- Promover o uso racional e seguro de medicamentos;
- Desenvolver ações voltadas para a Segurança do Paciente;
- Escriturar o Plano de Segurança do Paciente.

1.4.3 COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE

"É de responsabilidade de todos os estabelecimentos assistenciais de saúde humana elaborar, implantar e implementar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde - PGRSS." (RDC 306 de 07 de dezembro 2004)

O PGRSS aplica-se a todos os serviços de saúde relacionados nas resoluções RDC n° 306, de 07 de dezembro de 2004, ANVISA e CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005.

A Comissão de GRSS surgiu com o objetivo de assegurar que os processos de gestão dos resíduos gerados nas Unidades de Farmácia de Dispensação de Medicamentos Excepcionais tenham um encaminhamento seguro de forma eficiente, visando à proteção dos colaboradores, à preservação da saúde, dos recursos naturais e do meio ambiente.

A comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde é composta por membros efetivos das Unidades, que se reúnem mensalmente para estabelecer diretrizes, apoio técnico, científico e operacional, a fim de assegurar o correto manejo dos resíduos.

OBJETIVOS:

• Ordenar os resíduos de serviços de saúde, conforme tipologia, com vista à Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005;
• Minimizar a geração de resíduos;
• Adequar a segregação na origem;
• Contribuir para o controle dos riscos de acidentes de trabalho;
• Controlar e reduzir riscos ao meio ambiente;
• Controlar e reduzir riscos para a saúde pública;
• Assegurar o adequado manejo dos resíduos;
• Promover a educação ambiental.

DEFINIÇÕES:

O que é o PGRSS?

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde é um documento integrante do processo de licenciamento ambiental de todo e qualquer estabelecimento que trabalhe com saúde animal ou humana. Estes estabelecimentos devem seguir as regulamentações da ANVISA RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, e do Conselho Nacional do meio ambiente a CONAMA nº 358 de 29 de abril de 2005.

"O bom gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde deve envolver todos os colaboradores, pois somos responsáveis por eles desde a geração até a disposição final. Contribuindo com o meio ambiente".

1.4.4 COMITÊ DE QUALIDADE

Como parte integrante do modelo de Gestão das Instituições Afiliadas da SPDM, a qualidade é um elemento diferenciador no processo de atendimento às expectativas dos pacientes, visando uma interação harmônica entre as áreas assistenciais e administrativas. Para a consolidação da missão e visão da Instituição, a política de gestão de qualidade tem o objetivo de avaliar, medir e readequar

sistematicamente os processos, de forma a garantir a melhoria contínua e a segurança na assistência prestada.

Nesse contexto, a política da qualidade é:

"Contribuir para a difusão da missão e valores institucionais, por meio de ações para o desenvolvimento das pessoas, melhoria contínua e redução dos riscos dos processos administrativos e assistenciais, com foco na segurança, satisfação dos pacientes e no reconhecimento externo."

OBJETIVOS:

- Discutir, implementar e disseminar as atividades de Qualidade, nas Unidades de Farmácia;
- Realizar treinamentos e capacitações com os Colaboradores;
- Realizar auditorias internas nas Unidades de Farmácia;
- Escriturar o Manual de Normas e Rotinas, mapeamento de processos e mapeamento de risco;
- Instituir o uso das ferramentas da qualidade;
- Elaborar informativos;
- Realizar check list;
- Confeccionar contratos entre setores e avaliar as não-conformidades.

Os processos de medição, análise e melhoria são aplicáveis a cada uma das etapas e ao sistema como um todo, e a evolução é controlada por indicadores de qualidade alinhados ao Planejamento Estratégico e às Metas Estratégicas Institucionais.

As atividades de procedimentos delimitam os produtos a que se refere em cada Unidade, ou seja, identificar, classificar e mapear a totalidade dos processos e descrevê-los, conforme as instruções de trabalho.

1.4.5 COMISSÃO QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR

Segundo a Organização Mundial da Saúde, Qualidade de Vida é: *"a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações".*

O tema "Qualidade de vida no trabalho" vem se tornando cada vez mais uma preocupação para as empresas, devido à ligação que existe entre as condições adequadas para realização de um trabalho e produtividade.

A Comissão de Qualidade de Vida no Trabalho (CQVT) assimila duas posições antagônicas: a reivindicação dos empregados quanto ao bem-estar e satisfação no trabalho e o interesse das organizações quanto aos seus efeitos potenciais sobre a produtividade e a qualidade, envolvendo diversos fatores, dentre eles:

- A satisfação com o trabalho executado;
- O reconhecimento pelos resultados alcançados;
- Os benefícios auferidos;
- O relacionamento humano dentro do grupo e da organização;
- O ambiente psicológico e físico de trabalho;
- A liberdade e a responsabilidade de decidir;
- As possibilidades de participar.

O objetivo da Comissão de Qualidade de Vida do Trabalhador nas Unidades de Farmácia do Componente Especializado é facilitar as mudanças no estilo de vida, combinando ações e campanhas para a conscientização de práticas de saúde que previnam doenças, além de encorajar e apoiar hábitos e estilos de vida que promovam saúde e bem-estar entre todos os colaboradores durante toda a sua vida profissional.

Entre os benefícios desta prática estão:

- Melhoria da produtividade dos Colaboradores;
- Colaboradores mais alertas e motivados;
- Melhoria da imagem corporativa;
- Redução no absenteísmo;
- Melhoria das relações humanas;
- Baixas taxas de enfermidade;
- Redução de turnover.

Não é suficiente ter em mente mudar relevantemente o estado de saúde dos profissionais, mas também encorajá-los a cuidarem de sua própria saúde, adquirindo um ganho substancial na sua satisfação, assim como no aumento de produção e redução de custos para a empresa.

1.4.6 COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE

O termo "sustentável" provém do latim *sustentare* (sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar e cuidar). Segundo o Relatório de Brundtland (1987), o uso sustentável dos recursos naturais deve "suprir as necessidades da geração presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas".

A adoção de ações sustentáveis garante, a médio e longo prazo, um planeta em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a humana, e a manutenção dos recursos naturais necessários para a sobrevivência das próximas gerações.

A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), por meio das Unidades de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), iniciou a incorporação dos aspectos da sustentabilidade em sua gestão, propondo ações que utilizam os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro.

Assim, para a aplicação do princípio da sustentabilidade, temos como premissa uma gestão que seja:

- Ecologicamente correta;
- Economicamente viável;
- Socialmente justa;
- Culturalmente diversa.

O RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

O Relatório de Sustentabilidade pode ser considerado uma ferramenta utilizada pelas empresas para relatar e prestar contas à sociedade e ao mercado a respeito de sua atuação e de suas práticas sustentáveis. Por meio desse reporte, as organizações e todos os seus públicos têm em mãos um instrumento que possibilita dialogar e implementar um processo de melhoria contínua do desempenho da empresa, rumo ao desenvolvimento sustentável. Nas Unidades do CEAF, a Comissão de Sustentabilidade é a responsável pela elaboração deste Relatório.

As Unidades de Farmácia preconizam o aperfeiçoamento das práticas diárias, reconhecendo os desafios que ainda estão por vir, preocupando-se com o desenvolvimento de ações de qualidade que estejam em harmonia com as necessidades da sociedade e garantindo às próximas gerações a capacidade de suprirem suas próprias necessidades. Entretanto, ser sustentável não significa apenas ter iniciativas em prol do meio ambiente ou ter um forte investimento social. Significa também, e principalmente, ter a sustentabilidade na gestão, nas decisões e nas atitudes do dia a dia.

2

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS

2

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS

Colaboradores: Aline de Medeiros Pereira | Andreza Zambelli | Cinthia Cardoso Guimarães | Daniele Pinho Biagio | Geovana Balduino Bispo de Souza| Juliana Santos Luciene Melo de Miranda| Susana Piacenti Gonçalves | Thais Helena Chicaroni Javarez

Para otimizar o processo de consulta dos medicamentos padronizados, estes foram divididos em dois grupos e diferenciados por duas cores, conforme legenda abaixo:

- Medicamentos Termoestáveis
- Medicamentos Termolábeis

2.1 POR NOME GENÉRICO

ABATACEPTE
Frasco ampola 250 mg (IV)

CLASSIFICAÇÃO: Antirreumático.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 5 frascos - ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: M05.0; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8; M08.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipertensão arterial.

Sistema Digestório: náusea, dispepsia, diarreia e dor abdominal.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: leucemia linfocítica aguda e linfoma.

Sistema Muscular e Esquelético: dorsalgia e desgate articular.

Sistema Nervoso: cefaleia, tontura e febre.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: ITU e cisto ovariano.

Sistema Respiratório: nasofaringite, infecção das vias superiores, tosse, bronquite, pneumonia, rinite, sinusite, câncer de pulmão, dispneia e exacerbação da DPOC.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash cutâneo e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Infliximabe, Golimumabe, agentes anti-FNT, Trastuzumabe e vacinas.

ACETAZOLAMIDA
Comprimido 250 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente oftálmico, Antiglaucoma, Anticonvulsivante, Diurético e Inibidor da anidrase carbônica.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 124 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: H40.1; H40.2; H40.3; H40.4; H40.5; H40.6; H40.8; Q15.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: zumbido e disfunção auditiva.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: diarreia, perda de apetite, perda de peso, náusea, vômito e alteração do paladar.

Sistema Endócrino: hiperglicemia.

Sistema Hepático: necrose hepática.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: anemia aplástica.

Sistema Muscular e Esquelético: ataxia.

Sistema Nervoso: depressão, confusão mental, mal-estar, fadiga e cefaleia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: alteração eletrolítica, aumento da

frequência e volume urinário.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: hiperemia, parestesia, alergia cutânea e Síndrome de Stevens-Johnson.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: agentes hipoglicemiantes, salicilatos (recomenda-se cautela em pacientes tratados concomitantemente com o Ácido Acetilsalicílico) e Ciclosporina.

ÁCIDO FOLÍNICO
Comprimido 15 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente de resgate (quimioterapia), Agente modulador e Vitamínico.

RESTRIÇÃO: Medicamento da Resolução SS – 200, de 06 de outubro de 2010.

Dose Recomendada: 5mg/dia.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para Tratamento de Toxoplasmose em Gestante (B36).

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Pele e Anexos: erupção cutânea, ardência e prurido.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: fluoropirimidinas.

ÁCIDO NICOTÍNICO

Comprimido de Liberação Controlada 250 mg (VO)
Comprimido de Liberação Controlada 500 mg (VO)
Comprimido de Liberação Controlada 750 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antilipemiante e Vitamínico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido de 250mg - 372 comprimidos.

Comprimido de 500mg - 186 comprimidos.

Comprimido de 750mg - 124 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E78.0; E78.1; E78.2; E78.3; E78.4; E78.5; E78.6; E78.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: arritmias, edema, fibrilação atrial, hipotensão arterial, hipotensão ortostática, palpitação, rubor, síncope (rara) e taquicardia.

Sistema Digestório: dispepsia, dor abdominal, eructação, flatulência, náusea, úlcera péptica e vômito.

Sistema Endócrino: aumento da uricemia, gota, redução da tolerância à glicose e redução dos níveis de fósforo.

Sistema Hepático: aumento de enzimas hepáticas, icterícia e necrose hepática (rara).

Sistema Hematopoiético: aumento do tempo de protrombina e

redução da contagem de plaquetas.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: cãimbras em membros inferiores, dor, fraqueza, mialgia, miastenia, miopatia e rabdomiólise.

Sistema Nervoso: calafrios, cefaleia, enxaqueca, insônia e tontura.

Sistema Oftálmico: ambliopia tóxica e edema macular cistóide.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: dispneia.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: hiperpigmentação, prurido, rash cutâneo, ressecamento da pele e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: sequestradores de ácidos biliares podem diminuir a absorção da Niacina.

ÁCIDO URSODESOXICÓLICO
Comprimido 150 mg (VO)
Comprimido 300 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente de dissolução da litíase biliar.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa de Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para E84; E84.0; E84.1; E84.8; E84.9.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: constipação, diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, sabor metálico, constipação e dispepsia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: leucopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia, tontura e fadiga.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: alopécia, prurido e rash cutâneo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: antiácidos contendo alumínio, Clofibrato, Colestipol, Colestiramina e contraceptivos orais (estrogênio).

ÁCIDO VALPROICO
Comprimido 250 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anticonvulsivante.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Medicamento com baixo índice terapêutico.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: otite média, surdez, zumbido e diplopia.

Sistema Cardiovascular: dor torácica, edema periférico, hipertensão arterial, palpitação, taquicardia, bradicardia e edema.

Sistema Digestório: náusea, diarreia, vômito, dor abdominal, dispepsia, anorexia, abscesso periodontal, aumento do apetite, eructação, flatulência, ganho de peso, hematêmese, pancreatite, perversão do paladar, cólicas abdominais, constipação, indigestão e perda de peso.

Sistema Endócrino: amenorreia, dismenorreia, aumento das mamas, edema de parótidas, galactorreia, hiperamonemia, hiponatremia, ovário policístico (raro), provas da função tireoidiana anormal e secreção inadequada de hormônio antidiurético.

Sistema Hepático: aumento de TGO/TGP, aumento de bilirrubina e encefalopatia hiperamoniacal (em pacientes com distúrbio do ciclo da ureia).

Sistema Hematopoiético: trombocitopenia, agranulocitose, anemia, anemia aplástica, eosinofilia, formação de hematoma, hemorragia, hipofibrinogenemia, leucopenia, linfocitose, macrocitose, pancitopenia, porfiria intermitente e supressão da medula óssea.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: tremores, fraqueza, artralgia, cãimbras em membros inferiores, dorsalgia e/ou lombalgia, espasmos, hipertonia, marcha anormal, mialgia, miastenia, parestesia, asterixe, disartria e ostealgia.

Sistema Nervoso: sonolência, tontura, insônia, nervosismo, amnésia, ansiedade, cefaleia, confusão mental, coordenação

anormal, depressão, distúrbios da personalidade, mal-estar, pesadelos, agressividade, alucinações, ataxia, atrofia cerebral (reversível), coma (raro), demência, eterioração comportamental, encefalopatia (rara), febre, hiperatividade, hipoestesia, hipotermia, hostilidade, parkinsonismo, psicose, sedação e vertigem.

Sistema Oftálmico: ambliopia ou turvamento da visão e visão anormal.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: aumento da frequência miccional, incontinênca urinária e ITU.

Sistema Respiratório: aumento da tosse, dispneia, epistaxe, faringite, pneumonia e sinusite.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: alopécia, equimoses, petéquias, prurido, rash cutâneo, ressecamento da pele, eritema multiforme, fotossensibilidade, necrólise epidérmica tóxica (rara), Síndrome de Stevens-Johnson e vasculite cutânea.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Carbamazepina, Fenitoína, antidepressivos tricíclicos, Fenobarbital, Lamotrigina, Zidovudina, antibióticos macrolídeos (Claritromicina, Eritromicina e Troleandomicina), Felbamato, Isoniazida, Ácido Acetilsalicílico, Topiramato, Risperidona, antibióticos carbapenêmicos (Ertapenem, Imipenem e Meropenem) e Oxcarbamazepina.

ACITRETINA

Cápsula 10 mg (VO)
Cápsula 25 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antipsoríase e Antidisceratose.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C2 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido de 10mg – 217 comprimidos.

Comprimido de 25mg – 93 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: L40.0; L40.1; L40.4; L40.8; L44.0; Q80.0; Q80.1; Q80.2; Q80.3; Q80.8; Q82.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: secura na boca, sensação de sede, gengivite, estomatite e alterações do paladar.

Sistema Endócrino: elevações reversíveis de triglicérides e colesterol séricos, especialmente em pacientes de alto risco (distúrbio do metabolismo lipídico). O risco de aterogênese não pode ser excluído, caso essas condições persistam.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dores musculares e articulares.

Sistema Nervoso: cefaleia, visão borrada e diminuição da visão noturna.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: ressecamento dos lábios, quelites, ressecamento de mucosas e epitélio apresentando lesões inflamatórias levando a efeitos secundários como hemorragias nasais e distúrbios oculares, adelgaçamento e escamação da pele, queda de cabelo, unhas quebradiças e paroníquia.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Vitamina A, Metotrexato e Tetraciclina.

ADALIMUMABE
Solução Injetável 40 mg (SC)

CLASSIFICAÇÃO: Agente bloqueador do fator de necrose tumoral, Antirreumático, Modificador da doença e Anticorpo monoclonal.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada:

3 ampolas – Doença de Crohn.

2 ampolas – Artrite Reumatóide.

CID 10 – MEDICAMENTO: K50.0; K50.1; K50.8; M05.0; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8; M07.0; M07.3; M08.0; M45; M46.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipertensão arterial e arritmia.

Sistema Digestório: náusea e dor abdominal.

Sistema Endócrino: hipercolesterolemia.

Sistema Hepático: aumento da fosfatase alcalina.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia, confusão e febre.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: infecção do trato urinário.

Sistema Respiratório: infecções de vias aéreas superiores, sinusite e sintomas gripais.

Local de Aplicação: reações no sítio de injeção e hematúria.

Pele e Anexos: rash cutâneo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Anacinra e vacinas vivas não devem ser usadas concomitantemente com Adalimumabe.

ADEFOVIR DIPIVOXIL
Comprimido 10 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antirretroviral e Inibidor da Transcriptase Reversa.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 31 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: B18.1.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náuseas, vômitos, diarreia, perda de apetite e flatulência.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: risco de toxicidade hepática, principalmente em mulheres obesas e com tempo prolongado de uso.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: potencial nefrotóxico, sobretudo em indivíduos com perda prévia de função renal e uso contínuo deste medicamento e risco de desenvolvimento da Síndrome de Fanconi.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Entecavir**.**

ADEKS
Drágea (VO)
Gotas Pediátricas (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Não há.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa de Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para E84; E84.0; E84.1; E84.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre reações adversas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

ALFACALCIDOL
Cápsula 0,25 mcg (VO)
Cápsula 1,0 mcg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anti-hipocalcêmico e Análogo sintético da vitamina D.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:
Comprimido de 0,25mcg – 744 comprimidos.
Comprimido de 1,0mcg - 186 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E20.0; E20.1; E20.8; E89.2; N18.0; N18.8; N25.0; N25.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: anorexia, náuseas, vômitos, diarreia e perda de peso.

Sistema Endócrino: sudorese.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: cansaço.

Sistema Nervoso: cefaleia e vertigem.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: hipercalcemia, poliúria, nefrocalcinose e hiperfosfatemia.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: sede, prurido, erupção cutânea e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: babitúricos e outros anticonvulsivantes, Óleo mineral, Colestiramia, Colestipol, antiácidos a base de alumínio e magnésio ou laxantes, diuréticos tiazídicos (Hidroclorotiazida, Metolazona, Indapamide e Bendroflumetiazida) e estrogênios em mulheres em fase de pré e pós-menopausa.

ALFADORNASE
Ampola 2,5 mg (Nebulização – VO)

CLASSIFICAÇÃO: Enzima.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 62 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: E84.0; E84.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: dor torácica.

Sistema Digestório: dispepsia, faringite e laringite.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: febre.

Sistema Oftálmico: conjuntivite.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: dispneia, rinite e no início do tratamento pode ocorrer diminuição da função pulmonar e aumento da expectoração.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: alteração da voz (afonia), erupção cutânea e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não foram realizados estudos formais de interação medicamentosa com alfadornase

ALFAEPOETINA HUMANA

Solução Injetável 1.000 UI (SC)
Solução Injetável 2.000 UI (SC)
Solução Injetável 3.000 UI (SC)
Solução Injetável 4.000 UI (SC)
Solução Injetável 10.000 UI (SC)

CLASSIFICAÇÃO: Fator estimulante de colônias.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada:

Ampola de 1.000UI – 50 ampolas.

Ampola de 2.000UI – 37 ampolas.

Ampola de 3.000UI – 37 ampolas.

Ampola de 4.000UI – 56 ampolas

Ampola de 10.000UI – 22 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: N18.0; N18.8; Z94.8. Para Alfapoetina 10.000UI: N18.0; N18.8; Z94.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipertensão arterial, eventos trombóticos ou vasculares, edema, trombose venosa profunda, ataque isquêmico passageiro, AVC, infarto do miocárdio e taquicardia.

Sistema Digestório: náusea, constipação, vômito, diarreia e dispepsia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: anemia (grave com ou sem outras citopenias).

Sistema Linfático: anticorpos neutralizadores e aplasia pura da série vermelha.

Sistema Muscular e Esquelético: artralgia, parestesia e mialgia.

Sistema Nervoso: febre, insônia, tontura, cefaleia, crises convulsivas e encefalopatia hipertensiva.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: hipercalemia.

Sistema Reprodutor/Urinário: ITU.

Sistema Respiratório: tosse, congestão, dispneia, infecção das vias aéreas superiores, embolia pulmonar e sintomas similares aos da gripe.

Local de Aplicação: reação no local da injeção e coagulação do acesso vascular.

Pele e Anexos: prurido, dor cutânea, rash cutâneo, urticária, reação alérgica e de hipersensibilidade.

Outros: tromboflebite, trombose, trombose arterial retinal, trombose microvascular e trombose venosa temporal.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

ALFAINTERFERONA 2A

Solução Injetável 9.000.000/10.000.000 UI (SC, IM, IV, IT e IP)
Solução Injetável 5.000.000 UI (SC, IM, IV, IT e IP)
Solução Injetável 3.000.000 UI (SC, IM, IV, IT e IP)

CLASSIFICAÇÃO: Antiviral, Imunomodulador e Antiproliferativo complexo.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada:

Ampola de 9.000.000 / 10.000.000UI - 23 ampolas.

Ampola de 5.000.000UI – 46 ampolas.

Ampola de 3.000.000UI – 77 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: B18.0; B18.1; D18.0. Para Alfainterferona 3.000.000UI: B17.1; B18.0; B18.1; B18.2; D18.0. Para Alfainterferona 5.000.000UI: B17.1; B18.0; B18.1; D18.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: reações são observadas em um quinto dos pacientes com câncer e raramente ocorrem em pacientes com hepatite B, como: hipotensão, hipertensão, edema, distúrbios rítmicos, palpitação e dor torácica.

Sistema Digestório: anorexia, náusea, vômito, alteração no paladar, perda de peso, diarreia, dor abdominal, constipação e

flatulência são observadas em raras ocasiões.

Sistema Endócrino: sudorese e hiperglicemia.

Sistema Hepático: alguns pacientes têm aumento na TGO, fosfatase alcalina, ácido láctico desidrogenase e da bilirrubina. Normalmente, não é necessário o ajuste da dose de alfainterferona 2A recombinante quando estas reações ocorrem.

Sistema Hematopoiético: leucocitopenia transitória ocorreu em um terço a um meio dos pacientes associados com a administração de alfainterferona 2A recombinante. Trombocitopenia e redução da hemoglobina podem ser observadas em alguns pacientes com depressão da medula óssea. Anomalias severas no sistema hematopoiético melhoram em 7 a 10 dias depois da descontinuação do tratamento com alfainterferona 2A recombinante.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fadiga, mialgia e artralgia.

Sistema Nervoso: febre, calafrio, dor de cabeça vertigem, distúrbios visuais, memória fraca, depressão, sonolência, ansiedade, nervosismo e insônia. Raramente são observados parestesia, entorpecimento, prurido e tremores.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: falência renal foi raramente observada. Distúrbios eletrolíticos ocorrem ocasionalmente em associação com anorexia e desidratação.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: sintomas como os da gripe, tosse e dispneia.

Local de Aplicação: reações no local da injeção foram observadas em muitos pacientes nas administrações de alfainterferona 2A recombinante.

Pele e Anexos: herpes, erupção cutânea, prurido e pele seca são reportados ocasionalmente. Alopécia foi observada em um quinto dos pacientes que receberam alfainterferona 2A.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Deferiprona e drogas de ação central.

ALFAPEGINTERFERONA 2A/2B

Solução Injetável 180 mcg/mL (SC, IM, IV, IT e IP)
Solução Injetável 100 mcg/0,5mL (SC, IM, IV, IT e IP)
Solução Injetável 120 mcg/0,5mL (SC, IM, IV, IT e IP)
Solução Injetável 80 mcg/0,5mL (SC, IM, IV, IT e IP)

CLASSIFICAÇÃO: Antiviral, Inibidor da proliferação celular e Imunomodulador.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 5 ampolas para todas as dosagens.

CID 10 – MEDICAMENTO: B17.1; B18.0; B18.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: dor torácica.

Sistema Digestório: dispepsia, vômito, diarreia, dor abdominal, náusea, faringite, perda de peso, anorexia, flatulência e fezes amolecidas.

Sistema Endócrino: sudorese aumentada.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: neutropenia, leucopenia, anemia. Raramente: granulocitopenia e trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fadiga, calafrios, artralgia e dor músculo-esquelética.

Sistema Nervoso: ansiedade, dificuldade de concentração, tontura, insônia, febre, depressão, irritabilidade, labilidade emocional, agitação, vertigem, sonolência, nervosismo e confusão. Raramente: eventos psiquiátricos com risco de morte.

Sistema Oftálmico: visão turva, dor ocular e conjuntivite.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: distúrbio menstrual, obstipação e redução da libido.

Sistema Respiratório: congestão nasal, tosse, dispneia e sintomas como os da gripe.

Local de Aplicação: inflamação/dor no local da injeção, prurido e pele seca.

Pele e Anexos: rubor, parestesia, boca seca, alopécia e erupção cutânea.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não foram notadas interações farmacocinéticas entre Interferon Peguilado e a Ribavirina em estudo farmacocinético de doses múltiplas. Resultados de um estudo de dose única de Interferon Peguilado não demonstraram efeito sobre a atividade das isoenzimas do citocromo P450: CYP1A2, CYP2C8/9, CYP2D6 e CYP3A4 ou N-acetil transferase hepática.

Todavia, a literatura relata uma redução de mais de 50% na depuração dos substratos da CYP 1A2, quando administrado com outras formas de Alfainterferona e, por isso, deve-se tomar cuidado quando Interferon Peguilado for usado em associação com medicamentos metabolizados pela CYP 1A2.

ALFAVELAGLICERASE
Solução Injetável 200 UI (IV)
Solução Injetável 400 UI (IV)

CLASSIFICAÇÃO: Enzima.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada:

Ampola de 200UI - 48 ampolas.

Ampola de 400UI - 24 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: E75.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: distúrbios gastrointestinais.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: dor de cabeça e tontura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: hipersensibilidade.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

AMANTADINA CLORIDRATO
Comprimido 100 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antiparkinsoniano, Agonista da dopamina e Agente antiviral.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada: 124 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G20.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipotensão ortostática.

Sistema Digestório: náuseas, vômitos, anorexia, boca seca e constipação.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: leucopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fadiga, ataxia e tremores.

Sistema Nervoso: tonturas, insônia, depressão, ansiedade, nervosismo, dificuldade na fala, alucinações, confusão mental e cefaleia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: retenção urinária.

Sistema Respiratório: nariz seco.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Sulfametoxazol + Trimetoprima.

AMBRISENTANA
Comprimido 5 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Vasoconstritor.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido 5mg – 31 comprimidos.

Comprimido 10mg – 62 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: I27.0; I27.2; I27.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: palpitações.

Sistema Digestório: dor abdominal e constipação.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: anemia (diminuição de hemoglobina ou do hematócrito).

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: retenção hídrica e edema periférico.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: congestão nasal, sinusite e nasofaringite.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rubor.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Ciclosporina.

AMBROXOL
Comprimido 300 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente mucolítico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Especialidades.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: pirose (azia), dispepsia (dificuldade de digestão), náusea, vômito, diarreia e outros sintomas gastrointestinais leves.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: exantema, urticária e angioedema.

Outros: reações anafiláticas e outras reações alérgicas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Antibióticos.

AMICACINA
Solução Injetável 500 mg (IM)

CLASSIFICAÇÃO: Antibiótico e Aminoglicosídeo.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa de Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: ototoxicidade (auditiva e vestibular).

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: eosinofilia e reações alérgicas.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: neurotoxicidade.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nefrotoxicidade.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: dispneia.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: agentes bloqueadores neuromusculares, Anfotericina e outros medicamentos nefrotóxicos.

AMITRIPTILINA CLORIDRATO
Comprimido 25 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antidepressivo tricíclico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: palpitação e pulso rápido.

Sistema Digestório: boca seca, alteração do paladar, náusea, prisão de ventre e ganho de peso.

Sistema Endócrino: aumento da transpiração.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fadiga e diminuição da coordenação muscular.

Sistema Nervoso: sonolência, dificuldade de concentração, desorientação, tontura e sensação de tontura que pode ocorrer quando você se levantar rapidamente (devido à queda brusca da pressão) e dor de cabeça.

Sistema Oftálmico: visão turva e pupilas dilatadas.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: alteração da libido e impotência.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: urticária, coceira, erupções cutâneas e inchaço do rosto e/ou da língua, que podem causar dificuldade para respirar ou engolir.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: medicamentos usados para tratar condições psiquiátricas ou depressão mental, úlceras, pressão alta, batimento cardíaco irregular ou abuso de álcool, Ácido Valproico e Clorpromazina.

AMOXICILINA
Comprimido 500 mg (VO)
Suspensão Oral 250 mg/mL (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antibiótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: diarreia, náusea, vômito, colite associada a antibióticos (incluindo colite pseudomembranosa e colite hemorrágica) e língua pilosa negra.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: hepatite e icterícia colestásica. Observou-se aumento moderado em TGO ou TGP, no entanto, o significado desta alteração ainda não está claro.

Sistema Hematopoiético: leucopenia reversível (incluindo neutropenia grave ou agranulocitose), trombocitopenia reversível e anemia hemolítica, prolongamento do tempo de sangramento e tempo da protrombina.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: hipercinesia, vertigem e convulsões.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nefrite intersticial e cristalúria.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash cutâneo, urticária, prurido, reações cutâneas com eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrose epidérmica tóxica, dermatite bolhosa e esfoliativa e exantema pustuloso generalizado agudo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: outros antibióticos, Probenecida, Alopurinol, anticoncepcionais e anticoagulantes.

AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO
Solução Oral 200 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antibiótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa de Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para E84; E84.0; E84.1; E84.8; E84.9.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: diarreia, cuja incidência varia com a dose e com o esquema terapêutico utilizado, desconforto abdominal, fezes líquidas, flatulência, náusea e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: disfunção hepática e icterícia colestática.

Sistema Hematopoiético: aumento do tempo de protrombina e trombocitose.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: micose vaginal e vaginite.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash cutâneo e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Probenecida, anticoagulantes e Alopurinol.

ARIPIPRAZOL
Comprimido 15 mg (VO) - Excluído de acordo com a Resolução SS Nº121 de 27 de novembro de 2015
Comprimido 20 mg (VO) - Excluído de acordo com a Resolução SS Nº121 de 27 de novembro de 2015
Comprimido 30 mg (VO) - Excluído de acordo com a Resolução SS Nº121 de 27 de novembro de 2015

CLASSIFICAÇÃO: Agente antipsicótico atípico.

RESTRIÇÃO: Medicamento da Resolução SS nº 295 de 04 de setembro de 2007.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada: Não há.

CID 10 – MEDICAMENTO: F20.0; F20.1; F20.2; F20.3; F20.4; F20.5; F20.6; F20.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: dores no peito, hipertensão e bradicardia.

Sistema Digestório: anorexia, náuseas, vômitos e perda de peso.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: aumento da creatinofosfoquinase.

Sistema Hematopoiético: anemia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: anormalidade da marcha, rigidez

mandibular rigidez, cãimbras musculares e dores no pescoço.

Sistema Nervoso: sonolência, depressão, nervosismo, aumento da salivação, hostilidade, ideação suicida, mania e confusão.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: sintomas de gripe.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: agentes anti-hipertensivos.

ATORVASTATINA CÁLCICA

Comprimido 10 mg (VO)
Comprimido 20 mg (VO)
Comprimido 40 mg (VO)
Comprimido 80 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antilipemiante e inibidor da HMG-CoA Redutase.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido de 10mg – 248 comprimidos.

Comprimido de 20mg - 124 comprimidos.

Comprimido de 40mg – 62 comprimidos.

Comprimido de 80mg – 31 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E78.0; E78.1; E78.2; E78.3; E78.4; E78.5; E78.6; E78.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: constipação, flatulência, dispepsia, dor abdominal, náusea, diarreia, anorexia e vômito.

Sistema Endócrino: hiperglicemia e hipoglicemia.

Sistema Hepático: pancreatite, hepatite e icterícia colestática.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: mialgia, astenia, cãimbras musculares, miosite, miopatia e parestesia.

Sistema Nervoso: cefaleia, insônia e neuropatia periférica.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: impotência.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Ciclosporina, antiácidos, Colestipol, Itraconazol, Ácido Fusidico, Colchicina, indutores de citocromo (Efavirenz e Rifampicina) e Cetoconazol.

AZATIOPRINA
Comprimido 50 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente imunossupressor e Imunomodulador.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 248 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: D61.0; G35; D69.3; G70.0; H30.0; H30.1; H30.2; H30.8; K50.0; K50.1; K50.8; K51.0; K51.1; K51.2; K51.3; K51.4; K51.5; K51.8; K75.4; L93.0; L93.1; M08.0; M32.1; M32.8; M33.0; M33.1; M33.2; M34.0; M34.1; M34.8; M05.1; M05.2; T86.1; T86.4; Z94.0; Z94.1; Z94.2; Z94.3; Z94.4; Z94.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náusea, diarreia grave e pancreatite.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: depressão da função da medula óssea, leucopenia, anemia, trombocitopenia, agranulocitose, pancitopenia, anemia aplástica, anemia megaloblástica e hipoplasia eritrocítica.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: alopécia.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Olsalazina, Mesalazina, Alopurinol, Oxipurinol, Tiopurinol e Varfarina.

AZITROMICINA
Comprimido 500 mg (VO)
Solução Oral 200/5 mg/mL (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antibiótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa de Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para E84; E84.0; E84.1; E84.8; E84.9.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: dor no peito e palpitações.

Sistema Digestório: diarreia, cólicas, dor abdominal, náusea, vômito, pancreatite, alteração do paladar, anorexia, constipação, faringite e gastrite.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: anemia e leucopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dores, fadiga e fraqueza.

Sistema Nervoso: cefaleia, agitação, insônia, mal-estar, tontura e vertigem.

Sistema Oftálmico: conjuntivite.

Sistema Renal: efusão pleural.

Sistema Reprodutor/Urinário: vaginite e candidíase.

Sistema Respiratório: aumento da tosse e rinite.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: dermatite (fúngica), edema facial, monilíase oral prurido, rash cutâneo, reação alérgica e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Pimozida, Tacrolimo, Digoxina, alcalóides de ergotamina, Alfentanila, Bromocriptina, Varfarina e Ciclosporina.

BECLOMETASONA DIPROPIONATO

Aerossol 200 mcg – Excluído de acordo com a Resolução SS Nº116 de 11 de novembro de 2015
Aerossol 250 mcg – Excluído de acordo com a Resolução SS Nº116 de 11 de novembro de 2015
Aerossol 400 mcg– Excluído de acordo com a Resolução SS Nº116 de 11 de novembro de 2015

CLASSIFICAÇÃO: Corticosteroide.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013 – excluído de acordo com a Resolução SS nº 116 de 11 de novembro de 2015.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS: até o momento não foi constatado qualquer efeito grave, pela utilização do produto de acordo com as doses aconselhadas. Podem ocorrer, às vezes, infecções localizadas do tipo micótico (candidíase) na cavidade orofaríngea. Em geral, essas infecções regridem rapidamente com tratamento local à base de antimicóticos, não sendo necessária a interrupção do tratamento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: beta bloqueadores.

BENZILPENICILINA BENZATINA
Solução Injetável 1.200.000 UI (IM)

CLASSIFICAÇÃO: Antibiótico e Penicilina.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Especialidades.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: edemas de laringe.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: eosinofilia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: alguns pacientes apresentam calafrios, artralgia e prostração.

Sistema Nervoso: febre.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupções cutâneas e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Probenecida e Ácido Valproico.

BENZILPENICILINA PROCAINA + POTÁSSICA
Solução Injetável 300.000 UI + 100.000 UI (IM)

CLASSIFICAÇÃO: Antibiótico e Penicilina.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Especialidades.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: edema de laringe.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, neuropatia e nefropatia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: calafrios, edema, artralgia e prostração.

Sistema Nervoso: febre.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupções cutâneas, desde as formas maculopapulosas até as dermatites esfoliativas e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Varfarina, Probenecida, contraceptivos orais e Ácido Valproico.

BETAINTERFERONA 1A

Solução Injetável 12.000.000 UI (44 mcg) (SC)
Solução Injetável 6.000.000 UI (22 mcg) (SC)
Solução Injetável 6.000.000 UI (30 mcg) (IM)

CLASSIFICAÇÃO: Antiviral, Antiproliferativo e Imunomodulador.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada:

Ampola de 6.000.000 (22mcg) – 14 ampolas.

Ampola de 12.000.000 UI – 14 ampolas.

Ampola de 6.000.000 (30mcg) – 5 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: G35.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: palpitações, batimentos cardíacos rápidos ou irregulares, insuficiência cardíaca e cardiomiopatia.

Sistema Digestório: perda de apetite, diarreia, vômito e aumento ou perda de peso.

Sistema Endócrino: hiper ou hipotireoidismo.

Sistema Hepático: problemas de fígado, incluindo hepatite e insuficiência hepática.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: câimbra, dor muscular e nas articulações, costas, pescoço ou extremidades (braços e pernas), artrite e lúpus eritematoso sistêmico.

Sistema Nervoso: dificuldade para dormir, depressão, dormência ou formigamento, nervosismo ou ansiedade, instabilidade emocional, raciocínio desordenado ou alucinações, confusão ou pensamentos suicidas, tonturas e enxaqueca.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: irregularidades ou alterações no ciclo menstrual.

Sistema Respiratório: coriza e dificuldade para respirar.

Local de Aplicação: dor, vermelhidão, hematomas e ardor.

Pele e Anexos: perda de cabelo e reações alérgicas. As reações alérgicas graves (hipersensibilidade) são raras; os sintomas incluem inchaço do rosto, lábio ou língua, dificuldade para respirar e aparecimento de erupções cutâneas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Natalizumabe.

BETAINTERFERONA 1 B
Solução Injetável 9.600.000 UI (300 mcg) (SC)

CLASSIFICAÇÃO: Antiviral e Imunorregulador.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 16 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: G35.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: miocardiopatia foi observada, assim como dor no peito, taquicardia e palpitação.

Sistema Digestório: náusea e vômito. Em casos raros, foi observada a ocorrência de pancreatite.

Sistema Endócrino: disfunção da tiróide (hiper e hipotireoidismo).

Sistema Hepático: elevações de TGO, TGP e GT, e existem relatos de hepatite possivelmente induzida pelo medicamento.

Sistema Hematopoiético: leucopenia, linfopenia, neutropenia e anemia. Existem relatos de trombocitopenia, com diminuição acentuada na contagem de plaquetas em casos raros.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: depressão, ansiedade, instabilidade emocional, despersonalização, convulsões, ideias suicidas, confusão e hipertonia muscular.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: alterações menstruais em mulheres na pré-menopausa.

Sistema Respiratório: dispneia.

Local de Aplicação: reações locais.

Pele e Anexos: reações sérias de hipersensibilidade (reações raras, mas graves e agudas, tais como broncoespasmo, anafilaxia e urticária).

Outros: observados sintomas semelhantes aos gripais (febre, calafrios, cefaleia, mialgia, artralgia, indisposição geral ou sudorese).

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Natalizumabe.

BETAMETASONA ACETATO
Solução Injetável 3 mg/mL (IM)

CLASSIFICAÇÃO: Corticosteroide.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Especialidades.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fraqueza óssea ou muscular.

Sistema Nervoso: vertigens, convulsões, cefaleia e insônia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: distúrbios menstruais.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: rubor local pós-injeção.

Pele e Anexos: atraso na cicatrização, acne, petéquias, equimoses e hiper ou hipopigmentação.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Efedrina, estrogênios, anticoncepcionais orais e esteroides anabólicos.

BEZAFIBRATO

Drágea ou Comprimido 200 mg (VO)
Comprimido de Desintegração Lenta 400 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antilipemiante e Ácido fíbrico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido de 200mg – 62 comprimidos.

Comprimido de 400mg – 31 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E78.0; E78.1; E78.2; E78.3; E78.4; E78.5; E78.6; E78.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: perda de apetite, distensão do estômago, náuseas transitórias que não requerem a suspensão do tratamento e interrupção do transporte da bile.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: leve aumento da creatinina sérica, aumento da fosfatase alcalina sérica, aumento das transaminases, cálculo biliar e aumento da gama-glutamiltransferase.

Sistema Hematopoiético: aumento do número de plaquetas.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fraqueza muscular, dores musculares, cãimbras e degeneração muscular.

Sistema Nervoso: tontura e dor de cabeça.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: insuficiência renal aguda.

Sistema Reprodutor/Urinário: impotência sexual no homem.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: coceira, urticária, sensibilidade à luz, reações de hipersensibilidade, perda dos cabelos, síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, necrólise epidérmica tóxica e púrpura trombocitopênica.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: anticoagulantes cumarínicos (Acenocumarol, Biscumacetato de etila e Cumatetralil), sulfonilureias, Insulina, Maleato de Perexilina, inibidores de MAO e Glibenclamida.

BIMATOPROSTA
Solução oftálmica 0,3 mg/mL (TO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente oftálmico, Antiglaucoma e Prostaglandina oftálmica.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 1 frasco.

CID 10 – MEDICAMENTO: H40.1; H40.2; H40.3; H40.4; H40.5; H40.6; H40.8; Q15.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Pele e Anexos: aumento gradativo do crescimento em comprimento e espessura, além de escurecimento dos cílios, escurecimento das pálpebras e escurecimento da íris.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

BIPERIDENO
Comprimido 2 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente colinérgico e Agente antiparkinsoniano.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.
Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: taquicardia e bradicardia.

Sistema Digestório: boca seca, constipação, náuseas e transtornos gástricos.

Sistema Endócrino: diminuição da sudorese.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: cansaço.

Sistema Nervoso: alterações psiquiátricas, redução da fase do sono, agitação, confusão, ansiedade, excitação, euforia, delírios, alucinações, insônia, transtornos ocasionais de memória, ataxia e convulsões.

Sistema Oftálmico: midríase com fotofobia e transtorno de acomodações visuais.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: retenção urinária.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash cutâneo, erupção cutânea e hipersensibilidade.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: anticolinérgicos, Carbidopa, antimuscarínicos, Levodopa, Quinidina, antiácidos, antidiarreicos e depressores do sistema nervoso central.

BOCEPREVIR
Cápsula 200 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Inibidor de protease.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 372 cápsulas.

CID 10 – MEDICAMENTO: B18.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: diarreia, boca seca, disgeusia (alteração do paladar), náusea, vômito e diminuição do apetite.

Sistema Endócrino: anemia.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artralgia, mialgia, astenia, calafrios e fadiga.

Sistema Nervoso: ansiedade, depressão, insônia, irritabilidade, tontura, febre e cefaleia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: tosse e dispneia.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: alopécia, pele seca, prurido e erupção cutânea.

Outros: doença tipo influenza e redução do peso.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Midazolam, Triazolam, Bepridilo, Pimozida, Lumefantrina, Halofantrina, inibidores da tirosina cinase, Sinvastatina, derivados da Ergotamina, Amiodarona, Quinidina, Pentamidina e alguns neurolépticos.

BOSENTANA

Comprimido 125 mg (VO)
Comprimido 62,5 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antagonista da Endotelina e Vasodilatador.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 62 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: I27.2; I27.0; I27.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo,

Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipotensão.

Sistema Digestório: vômito e náusea.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: alterações na função hepática, pele e olhos amarelados (icterícia).

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia e febre.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: infecção do trato respiratório superior e nasofaringite.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rubor.

Outros: edema dos membros inferiores.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Ciclosporina, Tacrolimo, Sirolimo, Itraconazol, Ritonavir, Rifampicina e anticoncepcionais.

BRIMONIDINA TARTARATO
Solução Oftálmica 0,2% (TO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente oftálmico, Antiglaucoma e Agonista alfa 2.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 2 frascos.

CID 10 – MEDICAMENTO: H40.1; H40.2; H40.3; H40.4; H40.5; H40.6; H40.8; Q15.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: palpitações/arritmias (incluindo bradicardia ou taquicardia).

Sistema Digestório: boca seca, alterações do paladar e sintomas gastrointestinais.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fadiga e astenia (fraqueza muscular).

Sistema Nervoso: dor de cabeça, tontura, síncope e depressão.

Sistema Oftálmico: hiperemia nos olhos, ardor nos olhos, pontada

nos olhos, visão borrada, sensação de corpo estranho nos olhos, foliculose na conjuntiva, reações alérgicas oculares, prurido nos olhos, erosão da córnea, fotofobia, eritema da pálpebra, dor nos olhos, secura dos olhos, lacrimejamento, edema na pálpebra, edema conjuntival, blefarite, irritação nos olhos, clareamento da conjuntiva, visão anormal, papilas conjuntivais, secreção ocular, irite, iridociclite, miose, conjuntivite, prurido nas pálpebras e hipersensibilidade.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: sintomas no trato respiratório superior.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: reações na pele incluindo eritema, edema facial, prurido e rash cutâneo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: beta-bloqueadores (Propranolol, Acebutolol, Betaxolol, Bisoprolol, Esmolol, Atenolol, Labetalol, Carvedilol, Metoprolol e Nebivolol), glicosídeos cardíacos (Ouabaína, Digitoxina e Metildigoxina), antidepressivos (Iproniazida, Asocarboxazida, Nialamida, Fenelzina, Tranilcipromina e Selegilina) e depressores do sistema nervoso central (Álcool, barbitúricos,

BRINZOLAMIDA
Solução Oftálmica 1,0% (TO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente oftálmico, Antiglaucoma e Inibidor da anidrase carbônica.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 2 frascos.

CID 10 – MEDICAMENTO: H40.1; H40.2; H40.3; H40.4; H40.5; H40.6; H40.8; Q15.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: dor no peito.

Sistema Digestório: sabor amargo, ácido ou incomum na boca, diarreia, enjoos, secura na boca náuseas e faringite.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: dor de cabeça.

Sistema Oftálmico: visão embaçada, blefarite, dermatite, olho seco, sensação de corpo estranho no olho, hiperemia, secreção e incômodo ocular, ceratite, dor, prurido e rinite ocular, conjuntivite fadiga ocular, hipertonia, ceratoconjuntivite, ceratopatia sensação de olho grudado ou crostas nas pálpebras e lacrimejamento.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: dispneia.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: alopécia e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

BROMOCRIPTINA
Comprimido 2,5 mg (VO)
Comprimido 5 mg (VO) – Item excluído da Tabela de Procedimentos SUS

CLASSIFICAÇÃO: Agente antiparkinsoniano e Agonista da Dopamina.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 868 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E22.1; G20.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipotensão, especialmente ao levantar, inclusive podendo levar ao desmaio e batimento cardíaco acelerado, lento ou irregular.

Sistema Digestório: constipação, vômito, secura da boca, diarreia e dor no estômago ou abdômen.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: discinesia (dificuldade no desempenho dos movimentos voluntários), cansaço e

cãimbras nas pernas.

Sistema Nervoso: dor de cabeça, sonolência, vertigem, confusão, agitação psicomotora, alucinações (visão, audição, olfato ou sensação de coisas que não estão ali), desordens psicóticas psíquicas, distúrbios do sono (insônia), formigamento ou entorpecimento das mãos ou pés (parestesia), zumbido nos ouvidos e sonolência excessiva durante o dia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: aumento do interesse sexual.

Sistema Respiratório: congestão nasal e diminuição da frequência respiratória ou dificuldade em respirar.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: reações alérgicas na pele, queda de cabelo, dedos das mãos e dos pés pálidos, quando expostos ao frio.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: antibióticos macrolídeos (Eritromicina), Octreotida, inibidores de proteases (Ritonavir, Nelfinavir, Indinavir e Delavirdina), (Cetoconazol, Itraconazol e Voriconazol) e antagonistas de dopamina.

BROMOPRIDA
Solução Oral 4 mg/mL (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiemético e Procinético.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa de Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para E84; E84.0; E84.1; E84.8; E84.9.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipotensão.

Sistema Digestório: diarreia e cólica intestinal.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: calafrios e espasmos musculares localizados.

Sistema Nervoso: sonolência, cefaleia, astenia e sintomas extrapiramidais.

Sistema Oftálmico: distúrbios de acumulação ocular.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: derivados atropínicos e Bromperidol.

BUDESONIDA
Cápsula 200 mcg (VO)
Cápsula 400 mcg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Corticosteroide.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Cápsulas de 200mcg – 248 cápsulas.

Cápsulas de 400mcg – 124 cápsulas.

CID 10 – MEDICAMENTO: J45.0; J45.1; J45.8; J44.0; J44.1; J44.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: faringite, boca seca, náusea, epistaxe, ulcerações (lesões) da membrana da mucosa, perfuração do septo nasal, vômitos e diarreia ou constipação.

Sistema Endócrino: aumento dos níveis de glicose no sangue.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: distonia.

Sistema Nervoso: nervosismo, agitação, depressão, insônia, febre, dores de cabeça, supressão da função hipotalâmica pituitária-adrenal e redução da velocidade do crescimento em crianças.

Sistema Oftálmico: aumento da pressão intraocular, catarata, conjuntivite e glaucoma.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: alteração do ciclo menstrual e sangramento anal.

Sistema Respiratório: aumento da tosse e dispneia.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: irritação cutânea transitória ao redor do nariz, dermatite perinasal urticária, exantema, dermatite angioedema e prurido.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Cetoconazol.

CABERGOLINA
Comprimido 0,5 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antiparkinsoniano.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 310 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E22.0; E22.1.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: naúsea.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: tontura e dor de cabeça.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: bloqueadores dopaminérgicos, Fenotiazina, Tioxantina e Prometazina.

CALCIPOTRIOL
Pomada 50 mcg/g (Tópico)

CLASSIFICAÇÃO: Análogo da Vitamina D.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 15 bisnagas.

CID 10 – MEDICAMENTO: L40.0; L40.1; L40.4; L40.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: coceira, irritação na pele e sensação de queimação.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

CALCITONINA

Solução Injetável 50 UI (IV, SC, IM)
Solução Injetável 100 UI (IV, SC, IM)
Spray Nasal 200 UI (VN)

CLASSIFICAÇÃO: Antídoto e Hormônio.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada:

Ampola de 50UI – 62 ampolas.

Ampola de 100UI – 31 ampolas.

Spray Nasal – 3 frascos.

CID 10 – MEDICAMENTO: M80.0; M80.1; M80.2; M80.3; M80.4; M80.5; M80.8; M81.0; M81.1; M81.2; M81.3; M81.4; M81.5; M81.6; M81.8; M82.0; M82.1; M82.8; M88.0; M88.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náusea e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dor nas costas.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: rinite e sintomas nasais (apenas via nasal).

Local de Aplicação: reação no local da aplicação (apenas via injetável).

Pele e Anexos: vermelhidão no rosto, nas orelhas, mãos e pés.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: fórmulas contendo cálcio e vitamina D.

CALCITRIOL
Cápsula 0,25 mcg (VO)
Solução Injetável 1,0 mcg (EV)

CLASSIFICAÇÃO: Análogo da Vitamina D.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Cápsula de 0,25mcg – 372 cápsulas.

Ampola de 1mcg – 30 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: Calcitriol 0,25mg: E20.0; E20.1; E20.8; E55.0; E55.9; E64.3; E83.3; E89.2; M80.5; M81.5; M83.0; M83.1; M83.2; M83.3; M83.8; M80.0; M80.1; M80.2; M80.3; M80.4; M80.8; M81.0; M81.1; M81.2; M81.3; M81.4; M81.6; M81.8; M82.0; M82.1; M82.8; N18.0; N18.8; N25.0; N25.8. Para Calcitriol 1,0mg: N18.0; N18.8; N25.0; N25.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náusea, vômito, secura na boca, constipação e gosto metálico.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: elevação da TGO e da TGP.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fraqueza e dor muscular.

Sistema Nervoso: cefaleia e sonolência.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: elevação da ureia e albuminúria.

Sistema Reprodutor/Urinário: diminuição da libido.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Álcool e diuréticos.

CAPTOPRIL
Comprimido 25 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Inibidor da enzima conversora de angiotensina.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: tosse seca, persistente e não produtiva.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: urticária e erupções na pele.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Álcool, diuréticos, Carbonato de lítio e Clorpromazina.

CARBAMAZEPINA
Comprimido 200 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anticonvulsivante.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Medicamento com baixo índice terapêutico.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náusea.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: dor de cabeça, sonolência e tontura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Cimetidina, Danazol, Diltiazem, Verapamil, Ácido Valproico, Doxiciclina, Felbamato, Haloperidol, anticoncepcional hormonal, Fenitonina, Teofilina, Topiramato, Valproato, Varfarina, Lamotrigina, Fenobarbital, Fenitoína, inibidores da monoamina-oxidase, Cetoconazol, Ciclosporina, Etossuximida, Isoniazida, Mebendazol e Metadona.

CARBONATO DE LITIO
Comprimido 300 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antipsicótico, Antidepressivo e Estabilizador do humor.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Medicamento com baixo índice terapêutico.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náusea e sede.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: tremores das mãos.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: aumento da frequência ou incontinência urinária.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: inibidores da ECA, Aminofilina, Bicarbonato de Sódio, anti-inflamatórios não-esteroides e diuréticos tiazídicos.

CEFALEXINA
Comprimido 500 mg (VO)
Suspensão Oral 2,5% (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antibiótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: sintomas de colite pseudomembranosa podem aparecer durante ou após o tratamento com antibióticos, náuseas e vômitos têm sido relatados raramente. A reação adversa mais frequente tem sido a diarreia, sendo raramente grave o bastante para determinar a cessação da terapia. Tem também ocorrido dispepsia, dor abdominal e gastrite.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: elevações moderadas da transaminase glutâmico-oxalacética no soro (TGO) e transaminase glutâmico-pirúvica no soro (TGP).

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: eosinofilia, neutropenia, trombocitopenia e anemia hemolítica.

Sistema Muscular e Esquelético: artralgia, artrite e doenças articulares.

Sistema Nervoso: tonturas, fadiga e dor de cabeça, agitação,

confusão e alucinações.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: prurido anal e genital, monilíase genital, vaginite e corrimento vaginal.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: reações alérgicas na forma de erupções cutâneas, urticária, angioedema e raramente eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, ou necrólise tóxica epidérmica. Essas reações geralmente desaparecem com a suspensão da droga.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Probenicida e diuréticos de alça.

CERTOLIZUMABE PEGOL
Solução Injetável 200 mg/mL (SC)

CLASSIFICAÇÃO: Agente bloqueador do fator de necrose tumoral e Agente gastrointestinal.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 3 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: M05.0; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipertensão, cardiomiopatias, perturbações isquêmicas da artéria coronária, arritmias, palpitações, hemorragia, hipercoagulação (incluindo embolia pulmonar), síncope, edema, equimoses, pericardite, bloqueio auriculoventricular, acidente vascular cerebral, arteriosclerose, fenômeno de Raynaud e telangiectasias.

Sistema Digestório: náuseas, ascite, ulceração, perfuração gastrointestinal, estomatite, distensão abdominal, secura orofaríngea, odinofagia, hipermotilidade, alterações do apetite e peso.

Sistema Endócrino: doenças da tireoide.

Sistema Hepático: hiperbilirrubinemia, hepatite, hepatopatia, colestase e colelitíase.

Sistema Hematopoiético: alterações eosinofílicas, leucopenia, anemia, linfadenopatia, trombocitopenia, trombocitose, eritrocitose, esplenomegalia e morfologia de leucócitos anômala.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: anomalias musculares e aumento da creatina fosfoquinase.

Sistema Nervoso: cefaleia, alterações sensoriais, neuropatias periféricas, tonturas, tremores, convulsões, inflamação do nervo craniano, alteração da coordenação ou equilíbrio, perturbações da ansiedade e do humor.

Sistema Oftálmico: alterações visuais, inflamação dos olhos, das pálpebras e perturbação da secreção lacrimal.

Sistema Renal: nefropatia e comprometimento renal.

Sistema Reprodutor/Urinário: sangue na urina, sintomas na

bexiga e uretra, alterações do ciclo menstrual, das hemorragias uterinas (incluindo amenorreia), afecções mamárias e disfunção sexual.

Sistema Respiratório: asma, derrame pleural, inflamação, tosse, congestão do trato respiratório, doença pulmonar intersticial e pneumonite.

Local de Aplicação: pirexia, dor, astenia, prurido, reações no local da injeção e fístula.

Pele e Anexos: erupção cutânea, alopécia, agravamento da psoríase, dermatites, anomalias das glândulas sudoríparas, úlcera cutânea, fotossensibilidade, acne, descoloração da pele, afeções da unha, exfoliação e descamação cutânea, afeções bolhosas e alteração da textura capilar.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Corticosteroides, anti-inflamatórios não-esteroides (AINE) e analgésicos.

CETOCONAZOL
Pomada 20 mg/g (TÓPICO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antifúngico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Especialidades.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: enjoo, náusea, vômito, dor abdominal e diarreia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: dor de cabeça, tontura, sensibilidade à luz forte, sensação de formigamento nos dedos das mãos e dos pés.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: diminuição no número de plaquetas, inchaço das mamas, impotência masculina e distúrbios menstruais.

Sistema Respiratório: sensação de falta de ar.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: vermelhidão da pele ou urticária e coceira.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: medicamentos para enxaqueca (Ergotamina e Diidroergotamina), medicamentos para tuberculose (Rifampicina, Rifabutina e Isoniazida), medicamentos para epilepsia (Carbamazepina e Fenitoína), medicamentos que agem no coração e vasos sanguíneos, medicamentos que diminuem a coagulação sanguínea, Ciclosporina, Tacrolimo, Sirolimo, Nevirapina, Sildenafil, Trimetrexato, Atorvastatina, Cilostazol, Eletriptano, Repaglinida e Tolterodina.

CICLOFOSFAMIDA
Drágea 50 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antineoplásico e Agente alquilante.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 186 drágeas.

CID 10 – MEDICAMENTO: D59.0; D59.1; D60.0; D69.3; M34.0; M34.1; M34.8; L93.0; L93.1; M32.1; M32.8; N04.0; N04.1; N04.2; N04.3; N04.4; N04.5; N04.6; N04.7; N04.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: cardiotoxicidade foi observada em alguns pacientes recebendo altas doses de Ciclofosfamida administradas por um período de poucos dias. Em poucos casos com altas doses de Ciclofosfamida, ocorreu insuficiência cardíaca congestiva severa e algumas vezes fatal poucos dias após a primeira dose da droga.

Sistema Digestório: anorexia, náuseas, vômitos, colite hemorrágica, ulceração da mucosa oral e icterícia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: leucopenia, trombocitopenia e anemia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: supressão gonadal, resultando em amenorreia ou azoospermia e fibrose do ovário.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: barbitúricos, Alopurinol, antidiabéticos, Suxametônio, anticoagulantes e Citarabina.

CICLOSPORINA

Cápsula 10 mg (VO)
Cápsula 25 mg (VO)
Cápsula 50 mg (VO)
Cápsula 100 mg (VO)
Solução Oral 100 mg/mL (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente imunossupressor.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Cápsula de 10mg e 25mg - 496 cápsulas.

Cápsula de 50mg – 744 cápsulas.

Cápsula de 100mg – 372 cápsulas.

Solução Oral – 8 frascos.

CID 10 – MEDICAMENTO: D59.0; D59.1; D60.0; D61.0; D61.1; D61.2; D61.3; D61.8; G70.0; H30.0; H30.1; H30.2; H30.8; K51.0;

K51.1; K51.2; K51.3; K51.4; K51.5; K51.8; L40.0; L40.1; L40.4; L40.8; L93.0; L93.1; M05.1; M05.2; M07.0; M07.3; M08.0; M32.1; M32.8; M33.0; M33.1; M33.2; N04.0; N04.1; N04.2; N04.3; N04.4; N04.5; N04.6; N04.7; N04.8; T86.1; T86.4; Z94.0; Z94.1; Z94.2; Z94.3; Z94.4; Z94.8;

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipertensão.

Sistema Digestório: diarreia, anorexia, náusea e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: tremor.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: disfunção renal.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: vacinas vivas, barbitúricos, Carbamazepina, Oxcarbazepina, Fenitoína, Nafcilina, Sulfadimidina I.V., Rifampicina, Octreotida, Probucol, Hypericum perforatum (Erva de São João), Ticlopidina, Sulfimpirazona, Terbinafina, Bosentana,

antibióticos macrolídeos, Cetoconazol, Fluconazol, Itraconazol, Voriconazol, Diltiazem, Nicardipina, Verapamil, Metoclopramida, anticoncepcionais orais, Danazol, Metilprednisolona (doses elevadas), Alopurinol, Amiodarona, Ácido Cólico e derivados, inibidores de protease, Imatinibe, Colchicina, Nefazodona, Tacrolimo, Diclofenaco, Bosentana, Digoxina, Fenobarbital, Lovastatina, Metotrexato, Ranitidina e Sulfametoxazol+Trimetoprima.

CIMETIDINA
Comprimido 200 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antagonista H2 da Histamina.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: bradicardia sinusial, taquicardia, bloqueio cardíaco e vasculite de hipersensibilidade.

Sistema Digestório: diarreia leve e transitória.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: hepatite e pancreatite.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cansaço, tontura, confusão mental, alucinação, depressão e febre.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nefrite intersticial.

Sistema Reprodutor/Urinário: ginecomastia e galactorreia.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: anafilaxia e erupções cutâneas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: anticoagulantes, Fenitoína, Teofilina, Metoprolol, Propranolol, Nifedipino, Carbamazepina e Cloroquina.

CINARIZINA
Comprimido 75 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiemético.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Especialidades.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: desconforto estomacal, vômito, dor abdominal superior e dispepsia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fadiga.

Sistema Nervoso: hipersonia e letargia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: hiperidrose.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: álcool, depressores do sistema nervoso central e antidepressivo tricíclico.

CIPROFIBRATO
Comprimido 100 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antilipemiante e Ácido fíbrico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 31 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E78.0; E78.1; E78.2; E78.3; E78.4; E78.5; E78.6; E78.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náuseas, vômitos, dispepsia e diarreia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: mialgia e rabdomiólise.

Sistema Nervoso: cefaleia e vertigem.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupção, prurido e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Varfarina e inibidores da HMG CoA Redutase.

CIPROFLOXACINO
Comprimido 500 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antibiótico quinolona de segunda geração.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa de Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para E84; E84.0; E84.1; E84.8; E84.9.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: diarreia, vômito, dispepsia, dor abdominal, náusea e perda do paladar.

Sistema Endócrino: aumento do colesterol, glicose e triglicerídeos.

Sistema Hepático: aumento do TGO/TGP e necrose hepática.

Sistema Hematopoiético: agranulocitose, albuminúria, anemia e anemia hemolítica.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artalgia, mialgia, parestesia e tremores.

Sistema Nervoso: tontura, insônia, nervosismo, sonolência, febre, agitação e cefaleia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: renite.

Local de Aplicação: reação no local da injeção.

Pele e Anexos: rash cutâneo, necrólise epidérmica e reações alérgicas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Tizanidina, cafeína, Glibenclamida, Ropivacaína, substratos da CYP1A2, Teoflina, Varfarina, Pentoxifilina, antiácidos, suplementos eletrolíticos orais, Quinapril, Sucralfato, Didanosina, outros medicamentos orais altamente tamponados, Sevelâmer e Fenitoina.

CIPROTERONA ACETATO
Comprimido 50 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiandrogênico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 21 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E22.8; E25.0; E28.0; E28.2; L68.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: acidente vascular, choque, hemorragia, hipotensão arterial, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, síncope, taquicardia e trombose (TVP e trombose da veia retiniana).

Sistema Digestório: anorexia, constipação, diarreia, dispepsia, glossite, náusea, pancreatite e vômito.

Sistema Endócrino: balanço nitrogenado negativo, diabetes, fogachos, galactorreia, ganho ou perda de peso, ginecomastia, hipercalcemia, hiperglicemia, hiperplasia nodular benigna da mama, impotência, inibição da espermatogênese e supressão adrenal (relacionada à dose).

Sistema Hepático: ascite, aumento de transaminases, carcinoma hepático, cirrose, coma hepático, disfunção hepática (relacionada à dose), hepatite, hepatoma, hepatomegalia, icterícia colestática, insuficiência hepática e necrose hepática.

Sistema Hematopoiético: anemia, anemia hemolítica, aumento de fibrinogênio, leucocitose, leucopenia, redução do TP e trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fraqueza, miastenia e osteoporose.

Sistema Nervoso: aumento da libido, cefaleia, depressão, encefalopatia, fadiga, fraqueza, prostração e tontura.

Sistema Oftálmico: acomodação visual anormal, atrofia óptica, cegueira, distúrbios retinianos, neurite óptica e visão anormal.

Sistema Renal: aumento da creatinina sérica e insuficiência renal.

Sistema Reprodutor/Urinário: aumento da frequência miccional, carcinoma de bexiga e hematúria.

Sistema Respiratório: asma, broncoespasmo, embolia pulmonar, fibrose pulmonar e tosse.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: alteração da cor da pele, dermatite esfoliativa, eczema, eritema nodoso, esclerodermia, fotossensibilidade, hirsutismo, perda irregular da pilificação, prurido, rash cutâneo, ressecamento da pele (redução do sebo) e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Cetoconazol, Itraconazol, Clotrimazol e Ritonavir.

CLOBAZAM

Comprimido 10 mg (VO)
Comprimido 20 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Benzodiazepínico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado –

Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista B1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido de 10mg – 124 comprimidos

Comprimido de 20mg – 62 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G40.0; G40.1; G40.2; G40.3; G40.4; G40.5; G40.6; G40.7; G40.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: ganho de peso, constipação, náusea e xerostomia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: redução da contagem leucocitária e outras anormalidades hematológicas foram raramente associadas a benzodiazepínicos.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: espasmos musculares.

Sistema Nervoso: depressão, sonolência, ataxia, tontura, distúrbio comportamental, amnésia anterógrada, confusão mental, fala desarticulada, letargia e tremores.

Sistema Oftálmico: turvamento da visão.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: prurido, rash cutâneo e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: analgésicos, narcóticos, antidepressivos cíclicos, anti-histamínicos, barbituratos, etanol, fenotiazinas, inibidores da MAO, Delavirdina, Fluconazol, Fluvoxamina, Omeprazol, Ticlopidina, antifúngicos azólicos, Claritromicina, Doxiciclina, Eritromicina, Imatinibe, inibidores da protease, Nefazodona, Nicardipino, Propofol, Quinidina e Telitromicina.

CLOBETASOL
Creme 0,5 mg/g (TÓPICO)
Solução Capilar 0,5 mg/g (TÓPICO)

CLASSIFICAÇÃO: Corticosteroide.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Creme - 8 bisnagas.

Solução Capilar - 5 frascos.

CID 10 – MEDICAMENTO: L40.0; L40.1; L40.4; L40.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: hiperglicemia, glicosúria e supressão da hipófise-adrenal.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: Síndrome de Cushing, estrias, adelgaçamento da pele e dilatação dos vasos sanguíneos superficiais.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

CLOMIPRAMINA
Comprimido 25 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antidepressivo tricíclico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: taquicardia sinusal, palpitações, hipotensão postural, alterações clinicamente irrelevantes do ECG em pacientes sem doença cardíaca (ex: alterações da onda T e do segmento ST), arritmias e aumento da pressão arterial.

Sistema Digestório: secura da boca, constipação, náusea, vômito, distúrbios abdominais, diarreia e anorexia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: elevação do nível das transaminases e hepatite com ou sem icterícia.

Sistema Hematopoiético: eosinofilia, leucopenia, agranulocitose, trombocitopenia e púrpura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: sonolência, fadiga, sensação de inquietação, aumento do apetite, confusão, desorientação, alucinações (particularmente em pacientes idosos e em pacientes portadores da doença de Parkinson), estados de ansiedade, agitação, distúrbios do sono, mania, hipomania, agressividade, déficit de memória, despersonalização, agravamento da depressão, dificuldade de concentração, insônia, pesadelos, bocejos, ativação de sintomas psicóticos, vertigens, tremores, cefaleia, mioclonia, delírio, distúrbios da fala, parestesia, fraqueza muscular e hipertonia muscular, convulsões e ataxia.

Sistema Oftálmico: alterações da acomodação visual e/ou visão borrada.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: galactorreia, aumento do volume das mamas, distúrbios da micção, distúrbios da libido e da potência.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: sudorese, reações alérgicas na pele [erupção cutânea (rash) e urticária], fotossensibilidade, prurido, edema (local ou generalizado) e perda de cabelo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: agentes anticolinérgicos, Fenotiazina, agentes antiparkinsonianos, anti-histamínicos, atropina, Biperideno, barbitúricos, benzodiazepínicos, anestésicos gerais, diuréticos, inibidores da MAO, agentes serotonérgicos, Adrenalina, Noradrenalina, Isoprenalina, Efedrina, Fenilefrina, Quinidina, Propafenona, Metilfenidato, Codeína e Rifampicina.

CLONAZEPAM
Comprimido 2 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Benzodiazepínico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista B1 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: aumento da salivação e náuseas.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fadiga.

Sistema Nervoso: sonolência, dor de cabeça, depressão, diminuição da concentração, inquietação, estado confusional e desorientação, excitabilidade, irritabilidade, agressividade, agitação, nervosismo, hostilidade, ansiedade, distúrbios do sono, pesadelos, tontura e sonos anormais.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: diminuição na libido.

Sistema Respiratório: aumento das secreções brônquicas e infecção do trato respiratório superior.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupção cutânea, prurido, urticária e perda de cabelo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Ácido Valproico, Divalproato de Sódio, Clozapina e Ranitidina.

CLOPIDOGREL
Comprimido 75 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antiplaquetário.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 31 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: I20.0; I20.1; I21.0; I21.1; I21.2; I21.3; I21.4; I21.9; I22.0; I22.1; I22.8; I22.9; I23.0; I23.1; I23.2; I23.3; I23.4; I23.5; I23.6; I23.8; I24.8; I24.9; I24.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: indigestão, dor abdominal, diarreia, enjoo, gastrite, flatulência, prisão de ventre, vômito, úlcera gástrica e úlcera duodenal.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: leucopenia e decréscimo do número de plaquetas.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: parestesia.

Sistema Nervoso: dor de cabeça e tontura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupção na pele e coceira.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: AAS (ácido acetilsalicílico), Ibuprofeno, Indometacina, Piroxicam, Meloxicam e todos os AINES não citados, gengibre, ginkgo biloba, ginseng, Tanaceto, Heparina,

Varfarina, Omeprazol, Ranitidina, Pantoprazol, Abciximabe, Cilostazol, Tirofibano, Dalterapina e Enoxaparina.

CLORANFENICOL
Comprimido 250 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antibiótico de ação sistêmica.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: diarreia, enterocolite, estomatite, glossite, náusea e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: anemia aplástica, anemia hipoplásica, granulocitopenia, pancitopenia e trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia, confusão mental, delírio, depressão e febre.

Sistema Oftálmico: neurite óptica.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: angioedema, rash cutâneo e urticária.

Outros: "síndrome cinza", que é caracterizada por colapso circulatório, cianose, ácidose, distensão abdominal, depressão miocárdica, coma e morte.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Clorpropamida, anticoagulantes orais, Fenobarbital e Rifampicina.

CLORETO DE SÓDIO 0,9%
Ampola 10 mL (VP)

CLASSIFICAÇÃO: Eletrólito.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa de Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para E84; E84.0; E84.1; E84.8; E84.9.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre reações adversas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

CLOROQUINA FOSFATO
Comprimido 150 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antimalárico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado –

Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 186 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: L93.0; L93.1; M05.0; M32.1; M 32.8; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8; M08.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipertensão, arritmias e colapso cardiovascular.

Sistema Digestório: vômitos e diarreia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia, convulsões e depressão.

Sistema Oftálmico: distúrbios visuais e visão dupla.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: prurido, urticária e erupções purpúricas na pele.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Amiodarona, Ampicilina, Carbonato de Cálcio, Cimetidina, Colestiramina, Clorpromazina, Fenilbutazona, Halofantrina, Hidroxizina, Levotiroxina, Mefloquina,

Praziquantel, Pectina, Ranitidina, sais de alumínio, Valproato de Sódio e vacinas.

CLORPROMAZINA
Comprimido 25 mg (VO)
Comprimido 100 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antipsicótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.
Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: queda de pressão e arritmia.

Sistema Digestório: boca seca, prisão de ventre e ganho de peso.

Sistema Endócrino: intolerância à glicose e hiperglicemia.

Sistema Hepático: icterícia colestática, tromboembolismo venoso, lesão hepática, incluindo casos de embolismo pulmonar e trombose venosa profunda.

Sistema Hematopoiético: leucopenia, agranulocitose e sintomas extrapiramidais.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: sonolência e sedação.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: impotência, frigidez, retenção urinária e alterações menstruais.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: alterações na pele ou alergias.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Amiodarona, Claritromicina, Enflurano, Fluconazol, Haloperidol, Isoflurano, Levofloxacino, Risperidona, Quetiapina, Ziprasidona, Sotalol, Tamoxifeno, Amitriptilina, Atropina, Anfepramona, Fluoxetina, Paroxetina, Moxifloxacino, Tramadol, Atenolol, Metoprolol, Propranolol, Timolol, Ácido Valproico, Captopril, Enalapril, Álcool, Tabaco, Anlodipino, Isradipino, Sultoprida, Óxidos, Hidróxidos de magnésio, Hidróxidos de alumínio, Hidróxido de cálcio, Gliclazida, Metformina e Levodopa.

CLOZAPINA

Comprimido 25 mg (VO)
Comprimido 100 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antipsicótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido de 25mg – 992 comprimidos.

Comprimido de 100mg – 248 comrpimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: F20.0; F20.1; F20.2; F20.3; F20.4; F20.5; F20.6; F20.8; F25.0; F25.1; F25.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: taquicardia, miocardite, pericardite, hipertensão e hipotensão postural.

Sistema Digestório: ganho de peso, constipação, náusea, vômito, boca seca e cetoácidose.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: redução dos glóbulos brancos.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: inquietação, agitação, sonolência, sedação, vertigem, visão borrada, dor de cabeça, tremor, rigidez, acatisia, confusão, fadiga e delírios.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Álcool, Fenelzina, Iproniazida, Isocarboxazida, Harmalina, Nialamida, Pargilina, Selegelina, Toloxatona, Tranilcipromina, Brofaromina, Moclobemida,

Midazolam, Bromazepam, Metoclopramida, Tioridazina, Cloxazolam, Clonazepam, Clobazam, Alprazolam, Nitrazepam, Fluoxetina, Dexclorfeniramina, Loratadina, Triexifenidil, Diciclomina, Ácido Valproico, Fenitoína, Omeprazol, Nicotina, Eritromicina, Fluvoxamina, Cafeína e Paroxetina.

CODEÍNA

Comprimido 30 mg (VO)
Comprimido 60 mg (VO)
Solução Injetável 30 mg/mL (EV)
Solução Oral 3 mg/mL (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Analgésico, Opióde e Antitussígeno.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista A2 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido de 30mg – 744 comprimidos.

Comprimido de 60mg – 372 comprimidos.

Solução Oral – 6 frascos.

Ampola – 186 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: R52.1; R52.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: diminuição da pressão arterial.

Sistema Digestório: perda de apetite, náusea, vômito, constipação e secura na boca.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: rigidez muscular.

Sistema Nervoso: tontura, desmaios, convulsões, alucinações, depressão mental, sonolência, visão dupla, confusão, perturbação do sono, pesadelo e alteração na pulsação.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: broncoespasmos.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupção cutânea e face avermelhada.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Álcool, Alfentanila, Meperidina, Metadona, Fentanila, Morfina, Hidrocodona, Oxicodona, Pentazocina, Hodromorfona, Propoxifeno, Dexclorfeniramina, Enelzina, Iproniazida, Isocarboxazida, Harmalina, Nialamida, Pargilina, Toloxatona, Tranilcipromina, Paroxetina, Brofaromina, Atropina, Moclobemida, Clomipramina, Imipramina, Fluoxetina, Nefazodona, Venlafaxina, Benactizina, Ipatropio, Butilprometo de Escopolamina, Diciclomina, Homatropina, Triexifenidil e Tropicamida.

COLIMICINA, SULFATO
Solução Injetável 100 mg (IV)

CLASSIFICAÇÃO: Antibiótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nefrotoxicidade e efeitos adversos relacionados à função renal, têm sido relatados, geralmente após o uso de doses mais altas do que as recomendadas em pacientes com função renal normal ou em caso de falha em reduzir a dosagem em pacientes com comprometimento renal ou durante o uso concomitante de outros antibióticos nefrotóxicos.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Amicacina, Netilmicina, antibióticos aminoglicosídeos e cefalosporínicos.

COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE FENILCETONURICO

Pó Liofilizado para menores de 1 ano (VO)
Pó Liofilizado para maiores de 1 ano (VO)
Pó Liofilizado para maiores de 8 anos (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Produto nutricional.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Pó Liofilizado para < de 1 ano - 1550 gramas.

Pó Liofilizado para > de 1 ano e > de 8 anos – 3617 gramas.

CID 10 – MEDICAMENTO: E70.0; E70.1.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Campinas e Guarulhos.

REAÇÕES ADVERSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre reações adversas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

DANAZOL

Comprimido 50 mg (VO) – Item excluído da Tabela de Procedimentos SUS
Cápsula 100 mg (VO)
Cápsula 200 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Androgênico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Cápsula de 100mg – 248 comprimidos.

Cápsula de 200mg – 124 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: D84.1; N80.0; N80.1; N80.2; N80.3; N80.4; N80.5; D69.3; L93.0; L93.1; M32.1; M32.8; N80.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: espinhas, pêlos na face e pêlos ou cabelos gordurosos.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: anticoagulante oral, Tacrolimo, Sirolimo, Carbamazepina e Ciclosporina.

DEFERASIROX

Comprimido 125 mg (VO)
Comprimido 250 mg (VO)
Comprimido 500 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente Quelante e Antídoto.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido de 125mg – 992 comprimidos.

Comprimido de 250mg – 496 comprimidos.

Comprimido de 500mg – 248 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E83.1; T45.4.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: diarreia, dor abdominal, náusea e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: dor de cabeça e febre.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: dor de garganta, irritação no nariz e garganta e tosse.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: antiácido contendo alumínio e quelante de ferro.

DEFERIPRONA
Comprimido 500 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente Quelante e Antídoto.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 620 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E83.1; T45.4.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náusea, vômito, gastralgia e aumento do apetite.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: aumento da alaninoaminotransferase (ALT).

Sistema Hematopoiético: agranulocitose e neutropenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artropatias.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: urina avermelhada ou marrom.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Interferona, Cloranfenicol, Aminopirina e Fenilbutazona.

DESFERROXAMINA
Solução Injetável 500 mg (SC, IV e IM)

CLASSIFICAÇÃO: Agente Quelante e Antídoto.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 372 ampolas

CID 10 – MEDICAMENTO: E83.1; N25.0; T45.4.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: pressão baixa, aumento dos batimentos cardíacos e inchaço.

Sistema Digestório: desconforto abdominal, dor abdominal, diarreia, náusea e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: diminuição dos glóbulos brancos e plaquetas no sangue.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: cãimbras nos membros inferiores.

Sistema Nervoso: febre, tontura, convulsão, vertigem e dor de cabeça.

Sistema Oftálmico: catarata, cegueira noturna, pigmentação na retina, problema de visão e visão borrada.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: disúria.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: vermelhidão, erupção na pele e urticária.

Outros: problema de audição.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Ácido Ascórbico (Vitamina C).

DESMOPRESSINA
Solução Nasal 0,1 mg/mL (IN)

CLASSIFICAÇÃO: Agente anti-hemofílico, Agente hemostático e Análogo da vasopressina sintético.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 8 frascos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E23.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: aumento da pressão arterial.

Sistema Digestório: aumento de peso, cólicas abdominais e náuseas.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: confusão mental, convulsão, dor de cabeça e sonolência.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: problemas urinários e dor na vulva.

Sistema Respiratório: congestão nasal e rinite.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Fosfato de Sódio, Polietilenoglicol /eletrólitos e Epinefrina (Adrenalina).

DEXAMETASONA
Solução Tópica – Creme 0,1% (TÓPICO)

CLASSIFICAÇÃO: Corticosteroide tópico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: úlcera péptica com eventual perfuração e hemorragia subsequente, perfuração de intestino grosso e delgado, particularmente em pacientes com doença intestinal inflamatória, pancreatite, distensão abdominal, esofagite ulcerativa, aumento de peso e de apetite e náusea.

Sistema Endócrino: desenvolvimento de estado cushingoide, supressão do crescimento da criança, ausência secundária da resposta adrenocortical e hipofisária, sobretudo por ocasião de estresse, como nos traumas na cirurgia ou nas enfermidades, diminuição da tolerância aos carboidratos, manifestação do diabetes melito latente, aumento das necessidades de insulina ou

de agentes hipoglicemiantes orais em diabéticos e hirsutismo.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fraqueza muscular, miopatia esteroide, perda de massa muscular, osteoporose, fraturas por compressão vertebral, necrose asséptica das cabeças femorais e umerais, fratura patológica dos ossos longos e ruptura de tendão.

Sistema Nervoso: convulsões, aumento da pressão intracraniana com papiledema (pseudotumor cerebral, geralmente após tratamento), vertigem, cefaleia e distúrbios psíquicos. As perturbações psíquicas podem estar relacionadas com a dose.

Sistema Oftálmico: catarata subcapsular posterior, aumento da pressão intra-ocular, glaucoma e exoftalmia.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: irregularidades menstruais.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: retardo na cicatrização de feridas, adelgaçamento e fragilidade da pele, petéquias e equimoses eritema, hipersudorese, possível supressão das reações aos testes cutâneos, reações cutâneas outras, tais como dermatite alérgica, urticária e edema angioneurótico.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Ácido Acetilsalicílico, anti-inflamatórios não-esteroides (AINE), Fenitoína, Efedrina, diuréticos espoliadores de potássio, glicosídeos digitálicos e Mexiletina.

DIAZEPAM
Comprimido 10 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Benzodiazepínico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista B1 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: taquicardia.

Sistema Digestório: distúrbios gastrointestinais, constipação, diarreia, náusea, vômito e secura na boca.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: elevação das transaminases e da fosfatase alcalina e icterícia.

Sistema Hematopoiético: neutropenia secundária.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: relaxamento muscular, tremor e espasmos musculares.

Sistema Nervoso: sonolência, fadiga, confusão, emoções entorpecidas, redução da atenção, amnésia anterógrada, ataxia, depressão, euforia e cefaleia.

Sistema Oftálmico: visão turva.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: incontinência urinária e aumento ou

diminuição da libido.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupção cutânea.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: antipsicóticos, ansiolíticos, sedativos, antidepressivos, hipnóticos, anticonvulsivantes, analgésicos narcóticos, anestésicos, anti-histamínicos, Fenobarbital, Fluoxetina, Sertralina, Ácido Valproico, anticoagulantes orais do grupo cumarínico, bloqueadores neuromusculares não-despolarizantes, Amprenavir, anticoncepcionais orais, Buprenorfina, Cetoconazol, Claritromicina, Fentanila, Isoniazida, Rifampicina e Ritonavir.

DICLOFENACO SÓDICO
Comprimido 50 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anti-inflamatório não esteroidal (AINE).

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: deficiência auditiva e tinitus.

Sistema Cardiovascular: palpitação, dores no peito, insuficiência cardíaca, hipertensão, vasculite e infarto do miocárdio.

Sistema Digestório: epigastralgia, náusea, vômito, diarreia, dispepsia, cólicas abdominais, flatulência, anorexia, gastrites, sangramento gastrointestinal (hematêmese, melena e diarreia

sanguinolenta) e úlcera gastrointestinal (com ou sem sangramento ou perfuração).

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: elevação dos níveis séricos das enzimas transaminases, hepatite, com ou sem icterícia e distúrbios hepáticos.

Sistema Hematopoiético: trombocitopenia, leucopenia, anemia (incluindo hemolítica e aplástica) e agranulocitose.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia, tontura, desorientação, depressão, insônia, pesadelos, irritabilidade, distúrbios psicóticos, sonolência, vertigem, distúrbios da memória, convulsões, ansiedade, tremores, meningite asséptica, distúrbios do paladar e acidente vascular

Sistema Oftálmico: distúrbios da visão, visão borrada e diplopia.

Sistema Renal: insuficiência renal aguda.

Sistema Reprodutor/Urinário: hematúria, proteinúria, síndrome nefrótica, nefrite intersticial e necrose papilar renal.

Sistema Respiratório: asma e pneumonite.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash, urticária, erupção bolhosa, eczema, eritroderma (dermatite esfoliativa), eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de Lyell (necrólise epidérmica tóxica), dermatite esfoliativa, perda de cabelo, reação de fotossensibilidade, púrpura, púrpura alérgica e prurido.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Lítio, diuréticos e agentes anti-hipertensivos, AINEs, corticoides, anticoagulantes, agentes antiplaquetários, inibidores seletivos da recaptação da serotonina, antidiabéticos (exceto insulina) e Ciclosporina.

DIETA EM PÓ SEM SACAROSE
Pó liofilizado 400 g (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Complemento Nutricional.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa de Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para E84; E84.0; E84.1; E84.8; E84.9.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre reações adversas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

DIETA LÍQUIDA PADRÃO PARA CRIANÇAS 1-6 ANOS NORMO CAL E PROTEICA (VO)
Morango | Chocolate | Baunilha

CLASSIFICAÇÃO: Complemento Nutricional.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa de Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para E84; E84.0; E84.1; E84.8; E84.9.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre reações adversas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

DIETA EM PÓ PADRÃO PARA CRIANÇAS 1-6 ANOS NORMO CAL E PROTEICA (VO)

Morango | Chocolate | Baunilha

CLASSIFICAÇÃO: Complemento Nutricional.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa de Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para E84; E84.0; E84.1; E84.8; E84.9.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre reações adversas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

DIGOXINA

Comprimido 0,25 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antiarrítmico e Glicosídeo cardiotônico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.
Medicamento com baixo índice terapêutico.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: arritmia, bigeminismo, trigeminismo, transtornos de condução, prolongamento do intervalo PR, bradicardia

sinusal, taquiarritmia supraventricular, taquicardia atrial (com ou sem bloqueio), taquicardia juncional (nodal), arritmia ventricular, contração ventricular prematura e depressão do segmento ST.

Sistema Digestório: anorexia, náusea, vômito, diarreia, isquemia intestinal e necrose intestinal.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fadiga, fraqueza e mal-estar.

Sistema Nervoso: depressão, psicose, apatia, confusão, vertigem e dor de cabeça.

Sistema Oftálmico: distúrbios visuais (visão turva ou amarelada).

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: ginecomastia pode ocorrer em tratamentos de longa duração.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash cutâneo urticariforme ou escarlatiniforme pode ser acompanhado de eosinofilia pronunciada.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Cetoconazol, Itraconazol, Claritromicina, Azitromicina, Ciclosporina, Diltiazem, Hidróxido de Alumínio, Sulfassalazina e Verapamil.

DILTIAZEM
Comprimido 60 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Bloqueador do canal de cálcio.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Especialidades.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: pressão baixa, arritmia, insuficiência e parada cardíaca.

Sistema Digestório: náusea, perda de apetite, vômitos e aumento de peso.

Sistema Endócrino: inchaço.

Sistema Hepático: elevação das enzimas hepáticas.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: dor de cabeça, tontura, fraqueza, sonolência e tremor.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: insuficiência renal aguda.

Sistema Reprodutor/Urinário: aumento da micção.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupções cutâneas, rubor facial, feridas na pele e nas mucosas, coceira e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Digoxina, anti-inflamatórios não-hormonais, outros anti-hipertensivos, betabloqueadores, Ciclosporina, Carbamazepina, anestésicos e Tacrolimo.

DIMETICONA
Solução Oral 75 mg/mL (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Adsorvente e Antifisético intestinal.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Especialidades.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia

REAÇÕES ADVERSAS: a dimeticona é fisiologicamente inerte e desprovida de toxicidade. Após administração oral, a dimeticona é eliminada pelas fezes de forma inalterada.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

DIPIRONA SÓDICA
Solução Oral 500 mg/mL (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Analgésico e Antipirético.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: queda da pressão sanguínea.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: anemia aplástica e agranulocitose.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: falta de ar.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: coceira, ardor, vermelhidão, urticária, inchaço e Síndrome de Steven-Johnson.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

DONEPEZIL
Comprimido 5 mg (VO)
Comprimido 10 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Inibidor da acetilcolinesterase.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido de 5mg – 62 comprimidos.

Comprimido de 10mg – 31 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G30.0; G30.1; G30.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náuseas, diarreia, vômito, perda de peso e anorexia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dores no corpo e cãimbras.

Sistema Nervoso: cefaleia, insônia e fadiga.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

DORZOLAMIDA CLORIDRATO
Solução Oftálmica 2% (TO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente oftálmico, Antiglaucoma e Inibidor da anidrase carbônica.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 2 frascos.

CID 10 – MEDICAMENTO: H40.1; H40.2; H40.3; H40.4; H40.5; H40.6; H40.8; Q15.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: gosto amargo na boca e náuseas.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia e fadiga.

Sistema Oftálmico: queimação e sensações de pontadas nos olhos, visão embaçada, prurido ocular, lacrimejamento, conjuntivite, irritação das pálpebras e blefarite.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Anfetamina, Quinidina e Mecamilamina.

ENTACAPONE
Comprimido 200 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antiparkinsoniano.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada: 310 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G20.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: diarreia, náusea, dor na barriga e constipação intestinal.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: movimentos involuntários, tontura e dimuinição dos movimentos.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: alterações da cor da urina.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: amarelamento da pele ou do branco dos olhos.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Rimiterol, Isoprenalina, Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina, Dobutamina, Alfa-metildopa, Apomorfina e Paroxetina.

ENTECAVIR
Comprimido 0,5 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente Antirretroviral e Inibidor da Transcriptase Reversa.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 62 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: B18.1.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náuseas.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia, fadiga, sonolência e vertigem.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Adefovir.

ENZIMAS PANCREÁTICAS

Cápsula 4.500 UI (VO)
Cápsula 10.000 UI (VO)
Cápsula 18.000 UI (VO)
Cápsula 20.000 UI (VO)
Cápsula 25.000 UI (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Enzima.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Cápsula de 10.000UI e 4.500UI – 3100 cápsulas.

Cápsula de 25.000UI – 1240 cápsulas.

Cápsula de 12.000UI – 2583 cápsulas.

Cápsula de 18.000UI – 1722 cápsulas.

Cápsulas de 20.000UI – 1550 cápsulas.

CID 10 – MEDICAMENTO: E84.1; E84.8; K86.0; K86.1; K90.3.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: diarreia, constipação, desconforto gástrico, náuseas e estenose da região ileocecal e do intestino grosso.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: reações cutâneas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO
Comprimido 10 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente anticolinérgico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Especialidades.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: taquicardia e diminuição da pressão arterial.

Sistema Digestório: boca seca, constipação, perda do paladar e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: tontura, cefaleia, irritação e confusão mental.

Sistema Oftálmico: distúrbios da acomodação visual.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: impotência, supressão da lactação e retenção urinária.

Sistema Respiratório: dispneia.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: reações cutâneas e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Álcool, Fentanila, Naloxona, Hidroxizina, Mirtazapina, Mianserina, Flufenazina, Quinidina, Disopiramida, Ipatrópio e Atropina.

ESPIRAMICINA
Comprimido 1,5 MUI (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antibiótico e Macrolídeo.

RESTRIÇÃO: Medicamento da Resolução SS – 200, de 06 de outubro de 2010.

Quantidade Máxima Dispensada: Não há.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para Toxoplasmose em gestantes (B36).

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náuseas, vômitos e diarreia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: manifestações cutâneas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Levodopa.

ESTREPTOMICINA
Pomada 1 grama (TÓPICO)

CLASSIFICAÇÃO: Aminoglicosídeo, Agente Antituberculose e Antibiótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Estratégico.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náuseas e vômitos.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: vertigens, tontura, parestesia facial e febre.

Sistema Oftálmico: visão dupla.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupções cutâneas, dermatite esfoliativa e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: agentes usados em quimioterapia, Neomicina, Canamicina, Gentamicina, Cefaloridina,

Paromomicina, Polimixina B, Colistina, Tobramicina, Carisoprodol, Baclofeno, Neostigmina, Piridostigmina e Ácido Etacrínico.

ESTRÔGENIOS CONJUGADOS
Drágeas 0,625 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Hormônio.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Especialidades.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipertensão e infarto do miocárdio.

Sistema Digestório: náuseas, vômitos e perda ou aumento de peso.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: cãimbras em membros inferiores.

Sistema Nervoso: cefaleia, enxaqueca, alteração de humor, vertigens, depressão e acidente vascular cerebral.

Sistema Oftálmico: alterações na visão.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: sensibilidade nas mamas, galactorreia, cólicas, edema abdominal, ginecomastia, tumor de mama e ovário, candidíase vaginal, neoplasia de endométrio e alterações da libido.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash cutâneo e alopécia.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Itraconazol, Claritromicina, Cetoconazol e Levotiroxina.

ETAMBUTOL
Comprimido 400 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antituberculose.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Estratégico.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náusea.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: aumento do ácido úrico e diminuição das plaquetas.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Sais de Alumínio.

ETANERCEPTE

Solução Injetável 25 mg (SC)
Solução Injetável 50 mg (SC)

CLASSIFICAÇÃO: Agente bloqueador do fator de necrose tumoral e Agente antirreumático.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada:

Ampola de 25mg – 8 ampolas.

Ampola de 50mg – 4 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: M05.0; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8; M07.0; M07.3; M08.0; M45; M46.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: dor abdominal e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: anticorpos antinucleares positivos e anticorpos para DNA de cadeia duplo positivo.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: dor de cabeça.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: rinite e infecção respiratória.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: coceira, dor e vermelhidão.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: risco aumentado de linfoma e outros tipos de câncer associados com o uso de medicamentos denominados bloqueadores do fator de necrose tumoral em crianças e adolescentes.

ETIONAMIDA
Comprimido 250 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antituberculose.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Estratégico.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal,

anorexia, salivação e estomatite.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: lesão hepática com hepatite e icterícia.

Sistema Hematopoiético: trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: parestesias, tremores e sintomas reumáticos.

Sistema Nervoso: depressão mental, sonolência, tontura, convulsão, alterações visuais, hipotensão postural e cefaleia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: ginecomastia e impotência sexual.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupção cutânea, acne e alopécia.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: anticonvulsivantes, psicotrópicos e Álcool.

ETOFIBRATO
Cápsula 500 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente hipolipemiante.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 31 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E78.0; E78.1; E78.2; E78.3; E78.4; E78.5; E78.6; E78.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: palpitações e taquicardia.

Sistema Digestório: náuseas, sensação de plenitude gástrica, constipação, diarreia e meteorismo.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dores musculares.

Sistema Nervoso: angústia e cefaleia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: sudorese e alopécia. Raramente poderão ocorrer reações de fotossensibilidade cutânea, após exposição à luz solar ou luz artificial UV, como vermelhidão, coceira, bolha ou formação de nódulo, mesmo que o produto tenha sido bem tolerado durante vários meses de tratamento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: pode aumentar o efeito anticoagulante de certos medicamentos.

ETOSSUXIMIDA
Solução Oral 50 mg/mL (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anticonvulsivante.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada: 8 frascos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G40.0; G40.1; G40.2; G40.3; G40.4; G40.5; G40.6; G40.7; G40.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: anorexia, soluço e distúrbios gastrointestinais.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: ataxia.

Sistema Nervoso: tontura, sonolência e cefaleia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: Síndrome de Stevens-Johnson e lúpus eritematoso.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: antidepressivos triciclicos, Loxapina, Maprotilina, IMAO, fenotiazinicos e Carbamazepina.

EVEROLIMO
Comprimido 0,5 mg (VO)
Comprimido 0,75 mg (VO)
Comprimido 1 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente imunossupressor.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido de 0,5mg – 310 comprimidos.

Comprimido de 0,75mg – 217 comprimidos.

Comprimido de 1mg – 155 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: T86.1; Z94.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: aumento da pressão.

Sistema Digestório: dor abdominal, diarreia, náusea e vômito.

Sistema Endócrino: aumento dos índices de colesterol e aumento de lipídeos.

Sistema Hepático: função hepática anormal.

Sistema Hematopoiético: diminuição de leucócitos, diminuição das plaquetas, anemia, problema de coagulação, púrpura trombocitopênica trombótica e síndrome urêmica hemolítica.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dor muscular.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: infecção do trato urinário.

Sistema Respiratório: pneumonia.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: espinhas, inchaço e erupção na pele.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: vacinas de vírus vivos.

FENITOINA SÓDICA
Comprimido 100 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antiarrítmico e Anticonvulsivante.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Medicamento com baixo índice terapêutico.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: constipação, náusea e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: tontura e sonolência.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Amiodarona, anticoagulante (cumarínico e derivado da indandiona), Cloranfenicol, Cimetidina, Dissulfiram, Isoniazida, Fenilbutazona, Sulfonamida, antiácido contendo alumínio, magnésio ou carbonato de cálcio, Rifampicina, Sucralfato, anticoncepcional oral contendo estrogênio, Corticosteroide, Metadona, progestogênio, Estreptozocina, Fluconazol, Miconazol, Cetoconazol, Ácido Valproico, Itraconazol, Felbamato, Carbamazepina, Ciclosporina, Ciprofloxacino, Clozapina, Dexametasona, Fenobarbital e Quetiapina.

FENOBARBITAL
Comprimido 100 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anticonvulsivante e Barbiturato.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista B1 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: bradicardia, hipotensão arterial e síncope.

Sistema Digestório: constipação, náusea e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: agranulocitose, anemia megaloblástica e trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: agitação, alucinações, ansiedade, ataxia, cefaleia, comprometimento do julgamento, confusão mental, efeito de ressaca, excitação ou depressão do sistema nervoso central, hipercinesia, insônia, letargia, nervosismo, pesadelos, sonolência e tontura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: oligúria.

Sistema Respiratório: apneia (principalmente com a administração I.V. rápida), depressão respiratória, hipoventilação e laringoespasmo.

Local de Aplicação: dor no local da injeção, tromboflebite com o uso I.V..

Pele e Anexos: dermatite esfoliativa, rash cutâneo e síndrome de Stevens-Johnson.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: outros depressores do sistema nervoso central, Etanol, analgésicos opioides, antidepressivos ou benzodiazepínicos, Cloranfenicol, inibidores da MAO, Ácido Valproico, Felbamato, Metoxiflurano, Petidina, Primidona, Fluconazol, Fluvoxamina, Omeprazol, Ticlopidina e outros inibidores da CYP2C19, contraceptivos orais, anticoagulantes orais, Metadona, Aminofilina, Amiodarona, benzodiazepínicos, bloqueadores do canal de cálcio, Bupropiona, Carbamazepina, Ciclosporina, Citalopram, Claritromicina, Diazepam, Efavirenz, Eritromicina, estrogênios, Fenitoína, Fluoxetina, Fluvoxamina, Glimepirida, Glipizida, inibidores da bomba de prótons, inibidores da protease, Ifosfamida, Losartana, Metossuximida, Mirtazapina, Nateglinida, Nefazodona, Nevirapina, Pioglitazona, Prometazina, Propranolol, Rifampicina, Ropinirol, Rosiglitazona, Selegilina, Sertralina, Sulfonamidas, Tacrolimo, Teofilina, Varfarina, Vençafaxina, Voriconazol e outros substratos da CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9 ou 3A4.

FENOFIBRATO

Cápsula 200 mg (VO)
Cápsula de liberação lenta 250 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antilipemiante.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 31 cápsulas.

CID 10 – MEDICAMENTO: E78.0; E78.1; E78.2; E78.3; E78.4; E78.5; E78.6; E78.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: problemas gastrointestinais e má digestão.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: elevação transitória das transaminases.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dores musculares.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: reações alérgicas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Acenocumarol, Dimumarol, Varfarina, Femprocumon e Fenindiona.

FENOTEROL
Aerossol 100 mcg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agonista beta 2 adrenérgico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado –

Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 16 frascos.

CID 10 – MEDICAMENTO: J45.0; J45.1; J45.8; J44.0; J44.1; J44.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipertensão arterial, palpitações, arritmia e taquicardia.

Sistema Digestório: vômito.

Sistema Endócrino: aumento da glicemia e redução do potássio sérico.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: cãimbras musculares e tremores.

Sistema Nervoso: distúrbios do sono, cefaleia, nervosismo, agitação e tontura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: irritação da faringe e tosse.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: prurido, rash cutâneo, urticária e reação alérgica.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Ipratrópio inalatório, inibidores da MAO, antidepressivos tricíclicos, agentes simpaticomiméticos, diuréticos e bloqueadores beta-adrenérgicos não-seletivos.

FILGASTRIM
Solução Injetável 300 mcg (VS ou IV)

CLASSIFICAÇÃO: Fator estimulante de colônias.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 64 frascos.

CID 10 – MEDICAMENTO: B20.0; B20.1; B20.2; B20.3; B20.4; B20.5; B20.6; B20.7; B20.8; B20.9; B22.0; B22.1; B22.2; B22.7; B23.0; B23.1; B23.2; B23.8; B24; D46.0; D46.1; D46.7; D61.0; D61.1; D61.2; D61.3; D61.8; D70; Z94.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipertensão ou hipotensão arterial, depressão do segmento S-T, infarto do miocárdio e/ou arritmias.

Sistema Digestório: esplenomegalia, náusea, vômito e peritonite.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: aumento da fosfatase alcalina.

Sistema Hematopoiético: leucocitose.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: ostealgia comumente na região lombar e crista ilíaca posterior.

Sistema Nervoso: febre e cefaleia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: epistaxe.

Local de Aplicação: reação no local da injeção.

Pele e Anexos: petéquias, rash cutâneo e alopécia.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: quimioterapia, 5-fluorouracil e Lítio.

FINGOLIMODE
Cápsula 0,5 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Modulador de receptores esfingosina-1 fosfato.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 31 cápsulas.

CID 10 – MEDICAMENTO: G35.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: irregularidade grave no batimento cardíaco.

Sistema Digestório: vômitos, náuseas e diarreia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: febre e dor de cabeça.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: tosse com catarro e dor no peito.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: coceira e manchas vermelhas ou bolhas na face e no tronco.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: terapias antineoplásicas, imunomoduladoras ou imunossupressoras (incluindo corticosteroides) devem ser administradas concomitantemente com cautela, devido ao risco de efeitos adicionais no sistema imune. Quando o Fingolimode é usado com Atenolol, há uma redução adicional de 15% na frequência cardíaca mediante a iniciação de Fingolimode.

FLUDROCORTISONA
Comprimido 0,1 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Corticosteroide.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 124 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E25.0; E27.1; E27.4.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo,

Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: aumento do apetite.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: leucocitose e linfopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artralgia, perda de massa muscular, fraqueza, fadiga e miopatia.

Sistema Nervoso: insônia, pesadelos, nervosismo, ansiedade, euforia, delírio, alucinações, psicose, cefaleia, tontura e convulsão.

Sistema Oftálmico: catarata e glaucoma.

Sistema Renal: retenção de água e sódio e edema.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: petéquias e Síndrome de Cushing.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Anfotericina B e diuréticos.

FLUOXETINA CLORIDRATO
Comprimido 20 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antidepressivo e Inibidor seletivo da recaptação da Serotonina.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: otalgia e zumbido.

Sistema Cardiovascular: vasodilatação, febre, dor torácica, hemorragia, hipertensão arterial e palpitação.

Sistema Digestório: náusea, diarreia, xerostomia, anorexia, dispepsia, constipação, flatulência, vômito, perda de peso, aumento do apetite, perversão do paladar e ganho de peso.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fraqueza e tremores.

Sistema Nervoso: insônia, cefaleia, sonolência, ansiedade, nervosismo, tontura, sonhos anormais, pensamento anormal, agitação, amnésia, calafrios, confusão mental, labilidade emocional, alucinações e distúrbios do sono.

Sistema Oftálmico: visão anormal.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: aumento da frequência miccional, redução da libido, ejaculação anormal e impotência.

Sistema Respiratório: sinusite, faringite e bocejo.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash cutâneo, alergias, alopécia e prurido.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: inibidores não seletivos da MAO, Selegilina, Pimozida, Aminofilina, Anfetaminas, antidepressivos tricíclicos, Citalopram, Dextrometorfano, Diazepam, Fluvoxamina, Lidocaína, Mexiletina, Metossuximida, Mirtazapina, Nefazodona, Paroxetina, Risperidona, Ritonavir, Ropinirol, Trifluoperazina, Venlafaxina, Lítio, diuréticos de alça, varfarina, AINEs, Ácido Acetilsalicílico, determinados betabloqueadores, Clorpromazina, Delavirdina, Fluconazol, Genfibrozila, Miconazol, Nicardipino, Paroxetina, Pergolida, Pioglitazona, Quinidina, Quinina, Ritonavir, Ropinirol, Sulfonamidas, Tolbutamida e outros inibidores das CYP2C9 ou 2D6.

FLUTICASONA PROPIONATO COM INALADOR
Pó Inalante 250 mcg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Corticosteroide.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 999 cápsulas.

CID 10 – MEDICAMENTO: J43.9; J44.0; J44.1; J44.8; J43.8; J43.2; J43.1; J42; J41.8; J41.0; J41.1; J44.9.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: rouquidão e candidíase na boca e na garganta

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: dispneia e broncoespasmo paradoxal com aumento imediato na dificuldade de respirar.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: reações anafiláticas e Síndrome de Cushing.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

FLUTICASONA PROPIONATO + SALMETEROL XINAFOATO

Pó Inalante 50 mcg/100 mcg (VO)
Pó Inalante 50 mcg/250 mcg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Corticosteroide.

RESTRIÇÃO: Medicamento da Resolução SS – 278/2007.

CID 10 – MEDICAMENTO: J41.0; J41.1; J41.8; J42; J43.1; J43.8; J43.9; J44.0; J44.1; J44.8; J44.9; J43.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Não existem evidências de reações adversas adicionais relacionadas à associação dos dois fármacos.

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: palpitações, arritmias cardíacas, incluindo fibrilação atrial, taquicardia supraventricular e extrassístole.

Sistema Digestório: rouquidão e candidíase na boca e na garganta, podendo ser evitado com a lavagem da boca com água após o uso do medicamento.

Sistema Endócrino: hiperglicemia.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artalgia e câimbra.

Sistema Nervoso: tremor e enxaqueca.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: broncoespasmo.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash e Síndrome de Cushing.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

FLUVASTATINA
Cápsula 20 mg (VO)
Cápsula 40 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antilipemiante e inibidor da HMG-CoA Redutase.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Cápsula de 20mg – 124 cápsulas.

Cápsula de 40mg – 62 cápsulas.

CID 10 – MEDICAMENTO: E78.0; E78.1; E78.2; E78.3; E78.4; E78.5; E78.6; E78.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: dispepsia, diarreia, dor abdominal, alteração do paladar e náusea.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: aumento da creatina fosfoquinase e das transaminases.

Sistema Hematopoiético: anemia hemolítica e aumento da velocidade de hemossedimentação.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: mialgia, artralgia, cãimbras

musculares e artrite.

Sistema Nervoso: cefaleia, fadiga e insônia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: ITU.

Sistema Respiratório: dispneia, sinusite e bronquite.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: alopécia e alteração da cor da pele.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: derivados do Ácido Fíbrico, AINEs, Fluconazol, Omeprazol, Sulfonamida, outros inibidores da CYP2C9, Colestiramina, Fluoxetina, Glimepirida, Glipizida e Rifabutina.

FORMOTEROL FUMARATO
Cápsula 12 mcg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agonista beta 2 adrenérgico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 124 cápsulas.

CID 10 – MEDICAMENTO: J45.0; J45.1; J45.8; J44.0; J44.1; J44.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: alterações mínimas da pressão arterial

e da frequência cardíaca em doses terapêuticas de Formoterol. Já em altas doses, podem ocorrer alterações eletrocardiográficas, palpitações pela via inalatória são mais raras que pela via oral.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: aumentos significativos da glicemia são observados com o uso de altas doses de Formoterol inalatório, e queda nas doses de potássio sérico têm sido observadas após inalação do Formoterol.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: ocorrência ocasional de tremores e rara de mialgias ou cãimbras musculares.

Sistema Nervoso: ocasionalmente ocorrem cefaleia, vertigem, ansiedade, tremores generalizados, fadiga e insônia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: alguns pacientes apresentam tosse durante o uso de Formoterol. Pode ocorrer broncoespasmo paradoxal durante a administração de medicamentos inalatórios.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: prurido e rash cutâneo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: antidepressivos tricíclicos.

FORMOTEROL FUMARATO + BUDESONIDA
Frasco 6 mcg/200 mcg (VO)
Frasco 12 mcg/400 mcg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agonista beta 2 adrenérgico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Frasco 6/200 – 6 frascos.

Frasco 12/400 – 3 frascos.

CID 10 – MEDICAMENTO: J45.0; J45.1; J45.8; J44.0; J44.1; J44.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: palpitações e taquicardia.

Sistema Digestório: náusea e candidíase.

Sistema Endócrino: hiperglicemia.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: cãimbras musculares.

Sistema Nervoso: cefaleia, tremor, tontura, agitação, ansiedade, nervosismo, perturbações do sono, depressão e alterações do comportamento.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: leve irritação na garganta, tosse, rouquidão e broncoespasmo.
Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.
Pele e Anexos: equimose, urticária e prurido.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

FÓRMULA COM AMINOÁCIDOS LIVRES
Pó Liofilizado (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Produto nutricional.

RESTRIÇÃO: Medicamento da Resolução AF SS nº08 de 01 de outubro de 2013

Quantidade Máxima Dispensada: 16 latas.

CID 10 – MEDICAMENTO: E73.8; E73; E73.0; E73.1; K52.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Guarulhos e Campinas e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre reações adversas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

FÓRMULA HIDROLISADO PROTEICO
Pó Liofilizado (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Produto nutricional.

RESTRIÇÃO: Medicamento da Resolução AF SS nº08 de 01 de outubro de 2013

Quantidade Máxima Dispensada: 16 latas.

CID 10 – MEDICAMENTO: E73.8; E73; E73.0; E73.1; K52.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Guarulhos e Campinas e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre reações adversas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

FÓRMULA PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA
Pó Liofilizado (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Produto nutricional.

RESTRIÇÃO: Medicamento da Resolução AF SS nº08 de 01 de outubro de 2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 16 latas.

CID 10 – MEDICAMENTO: E73.8; E73; E73.0; E73.1; K52.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Guarulhos e Campinas e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre reações adversas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

FUROSEMIDA
Comprimido 40 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Diurético de alça.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: distúrbios do ritmo cardíaco.

Sistema Digestório: náuseas, vômitos e diarreia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dores e fraqueza muscular.

Sistema Nervoso: cefaleia e confusão.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: hipovolemia e desidratação.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Hidrato de cloral, antibióticos aminoglicosídicos, Cisplatina, Sucralfato, sais de lítio, medicamentos que inibem a enzima conversora da angiotensina (ECA), anti-

inflamatórios não-esteroidais (AINEs), antibióticos, Carbenoxolona, Alcaçuz e anti-hipertensivos diuréticos.

GABAPENTINA
Cápsula 300 mg (VO)
Cápsula 400 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anticonvulsivante.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Cápsula de 300mg - 372 cápsulas.

Cápsula de 400mg – 279 cápsulas.

CID 10 – MEDICAMENTO: G40.0; G40.1; G40.2; G40.3; G40.4; G40.5; G40.6; G40.7; G40.8; R52.1; R52.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipertensão e fadiga.

Sistema Digestório: flatulência, anorexia, gengivite, aumento de peso e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artralgia e tremores.

Sistema Nervoso: vertigem, hipercinesia, aumento, diminuição ou ausência de reflexos, parestesia, ansiedade, hostilidade e incoordenação motora.

Sistema Oftálmico: vista embaçada e movimentos oculares incoordenados.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: infecção do trato urinário.

Sistema Respiratório: pneumonia e fala pastosa.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: antiácidos devem ser administrados somente após duas horas da ingestão de Gabapentina.

GALANTAMINA

Cápsula de Liberação Prolongada 8 mg (VO)
Cápsula de Liberação Prolongada 16 mg (VO)
Cápsula de Liberação Prolongada 24 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Inibidor da acetilcolinesterase.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido de 8mg – 93 comprimidos.

Comprimido de 16 e 24mg - 31 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G30.0; G30.1; G30.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: bradicardia.

Sistema Digestório: diminuição do apetite, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, anorexia e redução de peso.

Sistema Endócrino: aumento da sudorese.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: tremor.

Sistema Nervoso: letargia e depressão.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Fluvoxamina, Paroxetina e Quinidina.

GENFIBROZILA
Comprimido 600 mg (VO)
Comprimido 900 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antilipemiante.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido de 600mg – 62 comprimidos.

Comprimido de 900mg – 31 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E78.0; E78.1; E78.2; E78.3; E78.4; E78.5; E78.6; E78.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: bradicardia.

Sistema Digestório: reações gastrointestinais, dor abdominal, diarreia, náusea, vômitos e constipação.

Sistema Endócrino: aumento da sudorese.

Sistema Hepático: apendicite aguda.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: tremor.

Sistema Nervoso: fadiga, vertigem, cefaleia, fotossensibilidade, depressão e letargia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupção cutânea.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: anticoagulantes e Fluoxetina.

GENTAMICINA
Solução Injetável 280 mg (IM)

CLASSIFICAÇÃO: Antibiótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa de Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: agranulocitose, granulocitopenia e trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: marcha instável.

Sistema Nervoso: neurotoxidade e fotossensibilidade.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nefrotoxicidade e redução do clearance de creatinina.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: dispneia.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: edema, hiperemia, prurido e rash cutâneo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: penicilinas, cefalosporinas, Anfotericina B, diuréticos de alça, aminoglicosídeos e Furosemida.

GLATIRÂMER ACETATO
Solução Injetável 20 mg (SC)

CLASSIFICAÇÃO: Agente imunomodulador.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 31 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: G35.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: dor no peito e sensação de aperto ou dor com palpitações.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: sudorese.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: vertigem e ansiedade.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: falta de ar.

Local de Aplicação: dor intensa, vermelhidão, inchaço e endurecimento.

Pele e Anexos: erupção da pele e coceira.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: interações entre Acetato de Galtirâmer e demais fármacos ainda não foram integralmente avaliadas. O uso de Acetato de Glatirâmer com Natalizumabe pode aumentar o risco de infecções.

GLIBENCLAMIDA
Comprimido 5 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antidiabético e Sulfonilureia.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náuseas, vômitos, dor abdominal, sensação

de plenitude gástrica ou peso no epigastro e diarreia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: hepatite, icterícia, colestase e aumento das enzimas hepáticas.

S**istema Hematopoiético:** anemia hemolítica, inflamação dos vasos sanguíneos (vasculites), diminuição das plaquetas (púrpura), hemácias e leucócitos.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: alterações neurológicas transitórias.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: prurido.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Álcool, Captopril, Enalapril, Fosinopril, Lisinopril, Disopiramida, Guanetidina, Ácido Paramino-Salicílico, Probenecida, Tritoqualina, Atenolol, Betaxolol, Bisoprolol, Metoprolol, Bevantolol, Acebutolol, Benzofibrato, preparações de Biguanida, Clofibrato, derivados cumarínicos, Fenfluramina, Feniramidol, Fenelzina, Iproniazida, Isocarboxazida, Harmalina, Nialamida, Pargilina, Toloxatona, Miconazol, Pentoxifilina (uso parenteral em altas doses), preparações de Fenilbutazona, Fosfamidas, Salicilatos, Sulfimpirazona, Sulfonamidas, preparações de Tetraciclina, Glucagon, fenotiazínicos e Ciprofloxacino.

GOLIMUMABE
Solução Injetável 50 mg (SC)

CLASSIFICAÇÃO: Anticorpo monoclonal IgG1 humano contra o fator de necrose tumoral.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 1 seringa.

CID 10 – MEDICAMENTO: M05.0; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipertensão e insuficiência cardíaca congestiva.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: alterações de enzimas hepáticas.

Sistema Hematopoiético: leucopenia e trombocitopenia.

Sistema Linfático: linfoma e leucemia.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: infecções no trato respiratório superior (nasofaringite, faringite e laringite).

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupção cutânea e alopécia.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

GOSSERRELINA ACETATO

Solução Injetável 3,6 mg (SC)
Solução Injetável 10,8 mg (SC)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antineoplásico e Agonista do hormônio liberador de gonadotropina.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada:

Ampola de 3,60mg – 2 ampolas.

Ampola de 10,8mg – 1 ampola.

CID 10 – MEDICAMENTO: D25.0; D25.1; D25.2; E22.8; N80.0; N80.1; N80.2; N80.3; N80.4; N80.5; N80.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: insuficiência cardíaca e pressão sanguínea alterada.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: tumor na hipófise, hiperidrose e diminuição da tolerância da glicose.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artralgia, parestesia e dor óssea.

Sistema Nervoso: alterações psicóticas.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: sensibilidade nas mamas, ginecomastia, diminuição da libido, obstrução ureteral e disfunção erétil.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: reações no local da injeção.

Pele e Anexos: rash cutâneo.

Outros: compressão da medula espinhal.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

HALOPERIDOL

Solução Oral 2 mg/mL (VO)
Solução Injetável 70,52 mg/mL (IM ou IV)
Comprimido 5 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antipsicótico típico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.
Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: taquicardia.

Sistema Digestório: perda de peso, boca seca e constipação.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: disfunções motoras, contração muscular involuntária e distúrbios da marcha.

Sistema Nervoso: distúrbios extrapiramidais, tontura, tremor, sedação, sonolência e inquietação.

Sistema Oftálmico: distúrbios visuais e visão embaçada.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: desconforto nas mamas, galactorreia, dismenorreia, disfunção sexual, distúrbios menstruais, menorragia e disfunção erétil.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Álcool, Itraconazol, Nefazodona, Buspirona, Venlafaxina, Alprazolam, Fluvoxamina, Quinidina, Clorpromazina, Paroxetina, Adrenalina, Lítio, Guanetidina, Fenidinona, Carbamazepina, Isoniazida+Rifampicina, Tioridazina e Levodopa.

HIDROCLOROTIAZIDA
Comprimido 25 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Diurético tiazídico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náusea, vômitos, diarreia, constipação, anorexia e irritação gástrica.

Sistema Endócrino: hiperglicemia.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: tontura, vertigem, dor de cabeça, fraqueza, inquietação e sonolência.

Sistema Oftálmico: turvação transitória da visão.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: outros fármacos anti-hipertensivos, Lítio e Metformina.

HIDROXICLOROQUINA SULFATO
Comprimido 400 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Aminoquinolona e Antimalárico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 93 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: M05.0; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8; M08.0; M33.0; M33.1; L93.0; L93.1; M32.1; M32.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: distúrbios gastrointestinais.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: agranulocitose, anemia aplástica, neutropenia e trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: miopatia.

Sistema Nervoso: cefaleia, alterações emocionais ou psicose e depressão.

Sistema Oftálmico: dificuldade de leitura e toxicidade ocular.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: prurido, clareamento dos cabelos ou alopécia e coloração azul-escura das unhas e da mucosa bucal.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: antiácidos.

HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO

Comprimido 230 mg (VO)
Comprimido 300 mg (VO)
Suspensão Oral 61,5 mg/mL (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiácido, Antídoto e Protetor tópico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido de 230mg – 1456 comprimidos.

Comprimido de 300mg – 1116 comprimidos.

Frasco 61,5mg/mL – 23, 36 ou 54 frascos, de acordo com o volume do frasco.

CID 10 – MEDICAMENTO: E83.3; N18.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: anorexia e prisão de ventre.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: debilidade muscular.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: demência dialítica.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: antibióticos contendo Tetraciclina, benzodiazepínicos, fenotiazinas, Diflunisal, Digoxina, Quinolonas, Propranolol, Atenolol, Ranitidina, Ácido Acetilsalicílico, Levodopa, Lítio, Ciprofloxacino e Clorpromazina.

HIDRÓXIDO DE FERRO III
Solução Injetável 20 mg/mL (IV)

CLASSIFICAÇÃO: Antianêmico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 13 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: N18.0; N18.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: taquicardia e palpitações.

Sistema Digestório: deturpação passageira do paladar, naúsea e diarreia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: tremores, espasmos musculares, mialgia, inchaço nas articulações e parestesia.

Sistema Nervoso: fadiga, febre, dor de cabeça, redução do nível de consciência e vertigens.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: broncoespasmo e dispneia.

Local de Aplicação: reações no local da injeção.

Pele e Anexos: sensação de calor, prurido, urticária e erupção cutânea.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Enalapril.

HIDROXIUREIA
Cápsula 500 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antineoplásico e Antimetabólito.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 217 cápsulas.

CID 10 – MEDICAMENTO: D56.1; D56.8; D57.0; D57.1; D57.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: estomatite, anorexia, náusea, vômitos, diarreia e constipação.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: aumento das enzimas hepáticas.

Sistema Hematopoiético: depressão da medula óssea (leucopenia, anemia e trombocitopenia).

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fraqueza muscular.

Sistema Nervoso: calafrios, mal-estar, sonolência, casos de cefaleia, tontura, desorientação, febre, alucinações e convulsões.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: níveis elevados de ácido úrico no sangue, ureia e creatinina, casos raros de disúria (dificuldade e dor ao urinar).

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupção maculopapular (erupção na pele caracterizada pelo aparecimento de manchas avermelhadas), eritema facial, eritema periférico e ulceração da pele.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: medicamentos depressores da medula óssea e radioterapia.

ILOPROSTA
Solução para Nebulização 10 mcg/mL (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiagregante plaquetário.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 279 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: I27.8; I27.0; I27.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: sensação de palpitações.

Sistema Digestório: perda de apetite, náuseas, vômitos, diarreia, desconforto abdominal, prisão de ventre, dificuldade em engolir (disfagia), diarreia com sangue nas fezes e dor abdominal.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: parestesia, dores musculares e nas articulações, espasmos nos músculos, cãimbras musculares e aumento da tensão muscular.

Sistema Nervoso: dor de cabeça, tonturas, perda de equilíbrio, inquietação, agitação, sedação, sonolência, ritmo cardíaco diminuído, sensação de vertigens, ansiedade, depressão, alucinações, tremores, enxaquecas e desmaio ou perda de consciência por um curto período

de tempo (síncope).

Sistema Oftálmico: visão perturbada, visão enevoada, irritação ocular e dor nos olhos.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: dor ao urinar, alterações na urina e dificuldade em urinar.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rubor, amarelamento da pele e prurido.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: esteroides (Corticosteroides).

IMIGLUCERASE

Solução Injetável 200 UI (IV)
Solução Injetável 400 UI (IV)

CLASSIFICAÇÃO: Antiagregante plaquetário.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 279 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: I27.8; I27.0; I27.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: sensação de palpitações.

Sistema Digestório: perda de apetite, náuseas, vômitos diarreia, desconforto abdominal, prisão de ventre, dificuldade em engolir

(disfagia), diarreia com sangue nas fezes e dor abdominal.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: parestesia, dores musculares e nas articulações, espasmos nos músculos, cãimbras musculares e aumento da tensão muscular.

Sistema Nervoso: dor de cabeça, tonturas, perda de equilíbrio, inquietação, agitação, sedação, sonolência, ritmo cardíaco diminuído, sensação de vertigens, ansiedade, depressão, alucinações, tremores, enxaquecas e desmaio ou perda de consciência por um curto período de tempo (síncope).

Sistema Oftálmico: visão perturbada, visão enevoada, irritação ocular e dor nos olhos.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: dor ao urinar, alterações na urina e dificuldade em urinar.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rubor, amarelamento da pele e prurido.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: esteroides (Corticosteroides).

IMIPRAMINA CLORIDRATO
Comprimido 25 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antidepressivo tricíclico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: constipação e boca seca.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: fadiga, distúrbios do sono, agitação e ansiedade.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: inibidores da enzima monoamina oxidase (MAO), inibidores seletivos da recaptação de serotonina, agentes antiarrítmicos, agentes serotonérgicos, agentes anticolinérgicos, depressores do sistema nervoso central, antipsicóticos, antifúngicos orais, Codeína, Ácido Valproico, Metilfenidato, bloqueadores do canal de cálcio e estrógenos.

IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITE B

Solução Injetável 100 UI (IM)
Solução Injetável 600 UI (IM)

CLASSIFICAÇÃO: Hemoderivado e Anticorpos específicos.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada:

Ampola de 100UI – 8 ampolas.

Ampola de 500 e 600UI – 1 ampola.

CID 10 – MEDICAMENTO: B16.0; B16.2; B18.0; B18.1.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náusea e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: síncope, febre, dor no corpo e nas juntas, tontura, dor de cabeça, mal-estar e câimbra nas pernas.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: dor no local da injeção.

Pele e Anexos: sensibilidade, inflamação da pele, inchaço, erupção, coceira, urticária e reação alérgica grave.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: vacinas contra rubéola, varicela, sarampo e caxumba.

IMUNOGLOBULINA HUMANA

Solução Injetável 0,5 grama (EV)
Solução Injetável 1,0 grama (EV)
Solução Injetável 2,5 gramas (EV)
Solução Injetável 3,0 gramas (EV)
Solução Injetável 5,0 gramas (EV)
Solução Injetável 6,0 gramas (EV)

CLASSIFICAÇÃO: Hemoderivado e Anticorpos específicos.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada:

Frasco de 0,5 grama – 600 frascos.

Frasco de 1,0 grama – 300 frascos.

Frasco de 2,5 gramas – 120 frascos.

Frasco de 3,0 gramas – 167 frascos.

Frasco de 5,0 gramas – 100 frascos.

Frasco de 6,0 gramas – 84 frascos.

CID 10 – MEDICAMENTO: B20.0; B20.1; B20.2; B20.3; B20.4; B20.5; B20.6; B20.7; B20.8; B20.9; B22.0; B22.1; B22.2; B22.7;

B23.0; B23.1; B23.2; B23.8; B24; D59.0; D59.1; D60.0; D69.3; D80.0; D80.1; D80.3; D80.5; D80.6; D80.7; D80.8; D81.0; D81.1; D81.2; D81.3; D81.4; D81.5; D81.6; D81.7; D81.8; D82.0; D82.1; D83.0; D83.2; D83.8; G61.0; G70.0; M33.0; M33.1; M33.2; T86.1; Z94.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: dor moderada no peito.

Sistema Digestório: náusea e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: calafrio, febre, mal-estar, fadiga, sensação de fraqueza ou leve tontura e cefaleia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: dispneia.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: vacinas constituídas por vírus vivos atenuados.

IMUNOGLOBULINA HUMANA CONTRA ANTÍGENO D
Solução Injetável 300 mg (IM)

CLASSIFICAÇÃO: Hemoderivado e anticorpos específicos.

RESTRIÇÃO: Medicamento da Resolução SS – 199, de 06 de outubro de 2010.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 10 frascos.

CID 10 – MEDICAMENTO: O36.0; P55.0; T80.4; Z34.9.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: dor moderada no peito.

Sistema Digestório: náusea e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: calafrio, febre, mal-estar, fadiga, sensação de fraqueza ou leve tontura e cefaleia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: dispneia.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: vacinas constituídas por vírus vivos atenuados.

INFLIXIMABE
Solução Injetável 10 mg/mL (EV)

CLASSIFICAÇÃO: Anticorpo monoclonal e Imunossupressor.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada:

Doença de Krohn – 3 ampolas.

Artrite Reumatóide – 2 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: M05.0; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8; M08.0; K50.0; K50.1; K50.8; M07.0; M07.3; M45; M46.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: diarreia, dor abdominal e náusea.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: aumento das enzimas do fígado.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: dor de cabeça.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: sinusite, tosse e inflamação da garganta.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Abatacepte, Anakinra e Rilonacepte

ISONIAZIDA 100 MG
Comprimido 100 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antibacteriano e Tuberculostático.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Estratégico.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: neuropatia periférica (problema nos nervos

periféricos) com doses de 10mg/Kg/dia, aumento de transaminases no sangue e testes de função hepática discretamente alterados.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: antiácido, laxante contendo alumínio, anticoagulante oral, benzodiazepínicos (Diazepam e Triazolam), Alfentanila, Carbamazepina, Fenitoína, Álcool, Cicloserina, Dissulfiram, Enflurano, Meperidina e Teofilina.

ISONIAZIDA + RIFAMPICINA

Comprimido 75 mg/150 mg (VO)
Comprimido 100 mg/150 mg (VO)
Comprimido 200 mg/300 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antibacteriano e Tuberculostático.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Estratégico.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: anorexia, náuseas, vômitos, diarreia e dor epigástrica.

Sistema Endócrino: hiperglicemia e acidose metabólica.

Sistema Hepático: hepatite, icterícia, insuficiência hepática e pancreatite.

Sistema Hematopoiético: linfadenopatia, vasculite, eritema multiforme, púrpura e agranulocitose.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: distúrbio do sistema nervoso central (confusão mental, ataxia, alterações visuais transitórias), neuropatia periférica e febre.

Sistema Oftálmico: neurite óptica.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: ginecomastia e retenção urinária.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rubor facial, urticária e erupção cutânea.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Enflurano, Halotano, Isoflurano, Cicloserina, Etossuximida, Meperidina, antiácidos, Quinidina, Disopiramida, antidiabéticos, Dapsona, Cumarinas, Varfarina, Imipramina, Clomipramina, antipsicóticos, antiretrovirais, beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, Levotiroxina, Metadona, Clofibrato, Levotipoxina, Amitriptilina, Nortriptilina, Álcool e Verapamil.

ISOSSORBIDA MONONITRATO
Comprimido 20 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Vasodilatador.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Especialidades.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: episódios transitórios de tonturas e debilidade e outros sinais de isquemia cerebral associados com hipotensão postural, cefaleia grave e persistente.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupção e dermatite esfoliativa.

Outros: vasodilatação cutânea com hiperemia.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: anti-hipertensivos, álcool, antidepressivos tricíclicos e Ergotamina.

ISOTRETINOÍNA
Cápsula 10 mg (VO)
Cápsula 20 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiacne.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C2 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido 10mg - 620 comprimidos.

Comprimido 20mg – 310 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: L70.0; L70.1; L70.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náusea e diarreia.

Sistema Endócrino: sudorese, aumento de triglicérides e colesterol séricos, diminuição de HDL e hiperuricemia.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: diminuição da contagem de células brancas sanguíneas, neutropenia, alterações de células vermelhas, anemia, elevação da taxa de sedimentação e aumento ou diminuição da contagem plaquetária (trombocitopenia).

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: mialgia, artralgia, artrite, calcificação dos ligamentos e tendões e outras alterações ósseas, redução na densidade óssea e lombalgia.

Sistema Nervoso: cefaleia, convulsões, depressão, tentativa de suicídio e aumento da pressão intracraniana.

Sistema Oftálmico: distúrbios visuais, fotofobia, distúrbios da adaptação ao escuro (visão noturna diminuída), raros distúrbios visuais de cor (reversível com a descontinuação) e catarata lenticular.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: adelgaçamento de cabelos, alopécia reversível, acne, secura de pele e mucosas, prurido e dermatite facial.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Vitamina A, Tetraciclina, Polivitamínico e Fenitoina.

LAMIVUDINA
Comprimido 150 mg (VO)
Solução Oral 10 mg/mL (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antirretroviral.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C4 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Solução Oral – 4 frascos.

Comprimido 150mg – 62 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: B16.0; B16.2; B18.0; B18.1.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: dor abdominal, anorexia, dispepsia, náusea, vômito e diarreia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: pancreatite e elevação das transaminases.

Sistema Hematopoiético: neutropenia e anemia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: mialgia e artralgia.

Sistema Nervoso: cefaleia, insônia, fadiga, mal-estar, tontura, neuropatia periférica, depressão e febre.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: tosse e sintomas nasais.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

LAMOTRIGINA
Comprimido 25 mg (VO)
Comprimido 50 mg (VO)
Comprimido 100 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiepiléptico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido 25mg – 868 comprimidos.

Comprimido 50mg – 434 comprimidos.

Comprimido 100mg – 186 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G40.0; G40.1; G40.2; G40.3; G40.4; G40.5; G40.6; G40.7; G40.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: dor torácica e palpitações.

Sistema Digestório: náusea, vômito, dispepsia, dor abdominal, xerostomia, constipação, perda de peso e anorexia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artralgia, cervicalgia, mialgia,

parestesia, cãimbras em membros inferiores e calafrios.

Sistema Nervoso: fraqueza, insônia, sonolência, fadiga, tontura, ansiedade, idéias suicidas, irritabilidade, agitação, amnésia, anormalidade do pensamento, depressão, enxaqueca, febre e confusão mental.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: aumento da libido.

Sistema Respiratório: rinite, faringite, tosse, bronquite, dispneia, epistaxe e sinusite.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: acne, rash cutâneo, dermatite, ressecamento da pele, alopécia e dismenorreia.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Carbamazepina, Ácido Valproico e contraceptivos orais (estrogênios).

LANREOTIDA

Solução Injetável 60 mg (SC Profundo)
Solução Injetável 90 mg (SC Profundo)
Solução Injetável 120 mg (SC Profundo)

CLASSIFICAÇÃO: Antiagromegálio.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 1 ampola.

CID 10 – MEDICAMENTO: E22.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: distúrbios gastrointestinais (os notificados com maior frequência são diarreia e dor abdominal, normalmente ligeira ou moderada e passageira) e colelitíase (frequentemente assintomática).

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: reações no local da injeção (dor, nódulo e induração).

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: os efeitos farmacológicos gastrointestinais da lanreotida podem reduzir a absorção intestinal de fármacos administrados concomitantemente.

LATANOPROSTA + CLORETO DE BENZALCONIO
Solução Oftálmica 0,005% (TO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiglaucomatoso.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 1 frasco.

CID 10 – MEDICAMENTO: H40.1; H40.2; H40.3; H40.4; H40.5; H40.6; H40.8; Q15.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: irritação ocular (queimação, prurido, ardor e sensação local de corpo estranho), hiperemia conjuntival, erosões epiteliais puntiformes transitórias, blefarite, dor ocular, aumento de pigmentação da íris e edema de pálpebra.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash cutâneo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: antagonistas beta-adrenérgico (Timolol), agonistas adrenérgicos, inibidores da anidrase carbônica (Acetazolamida) e agonistas colinérgicos (Pilocarpina).

LEFLUNOMIDA
Comprimido 20 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antirreumático.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada: 31 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: M05.0; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8; M07.0; M07.3; M08.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipertensão e angina pectoris.

Sistema Digestório: úlcera bucal, vômito, anorexia, diarreia, náuseas, dor abdominal, perda de peso e diarreia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: elevação das enzimas hepáticas.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artralgia, cãimbras e lombalgia.

Sistema Nervoso: vertigem e cefaleia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: infecção urinária.

Sistema Respiratório: bronquite, aumento da tosse e infecções respiratórias.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: prurido, reações alérgicas, alopécia e erupção cutânea.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

LEUPRORRELINA
Solução Injetável 3,75 mg (IM)
Solução Injetável 11,25 mg (IM)

CLASSIFICAÇÃO: Hormônio luteinizante.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Ampola de 3,75mg – 2 ampolas.

Ampola de 11,25mg – 1 ampola.

CID 10 – MEDICAMENTO: D25.0; D25.1; D25.2; E22.8; N80.0; N80.1; N80.2; N80.3; N80.4; N80.5; N80.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo,

Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

CRIANÇAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náusea, ganho de peso e gengivite.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: aceleração da maturidade sexual, cefaleia, distúrbio da personalidade, febre, nervosismo, síncope, sonolência e dor.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: sangramento vaginal, secreção vaginal, distúrbios do colo do útero, ginecomastia, incontinência urinária e vaginite.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: reação no local da injeção.

Pele e Anexos: acne, rash cutâneo, incluindo eritema multiforme, alopécia, estrias cutâneas e seborreia.

ADULTOS:

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: angina, arritmia, bradicardia, fibrilação atrial, ICC, palpitação, síncope, taquicardia e tromboflebite profunda.

Sistema Digestório: disfagia, hemorragia GI, obstrução intestinal, úlcera, gastroenterite ou colite, constipação, diarreia, náusea e vômito e ganho ou perda de peso.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: aumento do tempo de protrombina, aumento do tempo de tromboplastina parcial, prova de função hepática anormal e hepatomegalia.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: distúrbio articular, fraqueza, mialgia, parestesia, fratura patológica, neuropatia, paralisia e ostealgia.

Sistema Nervoso: cefaleia, depressão mental, dor, insônia, fadiga, tontura ou vertigem nervosismo, ansiedade, confusão mental, crises convulsivas, delírios, demência e febre.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: aumento de BUN e aumento de creatinina.

Sistema Reprodutor/Urinário: aumento ou redução da fosfatase ácida prostática, aumento ou redução da gravidade específica da urina, impotência, balanite, distúrbio peniano ou testicular, incontinência, ITU, noctúria, aumento da frequência urinária, dispúria, retenção urinária e urgência miccional, vaginite, distúrbio urinário, atrofia testicular, ginecomastia, sensibilidade ou dor mamária e redução da libido.

Sistema Respiratório: derrame pleural, edema pulmonar, enfisema, epistaxe, hemoptise e dispneia.

Local de Aplicação: equimoses no local do implante e reação no local da injeção.

Pele e Anexos: acne, alopécia, celulite, equimose, prurido,

hirsutismo, rash cutâneo e fogachos.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: medicamentos que afetam a secreção hipofisária de gonadotrofinas, corticosteroides, Espironolactona, Levodopa, fenotiazínicos, antagonistas da Dopamina e hormônios sexuais.

LEVOMEPROMAZINA
Solução Oral 4% (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Neuroléptico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: palpitação.

Sistema Digestório: constipação e boca seca.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: leucocitose, leucopenia e eosinofilia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: sonolência e hipotensão ortostática.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: congestão nasal.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: reações de hipersensibilidade.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: hipotensores, anti-hipertensivos, depressores do sistema nervoso central, Quinidina, Levodopa, Álcool, Imipramina e Tioridazina.

LIDOCAÍNA
Geleia 2% (TÓPICO)

CLASSIFICAÇÃO: Anestésico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Especialidades.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

As reações adversas sistêmicas são raras.

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipotensão, depressão miocárdica, bradicardia e, possivelmente, parada cardíaca.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nervosismo, tontura, convulsões e inconsciência.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: parada respiratória.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: reações alérgicas aos anestésicos locais do tipo amida são raras (<0,1%). Outros constituintes da geleia, por exemplo, metilparabeno e propilparabeno, também podem causar este tipo de reação.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: deve ser usada com precaução em pacientes recebendo agentes estruturalmente relacionados aos anestésicos locais, uma vez que os efeitos tóxicos são aditivos. Interage com Fluoxetina, Propranolol e Verapamil.

LINEZOLIDA
Comprimido 600 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antibiótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa de Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para E84; E84.0; E84.1; E84.8; E84.9.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: diarreia, náuseas, vômito, constipação, alteração do paladar, monilíase oral e alteração da cor da língua.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: aumento de enzimas pancreáticas e pancreatite.

Sistema Hematopoiético: anemia, trombocitopenia, redução de hemoglobina, leucopenia e neutropenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia, insônia, febre e tontura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: monilíase vaginal.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash cutâneo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

LORATADINA
Comprimido 10 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anti-histamínico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Especialidades.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: boca seca, faringite, náusea e gastrite.

Sistema Endócrino: sudorese.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: fadiga, cefaleia e sonolência.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: ressecamento nasal, falta de ar, congestão nasal, tosse, broncoespasmo, bronquite e rinite.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: dermatite e ressecamento de pele ou cabelo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Eritromicina, Nefazodona, Quinidina, Fluconazol e inibidores do metabolismo hepático.

LOVASTATINA

Comprimido 10 mg (VO)
Comprimido 20 mg (VO)
Comprimido 40 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Hipercolesterolemia isolada.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido de 10mg – 248 comprimidos.

Comprimido de 20mg – 124 comprimidos.

Comprimido de 40mg – 62 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E78.0; E78.1; E78.2; E78.3; E78.4; E78.5; E78.6; E78.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: secura na boca, flatulência, constipação, náusea e diarreia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: cãimbras e mialgia.

Sistema Nervoso: fadiga, insônia, tontura, visão embaçada, cefaleia e distúrbios do sono.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: prurido e erupções cutâneas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Ciclosporina, Mibefradil, Itraconazol, Eritromicina, Claritromicina, Nefazodona, inibidores da protease do HIV, derivados do Ácido Fíbrico, Niacina e anticoagulantes cumarínicos.

MEBENDAZOL
Comprimido 100 mg (VO)
Suspensão Oral 2% (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anti-helmíntico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: dor abdominal, diarreias transitórias e constipação.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: neutropenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia, tontura e febre.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: prurido, exantema, urticária, alopécia e angioedema.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Carbamazepina, Insulina e hipoglicemiantes orais.

MESALAZINA

Supositório 250 mg (VR)
Supositório 500 mg (VR)
Supositório 1000 mg (VR)
Enema 3000 mg (VR)
Enema 10 mg/mL (VR)
Comprimido 400 mg (VO)
Comprimido 500 mg (VO)
Comprimido 800 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anti-inflamatório intestinal.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013;

Quantidade Máxima Dispensada:

Enema 10mg/mL – 124 enemas.

Enema 3000mg – 31 enemas.

Supositório 250mg – 496 supositórios.

Supositório 500mg – 248 supositórios.

Supositótio 1000mg – 124 supositórios.

Comprimido 400mg – 310 comprimidos.

Comprimido 500mg – 248 comprimidos.

Comprimido 800mg – 155 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: K51.0; K51.1; K51.2; K51.3; K51.4; K51.5; K51.8. Para comprimidos: K50.0; K50.1; K50.8; K51.0; K51.1; K51.2; K51.3; K51.4; K51.5; K51.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: dor abdominal, flatulência e náusea.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dores articulares.

Sistema Nervoso: vertigens, cefaleia e mal-estar.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: urgência anorretal e exacerbação de hemorróidas.

Sistema Respiratório: broncoespasmo.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: alopécia.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Probenecide, Sulfinpirazona, Espironolactona, Azatioprina e Mercaptopurina.

METADONA

Comprimido 5 mg (VO)
Comprimido 10 mg (VO)
Solução Injetável 10 mg/mL (VS)

CLASSIFICAÇÃO: Narcótico do grupo dos opioides.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista A1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido 5mg – 248 comprimidos.

Comprimido 10mg – 124 comprimidos.

Ampola 10mg/mL – 124 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: R52.1; R52.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: parada cardíaca, palpitação, hipotensão e bradicardia.

Sistema Digestório: náusea, vômito, constipação e boca seca.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: aumento das transaminases.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: tremores e rigidez muscular.

Sistema Nervoso: insônia, sonolência, tontura, fraqueza, cefaleia, alucinações, aumento da pressão intracraniana, depressão do SNC, estimulação paradoxal do SNC, vasodilatação periférica, convulsão, angústia, euforia e confusão.

Sistema Oftálmico: problemas de visão.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: retenção urinária.

Sistema Respiratório: depressão respiratória, dispneia e parada respiratória.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: prurido.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: indutores da CYP3A4, Álcool, Fenobarbital, Fenitoína, Carbamazepina, Amitriptilina, Codeína e Isoniazida+Rifampicina.

METILDOPA
Comprimido 250 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anti-hipertensivo.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: bradicardia.

Sistema Digestório: boca seca, náuseas e diarreia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: depressão da função hepática e icterícia.

Sistema Hematopoiético: granulocitopenia e trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: febre, mal-estar, depressão psíquica, pesadelo, sedação, vertigem, fraqueza, cefaleia e sonolência.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: lactação em ambos os sexos e diminuição da libido nos homens.

Sistema Respiratório: congestão nasal.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: outras drogas anti-hipertensivas, Lítio, Sulfato Ferroso e Gluconato Ferroso.

METILPREDNISOLONA
Solução Injetável 500 mg (IM)

CLASSIFICAÇÃO: Corticosteroide sistêmico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 31 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: K50.0; K50.1; K50.8; Z94.0; Z94.1; Z94.2; Z94.3; Z94.4; T86.4; T86.1.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão.

Sistema Digestório: úlcera péptica com possível perfuração e hemorragia, perfuração do intestino, pancreatite, distensão abdominal e esofagite ulcerativa.

Sistema Endócrino: desenvolvimento de estado cushingoide, supressão do crescimento na criança, refratariedade secundária adrenocortical e hipofisária, diminuição da tolerância aos

carboidratos e manifestações de diabetes melito latente.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fraqueza muscular, miopatia esteroide, osteoporose, fraturas por compressão vertebral, necrose asséptica da cabeça do fêmur e do úmero, fratura patológica dos ossos longos e ruptura do tendão.

Sistema Nervoso: convulsões, vertigem e cefaleia.

Sistema Oftálmico: catarata subcapsular posterior, aumento da pressão intraocular, glaucoma e exoftalmia.

Sistema Renal: retenção de sódio perda de potássio, alcalose hipocalêmica e retenção de líquidos.

Sistema Reprodutor/Urinário: irregularidades menstruais.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: retardamento na cicatrização de ferimentos, pele fina e frágil, petéquias e equimose, eritema, urticárias, dermatite alérgica e edema angioneurótico.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Efedrina, diuréticos depletores de potássio, Ciclosporina, digitálicos, anticoagulantes cumarínicos, anti-inflamatórios não-hormonais e Álcool, Ácido Acetilsalicílico, agentes hipoglicemiantes orais, Cetoconazol, Tacrolimo e estrogênios.

METOCLOPRAMIDA
Comprimido 10 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiemético.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: bloqueio AV, bradicardia, hipertensão ou hipotensão arterial, ICC, retenção líquida, rubor (após altas doses IV) e taquicardia supraventricular.

Sistema Digestório: diarreia e náusea.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: hepatotoxicidade (rara).

Sistema Hematopoiético: agranulocitose, leucopenia, neutropenia e porfiria.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: sonolência, reações distônicas agudas, agitação, fadiga, acatisia, alucinações (raras), cefaleia, confusão mental, crises convulsivas, depressão, discinesia tardia, ideação suicida, insônia, síndrome neuroléptica maligna (rara), sintomas similares aos parkinsonianos e tontura.

Sistema Oftálmico: distúrbio visual.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: amenorreia, galactorreia, ginecomastia, impotência, aumento da frequência miccional e incontinência.

Sistema Respiratório: broncoespasmo e edema laríngeo (raro).

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: edema angioneurótico (raro), rash cutâneo e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: analgésicos opioides, agentes antipsicóticos, Ciclosporina e agentes anticolinérgicos.

METOTREXATO
Comprimido 2,5 mg (VO)
Solução Injetável 25 mg/mL(EV) – Excluído da Tabela de Procedimento SUS

CLASSIFICAÇÃO: Antineoplásico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido 2,5mg – 60 comprimidos.

Ampola 25mg/mL – 5 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: Comprimido 2,5mg: L40.0; L40.1; L40.4; L40.8; L93.0; M05.0; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8; M07.0; M07.3; M08.0; M32.1; M33.0; M33.1; M33.2; M34.0; M34.1; M34.8; M45; Ampola 25mg/mL: L40.0; L40.1; L40.4; L40.8; M05.0; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8; M07.0; M07.3; M08.0; L93.0; L93.1; M32.1; M32.8; M33.0; M33.1; M33.2; M34.0; M34.1; M34.8; M45; M46.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: vasculite.

Sistema Digestório: anorexia, diarreia, estomatite ulcerativa, gengivite, glossite, mucosite, náusea, perfuração intestinal e vômito.

Sistema Endócrino: defeito da oogênese ou espermatogênese

e hiperuricemia.

Sistema Hepático: insuficiência hepática.

Sistema Hematopoiético: hemorragia, leucopenia e trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: calafrios, crises convulsivas, encefalopatia, febre, mal-estar e tontura.

Sistema Oftálmico: turvamento da visão.

Sistema Renal: azotemia, insuficiência renal e nefropatia.

Sistema Reprodutor/Urinário: cistite.

Sistema Respiratório: pneumonia associada à febre, tosse e infiltrado intersticial pulmonar.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: hiperemia cutânea, alopécia, Síndrome de Stevens-Johnson, despigmentação ou hiperpigmentação cutânea, fotossensibilidade e rash cutâneo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: AINEs, salicilatos, penicilinas, Probenecida, sulfonamidas, tetraciclinas, agentes hepatotóxicos (Acitretina e retinóides), Ciclosporina, Mercaptopurina, Teofilina, vacinas com vírus vivos, Colestiramina e Corticosteroides.

METRONIDAZOL

Comprimido 250 mg (VO)
Suspensão Oral 4% (VO)
Gel Vaginal

CLASSIFICAÇÃO: Anti-helmíntico, Antiprotozoário e Imidazólico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

USO SISTÊMICO

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: achatamento da onda T e rubor.

Sistema Digestório: náusea, anorexia, cólicas abdominais, constipação, diarreia, estomatite, glossite, língua saburrosa, sabor incomum ou metálico, proctite, vômito e xerostomia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: neutropenia (reversível) e trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fraqueza e neuropatia periférica.

Sistema Nervoso: ataxia, cefaleia, comprometimento da coordenação, confusão mental, crise convulsiva, febre, insônia, irritabilidade e vertigem.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: cistite, disúria, incontinência, poliúria, urina escurecida e vaginite.

Sistema Respiratório: congestão nasal faringite, rinite e sinusite.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash cutâneo eritematoso e urticária.

USO TÓPICO

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: constipação, náusea e sabor incomum ou metálico.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: sensação de formigamento ou anestesia de extremidades.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: irritação ocular.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: dermatite de contato, irritação, prurido, rash cutâneo, ressecamento e sensação de queimação.

USO VAGINAL

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: distensão abdominal, desconforto, náusea ou vômito, sabor incomum ou metálico e diarreia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: aumento da contagem leucocitária.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: depressão, cefaleia e tontura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: urina escurecida, vaginite, irritação vulvar ou vaginal e desconforto pélvico.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: prurido e rash cutâneo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: certos inibidores da HMG-CoA redutase, Benzodiazepínicos, Lítio, Varfarina, Cisaprida, bloqueadores do canal de cálcio, Ciclosporina, derivados da Ergotamina, Mirtazapina, Nateglinida, Nefazodona, Venlafaxina e outros substratos da CYP3A4.

MICOFENOLATO DE MOFETILA
Comprimido 500 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Imunossupressor.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 186 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: T86.1; T86.4; Z94.0; Z94.1; Z94.4.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: diarreia, vômitos e dispepsia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: leucopenia, anemia e sepse.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: antiácidos, contraceptivos orais, Vacinas de vírus vivos e Aciclovir.

MICOFENOLATO DE SÓDIO
Comprimido 180 mg (VO)
Comprimido 360 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Imunossupressor.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:
Comprimido 180mg – 310 comprimidos.
Comprimido de 360mg – 186 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: T86.1; T86.4; Z94.0; Z94.1; Z94.4.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: distúrbios auditivos, otalgia, surdez e zumbido.

Sistema Cardiovascular: hipertensão arterial, edema periférico, hipotensão arterial, edema, taquicardia, angina, arritmia, aumento da pressão venosa, bradicardia, derrame pericárdico, distúrbio vascular periférico, extra-sístoles supraventriculares, extra-sístoles ventriculares, extra-sístoles, edema facial, fibrilação atrial, hipervolemia, hipotensão postural, ICC, insuficiência cardíaca, palidez, palpitação, parada cardíaca, síncope, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, trombose, trombose arterial, vasodilatação e vasoespasmo.

Sistema Digestório: dor abdominal, náusea, diarreia, constipação, vômito, anorexia, dispepsia, aumento do abdômen, disfagia, distúrbios gástricos, esofagite, estomatite, flatulência, gastroenterite, gastrite, gengivite, hemorragia GI, hiperplasia gengival, íleo paralítico, melena, monilíase GI, monolíase oral, ressecamento da boca e ulceração bucal.

Sistema Endócrino: hiperglicemia, hipercolesterolemia, hipomagnesemia, hipocalemia, hipocalcemia e hipercalcemia.

Sistema Hepático: prova de função hepática anormal, ascite, alcalose, aumento da fosfatase alcalina, aumento da gama-GT, aumento de transaminases, bilirrubinemia, colangite, hepatite, icterícia, icterícia colestática e lesão hepática.

Sistema Hematopoiético: leucopenia, anemia hipocrômica, leucocitose, trombocitopenia, aumento de tromblopastina, aumento de protrombina, distúrbios da coagulação, hemorragia, neutropenia, pancitopenia e policitemia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dorsalgia/lombalgia, fraqueza, tremores, parestesia, artralgia, cãimbras em membros inferiores, cervicalgia, distúrbios articulares, hipertonia, mialgia, miastenia, neuropatia e osteoporose.

Sistema Nervoso: dor, cefaleia, insônia, febre, tontura, ansiedade, agitação, alucinações, calafrios com febre, confusão mental, convulsão, delírio, depressão, labilidade emocional, hipoestesia, mal-estar, nervosismo, pensamento anormal, psicose, sonolência e vertigem.

Sistema Oftálmico: ambliopatia, catarata, conjuntivite, distúrbios da lacrimação, hemorragia ocular e visão anormal.

Sistema Renal: aumento de creatinina, albuminúria, aumento da creatinina, disúria, hematúria, hidronefrose, insuficiência renal, necrose tubular renal e oligúria.

Sistema Reprodutor/Urinário: ITU, aumento da frequência miccional, distúrbio prostático, distúrbios do trato urinário, dor pélvica, edema escrotal, impotência, incontinência urinária, noctúria e retenção urinária.

Sistema Respiratório: dispneia, infecção do trato respiratório, tosse, distúrbios pulmonares, acidose respiratória, alteração da voz, apneia, asma, aumento do escarro, bronquite, derrame pleural, edema pulmonar, epistaxe, faringite, hemoptise, hipertensão pulmonar, hiperventilação, hipóxia, monilíase respiratória, pneumonia, rinite, sinusite e soluços.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash cutâneo, acne, alopécia, carcinoma de pele, celulite, ecmoses, hipertrofia cutânea, hirsutismo, petéquias, prurido, rash cutâneo, vesiculobolhoso e úlcera cutânea.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Aciclovir, Valaciclovir, Ganciclovir, Valganciclovir, Probenecida, salicilatos, antiácidos, Colestiramina, Vacinas com organismos vivos e contraceptivos orais.

MIGLUSTATE
Cápsula 100 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Repositor enzimático.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 93 cápsulas.

CID 10 – MEDICAMENTO: E75.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Campinas e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: diarreia, flatulência, dor abdominal, náusea, constipação, vômito, dispepsia, distenção, perda ou aumento de peso e diminuição de apetite.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: câimbra.

Sistema Nervoso: tremor, tontura, dor de cabeça, parestesia, neuropatia periférica e disfunção cognitiva.

Sistema Oftálmico: distúrbios visuais.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: informe ao seu médico caso esteja usando ou recentemente fez uso de algum outro medicamento, incluindo medicamentos sem prescrição médica. Miglustate pode ser administrado com ou sem a ingestão de alimentos.

MORFINA CLORIDRATO

Solução Oral 10 mg/mL (VO)
Solução Injetável 10 mg/ml (VS, IM ou IV)
Comprimido 10 mg (VO)
Comprimido 30 mg (VO)
Cápsula de Liberação Controlada 30 mg (VO)
Cápsula de Liberação Controlada 60 mg (VO)
Cápsula de Liberação Controlada 100 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Analgésico opióide.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista A1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Solução Oral 10mg/mL – 62 frascos.

Ampola 10mg/mL – 1860 ampolas.

Comprimido 10mg – 1860 comprimidos.

Comprimido 30 mg – 1240 comprimidos.

Comprimido LC 30mg – 279 cápsulas.

Comprimido LC 60mg – 124 cápsulas.

Comprimido LC 100mg – 93 cápsulas.

CID 10 – MEDICAMENTO: R52.1; R52.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: diminuição dos batimentos cardíacos e queda da pressão arterial.

Sistema Digestório: constipação, náusea e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: confusão mental, febre, pesadelos, sedação, sensação de queda iminente, sonolência e tontura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Álcool, outros depressores

do sistema nervoso central, Buprenorfina, Nalaxona, Zidovudina, Buprenorfina, Naltrexona, Amitriptilina e Codeína.

NALTREXONA
Comprimido 50 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antagonista opioide.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.
Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: síncope.

Sistema Digestório: cólica abdominal, diarreia, dor abdominal, falta de apetite, náusea e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dor muscular e nas juntas e aumento da creatina fosfoquinase.

Sistema Nervoso: ansiedade, dor de cabeça, fadiga, insônia, nervosismo, tontura e sonolência.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: infecção respiratória e inflamação da garganta.

Local de Aplicação: coceira, dor, enduração, inchaço, mancha de sangue na pele, nódulos e sensibilidade.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: analgésicos opioides e Tioridazina.

NAPROXENO
Comprimido 250 mg (VO)
Comprimido 500 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anti-inflamatório não-esteroide.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido 250mg – 186 comprimidos.

Comprimido 500 mg – 93 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: M05.0; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8; M08.0; M45; M46.8; M07.0; M07.3.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: distúrbios auditivos.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: dor abdominal, sede, constipação, diarreia,

náuseas, estomatite e azia.

Sistema Endócrino: sudorese.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: vertigens, sonolência, enxaqueca e tontura.

Sistema Oftálmico: distúrbios visuais.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: dispinéia.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupções cutâneas e prurido.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: diuréticos, Varfarina, Álcool, Ácido Acetilsalicílico, outros anti-inflamatórios não-esteroides, anticoagulantes orais, Heparina, agentes trombolíticos, Cefamandol, Cefoperazona, Cefotetano e Plicamicina.

NATALIZUMABE
Solução Injetável 300 mg (EV)

CLASSIFICAÇÃO: Agente imunossupressor seletivo.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 1 ampola.

CID 10 – MEDICAMENTO: G35.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náuseas.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: lesão hepática grave, alteração das enzimas hepáticas e hiperbilirrubinemia.

Sistema Hematopoiético: aumento dos linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos e glóbulos vermelhos nucleados.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: tontura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: urticária e rigidez associadas com as infusões

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: betainterferonas e Acetato de Glatirâmer.

NIFEDIPINA
Comprimido Retard 20 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antianginoso, Vasodilatador e Bloqueador do canal de cálcio.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: ruborização e inchaço periférico.

Sistema Digestório: náusea.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: tontura, dor de cabeça, fraqueza e sensação de queda iminente.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Disopiramida, Flecainida, Procainamida, betabloqueadores, Cimetidina e Quinidina.

NISTATINA
Creme 100.000 UI/4 gramas (Via Vaginal)

CLASSIFICAÇÃO: Antifúngico e Antimicótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

USO ORAL:

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náusea, vômito, diarreia e dor abdominal.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

USO VAGINAL:

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: queimação, coceira, erupção na pele e dor.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

NITRAZEPAM
Comprimido 5 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Benzodiazepínico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista B1 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: fala embolada, sensação de queda iminente, sonolência durante o dia e tontura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Álcool, outros depressores do sistema nervoso central, Fluvoxamina, Itraconazol e Nefazodona.

NORTRIPTILINA, CLORIDRATO
Comprimido 25 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antidepressivo tricíclico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: queda de pressão ao se levantar.

Sistema Digestório: boca seca e constipação intestinal.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: fraqueza, sonolência e fadiga.

Sistema Oftálmico: visão borrada.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Fluvoxamina, Paroxetina, Clonidina, Quinolona, Nafazolina oftálmica, Oximetazolina nasal ou oftálmica, Fenilefrina nasal ou oftálmica, Xilometazolina nasal, Epinefrina, Norepinefrina e hormônio tireoideano.

OCTREOTIDA

Solução Injetável 0,1 mg/mL (SC)
Solução Injetável 10 mg (SC)
Solução Injetável 20 mg (SC)
Solução Injetável de Liberação Controlada 30 mg (SC)

CLASSIFICAÇÃO: Análogo à somastatina e Inibidor do crescimento.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada:

Ampola 0,1mg/mL - 1 ampola.

Ampola 10mg – 8 ampolas.

Ampola 20mg – 4 ampolas.

Ampola 30mg – 2 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: E22.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: alteração ou diminuição dos batimentos cardíacos e alterações na condução dos impulsos nervosos.

Sistema Digestório: diarreia, dor/desconforto na barriga, excesso de gordura nas fezes, gases intestinais, náusea e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: anormalidades na vesícula e trato biliar.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: queimadura ou dor no local da injeção.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Pimozida, Cisaprida, Insulina,

hipoglicemiantes orais, hormônios de crescimento, Diazóxido oral, Bromocriptina e Ciclosporina.

OLANZAPINA
Comprimido 5 mg (VO)
Comprimido 10 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antipsicótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido 5mg – 186 comprimidos.

Comprimido 10mg – 93 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: F20.0; F20.1; F20.2; F20.3; F20.4; F20.5; F20.6; F20.8; F25.0; F25.1; F25.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: ganho de peso.

Sistema Endócrino: aumento médio nos níveis de colesterol total, colesterol LDL e triglicérides de jejum e leve aumento dos níveis de prolactina.

Sistema Hepático: elevações transitórias e assintomáticas das transaminases hepáticas TGP e TGO.

Sistema Hematopoiético: eosinofilia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: marcha anormal e queda, em pacientes idosos.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: incontinência urinária, em pacientes idosos.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

Outros: piora dos sintomas parkinsonianos e alucinações relatadas com grande frequência na terapia associada com a Doença de Parkinson.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Fluvoxamina, Carvão Ativado, Fluoxetina e Imipramina.

PALIVIZUMABE
Solução Injetável 100 mg (IM)

CLASSIFICAÇÃO: Anticorpo Monoclonal.

RESTRIÇÃO: Medicamento da Resolução SS – 249, de 13 de julho de 2007.

Medicamento Termolábel.

Apenas recolhimento da documentação pelas

Unidades – medicamento não disponível.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para prevenção do vírus sincicial respiratório.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: febre.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: rinite e infecção respiratória.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

Outros: otite média.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

PAMIDRONATO
Solução Injetável 60 mg (IV)

CLASSIFICAÇÃO: Anti-hipercalcêmico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 1 ampola.

CID 10 – MEDICAMENTO: M80.0; M80.1; M80.2; M80.3; M80.4; M80.5; M80.8; M81.0; M81.1; M81.2; M81.3; M81.4; M81.5; M81.6; M81.8; M82.0; M82.1; M82.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: palpitação e aumento da pressão arterial.

Sistema Digestório: perda do apetite, má digestão e dor na barriga.

Sistema Endócrino: hipercalemia e diminuição de fosfato no sangue.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: anemia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dor nos ossos e nas juntas.

Sistema Nervoso: dor de cabeça e febre.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: dificuldade para respirar e tosse.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: inchaço, erupção na pele e dor.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: preparações contendo cálcio, Vitamina D, inclusive Calcifediol e outros medicamentos nefrotóxicos.

PARACETAMOL
Comprimido 500 mg (VO)
Solução Oral 200 mg/mL (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Analgésico e Antipirético.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: pode aumentar o nível de cloreto, ácido úrico e glicose.

Sistema Hepático: aumento de bilirrubinas e fosfatase alcalina.

Sistema Hematopoiético: anemia e discrasias sanguíneas (neutropenia, pancitopenia e leucopenia).

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nefrotoxicidade com overdose crônica e nefropatia

analgésica.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash cutâneo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: barbituratos, hidantoínas, Sulfimpirazona e Rifampicina.

PENICILAMINA
Cápsula 250 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente quelante.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 186 cápsulas.

CID 10 – MEDICAMENTO: E83.0; M34.0; M34.1; M34.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: podem ocorrer anorexia, dor epigástrica, náusea, vômito ou diarreia ocasional. Casos isolados de úlcera péptica reativada, assim como disfunção hepática e pancreatite. Colestase intra-hepática e hepatite tóxica foram relatadas raramente. Tem havido alguns relatos de aumento da fosfatase alcalina, desidrogenase láctica sérica e testes positivos de

floculação de cefalina e de turvação do timol. Alguns pacientes podem relatar entorpecimento, diminuição ou perda total da percepção do paladar ou podem desenvolver ulcerações orais. Embora raras, queilose, glossite e gengivo-estomatite têm sido relatadas. Os efeitos colaterais gastrointestinais são geralmente reversíveis após a cessação da terapia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: depressão da medula óssea. leucopenia e trombocitopenia têm ocorrido. Têm sido relatadas mortes como resultado de trombocitopenia, agranulocitose, anemia aplástica e anemia sideroblástica. Também pode ocorrer púrpura trombocitopênica trombótica, anemia hemolítica, aplasia de hemácias, monocitose, leucocitose, eosinofilia e trombocitose.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fraqueza muscular, miastenia grave e distonia.

Sistema Nervoso: zumbidos, neurite óptica, neuropatia periférica sensitiva e motora, alterações mentais, agitação e ansiedade.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: proteinúria e/ou hematúria, as quais, em alguns casos, podem progredir para Síndrome Nefrótica, como resultado de uma glomerulopatia membranosa por imunocomplexos.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: prurido generalizado, erupções precoces e tardias, reações tipo penfigoide e erupções medicamentosas que

podem ser acompanhadas por febre, artralgia ou linfadenopatia.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Hidróxido de Magnésio e Ferro.

PILOCARPINA CLORIDRATO
Solução Oftálmica 2% (TO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiglaucomatoso.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 2 frascos.

CID 10 – MEDICAMENTO: H40.1; H40.2; H40.3; H40.4; H40.5; H40.6; H40.8; Q15.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia temporal ou supraorbitária.

Sistema Oftálmico: espasmo ciliar, irritação ocular, indução de miopia e congestão vascular conjuntival.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: alcaloides da beladona e Ciclopentolato.

PIRAZINAMIDA
Comprimido 500 mg (VO)
Suspensão Oral 3% (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Tuberculostático.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Estratégico.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: anorexia, náusea e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: hepatotoxicidade.

Sistema Hematopoiético: trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artralgia e mialgia.

Sistema Nervoso: mal-estar, febre e fotossensibilidade.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nefrite intersticial.

Sistema Reprodutor/Urinário: disúria.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: acne, prurido e rash cutâneo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

PIRIDOSTIGMINA
Comprimido 60 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Inibidor da acetilcolinesterase.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 372 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G70.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: alterações eletrocardiográficas inespecíficas, arritmias (principalmente bradicardia), bloqueio atrio-ventricular, hipotensão arterial, parada cardíaca, redução de monóxido de carbono, ritmo nodal, rubores, síncope e taquicardia.

Sistema Digestório: cólicas estomacais, diarreia, disfagia, dor abdominal, flatulência, hiperperistaltismo, náusea, salivação e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artralgia, cãimbras musculares, disartria, espasmos, fasciculações, fraqueza e mialgia.

Sistema Nervoso: cefaleia, convulsões, disfonia, perda da consciência, sonolência e tontura.

Sistema Oftálmico: ambliopia, lacrimejamento e pupilas pequenas.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: urgência miccional.

Sistema Respiratório: aumento de secreções brônquicas, broncoespasmo, constrição bronquiolar, depressão respiratória, dispneia, laringoespasmo, parada respiratória e paralisia de músculos respiratórios.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash cutâneo, tromboflebite (I.V.) e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: agentes bloqueadores neuromusculares despolarizantes (Suxametônio), Cloreto de Edrofônio, beta-bloqueadores, aminoglicosídeos, Bacitracina, Colistimetato de sódio, Colistina, concentrações séricas elevadas de magnésio, Polimixina B, Quinidina, Quinolonas e Tetraciclinas.

PIRIMETAMINA
Comprimido 25 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agente antimalárico.

RESTRIÇÃO: Medicamento da Resolução SS – 200, de 06 de

outubro de 2010.

Quantidade Máxima Dispensada: Não há.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para Toxoplasmose em gestante (B36).

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: arritmias.

Sistema Digestório: anorexia, cólicas abdominais, diarreia, glossite atrófica, vômito e xerostomia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: anemia megaloblástica, eosinofilia pulmonar, leucopenia, pancitopenia e trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: crises convulsivas, depressão, febre, insônia, mal-estar e sensação de desmaio.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: hematúria.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: dermatite, eritema multiforme, necrólise epidérmica tóxica, pigmentação anormal da pele, rash cutâneo e Síndrome de Stevens-Johnson.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: agentes antipsicóticos, Sulfonamidas (sinergia), Trimetoprima, Zidovudina, anfetaminas, antidepressivos tricíclicos, alguns beta-bloqueadores, Dapsona, Dextrometorfano, Glimepirida, Glipizida, Losartana, Mirtazapina, Montelucaste, Nateglinida, Nefazodona, Paclitaxel, Paroxetina, Risperidona, Ritonavir, Varfarina, Venlafaxina, Zafirlucaste, Hidrocodona, Oxicodona e Tramadol.

POLICRESULENO CINCHOCAINA
Pomada 50 mg/10 mg (VT)

CLASSIFICAÇÃO: Analgésico Tópico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Especialidades.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: ardência e coceira.

Pele e Anexos: alergia na pele, manifestada como vermelhidão da pele com formação de bolhas acompanhada de coceira persistente, reações alérgicas intensas (anafiláticas) incluindo reações cutâneas (inchaço da pele, da laringe, urticária e outros) e reações generalizadas, podendo ocorrer choque anafilático (reação alérgica súbita, intensa e grave).

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Policresuleno Cinchocaina é de uso exclusivamente tópico. Durante o tratamento deve-se evitar o emprego de outros medicamentos no mesmo local, uma vez que a possibilidade de interação medicamentosa não pode ser excluída.

POLIVITAMÍNICO
Gotas (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Polivitamínico com sais minerais.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: enjoo, vômito, diarreia e queixas digestivas.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: sensação de adormecimento ou formigamento das mãos e pés.

Sistema Nervoso: dor de cabeça.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: coceira, vermelhidão no rosto e enrijecimento da pele.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não se deve administrar esse produto em pessoas que já recebem outras formas de Vitamina A, pelo risco de doses excessivas. A Vitamina A pode interagir com Colestiramina, Isotretinoína, Orlistat e Varfarina. A Nicotinamida pode diminuir o efeito de hipoglicemiantes orais e aumentar o risco de efeitos tóxicos de medicamentos utilizados para o tratamento do colesterol pertencentes à família das estatinas. O uso de Ácido Ascórbico pode reduzir a eficiência dos anticoncepcionais orais, devendo-se empregar outros métodos contraceptivos.

PRAMIPEXOL

Comprimido 0,125 mg (VO)
Comprimido 0,25 mg (VO)
Comprimido 1 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiparkinsoniano.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port.

GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido 0,125mg – 1116 comprimidos.

Comprimido 0,25mg – 558 comprimidos.

Comprimido 1mg – 124 comrpimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G20.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipotensão postural, dor torácica, edema, síncope e taquicardia.

Sistema Digestório: diarreia, xerostomia, anorexia, disfagia, perda de peso, náusea e constipação.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: aumento de transaminases hepáticas.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: discinésia, fraqueza, sintomas extrapiramidais, artrite, bursite, cãimbras em membros inferiores, distúrbios da marcha, espasmos musculares, hipertonia e miastenia.

Sistema Nervoso: insônia, tontura, sonolência, alucinações, cefaleia, confusão mental, acatisia, amnésia, distonias, febre, hiperestesia, mal-estar, mioclonia, paranoia, pensamento anormal e pesadelos.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: redução da libido, aumento da frequência miccional, impotência e incontinência urinária.

Sistema Respiratório: congestão nasal, dispneia e rinite.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: depressores do sistema nervoso central, antagonistas da Dopamina (antipsicóticos e Metoclopramida) e Prometazina.

PRAVASTATINA

Comprimido 10 mg (VO)
Comprimido 20 mg (VO)
Comprimido 40 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antilipêmico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:
Comprimido 10mg – 124 comprimidos.
Comprimido 20mg – 62 comprimidos.
Comprimidos 40mg – 31 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E78.0; E78.1; E78.2; E78.3; E78.4; E78.5; E78.6; E78.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: dor no peito.

Sistema Digestório: náuseas, vômito, diarreia, constipação, dor abdominal e gases.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dor muscular e mialgia.

Sistema Nervoso: vertigem e fadiga.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: rinite.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupções cutâneas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Varfarina e Colestiramina.

PRAZIQUANTEL
Comprimido 600 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anti-helmíntico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Estratégico.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: desconforto abdominal, náusea, vômitos, diarreia e anorexia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: eosinofilia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artralgia e mialgia.

Sistema Nervoso: febre, dor de cabeça, cansaço, sonolência, convulsões, tontura, aumento da pressão intracraniana e edema cerebral.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupções cutâneas, urticária e prurido.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Cloroquina, Eritromicina, Itraconazol, Albendazol e Rifampicina.

PRIMIDONA

Comprimido 100 mg (VO)
Comprimido 250 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anticonvulsivante.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido 100mg – 233 comprimidos.

Comprimido 250mg – 93 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G40.0; G40.1; G40.2; G40.3; G40.4; G40.5; G40.6; G40.7; G40.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: anorexia, náuseas ou vômitos.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: hipoplasia da série vermelha e aplasia à agranulocitose.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: vertigem, sonolência, excitação, fadiga, impotência, tonturas e alterações do humor.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Corticosteroide (Prednisona),

anticoagulante oral (Varfarina), Cloranfenicol, antidepressivo tricíclico (Amitriptilina, Clomipramina e Desipramina), anticoncepcional oral, Corticotrofina, Doxiciclina, Felodipina, Metoprolol, IMAO (inibidor da monoamina-oxidase, incluindo Furazolidona e Procarbazina) e Fenobarbital.

PROMETAZINA CLORIDRATO
Comprimido 25 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antialérgico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: palpitações, bradicardia, taquicardia, alterações da pressão arterial e hipotensão ortostática.

Sistema Digestório: secura da boca e constipação.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: leucopenia, neutropenia, trombocitopenia e anemia hemolítica.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: tremores.

Sistema Nervoso: vertigens, diminuição de memória e/ou concentração, falta de coordenação motora, sedação, tontura,

confusão mental, alucinações e sonolência.

Sistema Oftálmico: alterações da acomodação visual e midríase.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: retenção urinária.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: prurido, púrpura, urticária e edema.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Sultoprida, Clonidina, sedativos, hipnóticos, antidepressivos tricíclicos, tranquilizantes, Atropina, antidepressivos imipramínicos, antiparkinsonianos, anticolinérgicos, antiespasmódicos atropínicos, Disopiramida e neurolépticos.

PROPATILNITRATO
Comprimido 10 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antianginoso.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Especialidades.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: bradicardia.

Sistema Digestório: náusea e vômito.

Sistema Endócrino: sudorese.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia, tontura, fraqueza, taquicardia, inquietação e palpitação.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: vermelhidão da pele, palidez, cianose e dermatite esfoliativa.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: anti-hipertensivos, bloqueadores beta-adrenérgicos (Atenolol e Metildopa), bloqueadores de canais de cálcio (Anlodipino, Sitagliptina, Imatinibe, Finasterida e Enalapril), Álcool, Nitroglicerina e antidepressivos tricíclicos (Amitriptilina, Clomipramina, Imipramina e Nortriptilina).

PROPRANOLOL
Comprimido 40 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anti-hipertensivo.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: insuficiência cardíaca congestiva,

agravamento dos distúrbios de condução atrioventricular, bradicardia intensa e hipotensão.

Sistema Digestório: distúrbios gastrointestinais.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: disfunção sexual.

Sistema Respiratório: broncoespasmo.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: catecolaminas (Reserpina), Hidróxido de Alumínio e Magnésio, Álcool, Fenobarbital, Rifampicina, Antipirina, Lidocaína, Cimetidina, Teofilina, Ibuprofeno, Piroxicam, Clorpromazina e Verapamil.

QUETIAPINA

Comprimido 25 mg (VO)
Comprimido 100 mg (VO)
Comprimido 200 mg (VO)
Comprimido 300 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antipsicótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido 25mg – 992 comprimidos.

Comprimido 100mg – 248 comprimidos.

Comprimido 200mg – 124 comprimidos.

Comprimido 300mg – 62 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: F20.0; F20.1; F20.2; F20.3; F20.4; F20.5; F20.6; F20.8; F25.0; F25.1; F25.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: boca seca e aumento de peso.

Sistema Endócrino: elevação nos níveis séricos de triglicérides, elevação no colesterol total (predominantemente no LDL) e redução do colesterol HDL.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: redução da hemoglobina.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: sintomas extrapiramidais, sonolência e tontura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Clorpromazina e Fenitoína.

RALOXIFENO
Comprimido 60 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Regulador do cálcio ósseo.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 31 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: M80.0; M80.1; M80.2; M80.3; M80.4; M80.5; M80.8; M81.0; M81.1; M81.2; M81.3; M81.4; M81.5; M81.6; M81.8; M82.0; M82.1; M82.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: câimbra nas pernas e espasmos musculares.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: trombose venosa profunda embolismo pulmonar.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rubores, calores, ondas de calor e edema periférico (inchaço das mãos, pés e pernas).

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Colestiramina e Ampicilina.

RANITIDINA
Solução Oral 150 mg/10 mL (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antagonista H_2 da histamina.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa de Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para E84; E84.0; E84.1; E84.8; E84.9.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: arritmias e vasculite.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: pancreatite e insuficiência hepática.

Sistema Hematopoiético: agranulocitose, anemia aplásica, anemia hemolítica adquirida, granulocitopenia, leucopenia,

pancitopenia e trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: alucinações, cefaleia, confusão mental, sonolência, tontura e vertigem.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: pneumonia.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: eritema multiforme e rash cutâneo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Ciclosporina, Varfarina, Iraconazol, Cefalosporinas, Atazavanir e Cianocobalamina.

RIBAVIRINA
Cápsula 250 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiviral.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada: 217 cápsulas.

CID 10 – MEDICAMENTO: B17.1; B18.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: insuficiência cardíaca congestiva. Em bebês gravemente enfermos com risco de vida: parada cardíaca, hipotensão, bradicardia, toxicidade digitálica e bigeminismo.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: elevações na bilirrubina sérica.

Sistema Hematopoiético: redução transitória no valor do hematócrito 23 na ordem de 20%.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: convulsões e fraqueza.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Zidovudina.

RIFAMPICINA

Comprimido 300 mg (VO)
Suspensão Oral 2% (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Tuberculostático.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Estratégico.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: perda de apetite, náuseas, vômitos, colite, diarreia, saliva, suor e lágrimas avermelhadas e sangramento do nariz ou gengiva.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: pancreatite, icterícia e insuficiência hepática.

Sistema Hematopoiético: anemia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dores musculares e tremores.

Sistema Nervoso: confusão mental, distúrbios de coordenação motora, tontura e alterações visuais transitórias.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: sangramento vaginal e coloração avermelhada ou marrom da urina e fezes.

Sistema Respiratório: respiração ofegante.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: alterações na pele (vermelhidão facial, urticária e erupções).

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: antiácidos, Cetoconazol, Diazepam, Quinidina, Disopiramida, Cloranfenicol, Dapsona, Varfarina, Imipramina, Clomipramina, Fenitoína, Fluconazol, Itraconazol, Cetoconazol, Propranolol, Verapamil, Isradipino, Nisoldipino, Ciclosporina, Bosentana, Praziquantel, Levotiroxina, Tacrolimo,

Teofilina, Paracetamol, Clofibrato, Amitriptilina, Nortriptilina, estrogênios combinados a progestogênios (anticoncepcionais), Indinavir, Nelfinavir, Saquinavir, Efavirenz, Nevirapina, Ritonavir, Saquinavir, Clorpropamida, Tolbutamida, Miconazol e Álcool.

RILUZOL
Comprimido 50 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Regulador motor.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 62 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G12.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: taquicardia.

Sistema Digestório: náusea, diarreia, dor abdominal e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: aumento transitório dos níveis de alanina-aminotransferase (TGP), testes de função hepática anormal e pancreatite.

Sistema Hematopoiético: anemia e casos isolados de neutropenia severa.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: dor de cabeça, tontura, parestesia oral e sonolência.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não foram realizados até o momento estudos clínicos para avaliar as interações de Riluzol com outros fármacos.

RISEDRONATO SÓDICO
Comprimido 35 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiosteuporótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 5 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: M80.0; M80.1; M80.2; M80.3; M80.4; M80.5; M80.8; M81.0; M81.1; M81.2; M81.3; M81.4; M81.5; M81.6; M81.8; M82.0; M82.1; M82.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: constipação, dispepsia, náusea, dor abdominal, diarreia, gastrite, esofagite, disfagia, duodenite, úlcera esofágica, glossite e estenose esofágica.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dor musculoesquelética.

Sistema Nervoso: dor de cabeça.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não foram realizados estudos formais de interação medicamentosa, entretanto, durante os estudos clínicos não foi observada qualquer interação clinicamente relevante com outros medicamentos. A ingestão concomitante de medicamentos contendo cátions polivalentes (ex. cálcio, magnésio, ferro e alumínio) irá interferir em sua absorção.

RISPERIDONA

Comprimido 1 mg (VO)
Comprimido 2 mg (VO)
Comprimido 3 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Neuroléptico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port.

GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido 1mg – 186 comprimidos.

Comprimido 2mg – 93 comprimidos.

Comprimido 3mg – 62 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: F20.0; F20.1; F20.2; F20.3; F20.4; F20.5; F20.6; F20.8; F25.0; F25.1; F25.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: constipação, náuseas, vômito e dor abdominal.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: insônia, agitação, ansiedade, cefaleia, sonolência, cansaço, tontura, dificuldade de concentração, tremor, rigidez e hipersalivação.

Sistema Oftálmico: visão turva.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: incontinência urinária, disfunção sexual e diminuição da libido.

Sistema Respiratório: rinite.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash cutâneo e prurido.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Ácido Valproico, Clorpromazina e Fluoxetina.

RITUXIMABE
Solução Injetável 500 mg (EV)

CLASSIFICAÇÃO: Anti-inflamatório biológico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 2 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: M05.0; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipertensão, bradicardia, taquicardia, hipotensão ortostática e vasodilatação.

Sistema Digestório: dor abdominal, alargamento abdominal, diarreia, dispepsia, perda de peso e anorexia.

Sistema Endócrino: sudorese noturna, hiperglicemia, edema periférico, aumento de HDL, edema, edema facial, hipocalcemia e hiperuricemia.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: anormalidades hematológicas ocorrem em uma minoria de pacientes, sendo normalmente leves e reversíveis. Trombocitopenia e neutropenia severas ocorreram individualmente em 1,8 % dos pacientes e anemia severa ocorreu em 1,4 % dos pacientes.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artralgia, mialgia, dores, dor óssea e hipertonia.

Sistema Nervoso: tontura, ansiedade, depressão, parestesia, hiperestesia, agitação, insônia, nervosismo, sonolência e neurite.

Sistema Oftálmico: distúrbios lacrimais.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: disúria e hematúria.

Sistema Respiratório: broncoconstrição, aumento da tosse, asma e laringismo.

Local de Aplicação: dor.

Pele e Anexos: ressecamento da pele.

Outros: eventos adversos relacionados à infusão: febre e calafrios/tremores ocorrendo principalmente durante a primeira infusão, normalmente dentro das primeiras 2 horas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

RIVASTIGMINA

Comprimido 1,5 mg (VO)
Comprimido 3,0 mg (VO)
Comprimido 4,5 mg (VO)
Comprimido 6,0 mg (VO)
Solução Oral 2,0 mg/mL (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Inibidor da colinesterase cerebral.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido 1,5mg - 248 comprimidos.

Comprimido 3,0mg – 124 comprimidos.

Comprimido 4,5mg e 6,0mg – 62 comprimidos.

Solução Oral 2,0mg/mL – 2 frascos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G30.0; G30.1; G30.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: má digestão, náusea, perda do apetite e vômito.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: fadiga ou fraqueza.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: medicamentos com ação colinérgica, anticolinérgicos, relaxante muscular como a Succinilcolina e Betanecol.

SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
Pó liofilizado (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Produto Nutricional.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: vômitos.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

SALBUTAMOL
Aerossol 100 mcg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiasmático.

RESTRIÇÃO: Medicamento da Resolução SS nº 278 de 26 de julho de 2007.

Medicamento do Programa de Fibrose Cística.

CID 10 – MEDICAMENTO: J41.0; J41.1; J41.8; J42; J43.1; J43.2; J43.8; J43.9; J44.0; J44.1; J44.8; J44.9.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: aumento dos batimentos do coração e palpitação.

Sistema Digestório: náusea e aumento do apetite.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: cãimbras e tremor.

Sistema Nervoso: dor de cabeça, excitação, hiperatividade, insônia, nervosismo, tontura e fraqueza.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: estreitamento dos brônquios, tosse, bronquite, resfriado e asma.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

Outros: inflamação no ouvido.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: antidepressivos tricíclicos, betabloqueadores, bloqueador alfa-adrenérgico (Fentolamina), Fenotiazina, anestésicos hidrocarbonados halogenados, Ciclopropano, digitálicos, diuréticos mercuriais, halotano, IMAO (inibidor da monoamino-oxidase), outros simpaticomiméticos e Quinidina.

SALMETEROL XINAFOATO
Aerossol 50 mcg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiasmático.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado –

Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 2 frascos.

CID 10 – MEDICAMENTO: J45.0; J45.1; J45.8; J44.0; J44.1; J44.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: inflamação no nariz e garganta.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: dor de cabeça.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: infecção respiratória.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: beta-agonistas, outras metilxantinas, Teofilina, IMAO (inibidor de monoamina-oxidase), antidepressivos tricíclicos, betabloqueadores e bloqueadores alfa-adrenérgicos.

SELEGILINA, CLORIDRATO
Comprimido 5 mg (VO)
Comprimido 10 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiparkinsoniano.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido 5mg - 62 comprimidos.

Comprimido 10mg - 31 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G20.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: arritmia.

Sistema Digestório: boca seca, dor epigástrica, náusea, vômito, diarreia, constipação, perda de peso, dispepsia, sangramento gastrointestinal e queimação da boca e lábios.

Sistema Endócrino: excesso de transpiração.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: hipotensão postural, hipertensão, arritmias,

palpitações, angina, taquicardia, bradicardia, síncope, edema periférico, alucinações, tonturas, confusão, ansiedade, depressão, sonolência, distúrbio de humor, pesadelos, nervosismo e fadiga.

Sistema Oftálmico: visão turva.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: retenção urinária, hiperplasia prostática e disfunção sexual.

Sistema Respiratório: asma.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: edema de tornozelos e queda de cabelo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Levodopa, Meperidina, antidepressivos tricíclicos, Fenobarbital e Fluoxetina.

SERTRALINA CLORIDRATO
Comprimido 50 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antidepressivo.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: dor torácica, edema periférico, hipertensão, palpitações, edema periorbital, síncope e taquicardia.

Sistema Digestório: diarreia/fezes amolecidas, dispepsia, náusea, dor abdominal, aumento do apetite, constipação, pancreatite e vômito.

Sistema Endócrino: galactorreia, ginecomastia, hiperprolactinemia e hipotireoidismo, síndrome da secreção inapropriada de hormônio antidiurético (ADH).

Sistema Hepático: eventos hepáticos graves (incluindo hepatite, icterícia e disfunção hepática) e elevações assintomáticas das transaminases hepáticas (TGO e TGP).

Sistema Hematopoiético: função plaquetária alterada, distúrbios hemorrágicos (tais como epistaxe, hemorragia gástrica e hematúria), leucopenia, púrpura e trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artralgia.

Sistema Nervoso: boca seca, midríase, anorexia, insônia e sonolência, fadiga, febre, coma, convulsões, dor de cabeça, enxaqueca, distúrbios motores, (incluindo sintomas extrapiramidais tais como, hipercinesia, hipertonia, ranger de dentes e distúrbios da marcha), contrações musculares involuntárias, parestesia, hipoestesia, tontura, agitação, reações agressivas, ansiedade, sintomas de depressão, euforia, alucinações, diminuição da libido feminina e masculina, paroníria, psicose, bocejo, tremor e aumento da sudorese.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: disfunção sexual (principalmente retardo na ejaculação), irregularidades menstruais, incontinência e retenção urinária.

Sistema Respiratório: broncoespasmo.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: reação alérgica, alopécia, reação de fotossensibilidade na pele, prurido, rash (incluindo casos raros de graves distúrbios esfoliativos da pele, por exemplo, síndrome de Stevens-Johnson e necrose epidérmica), urticária e reação anafilactoide.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Cimetidina, Lítio, Varfarina, Diazepam e Tolbutamida.

SEVELÂMER
Comprimido 800 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Redutor de fósforo e Quelante intestinal.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 279 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: E83.3; N18.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: flatulência, constipação, diarreia e náusea.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Ciprofloxacino.

SILDENAFIL CITRATO

Comprimido 20 mg (VO)
Comprimido 25 mg (VO)
Comprimido 50 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Agentes inibidores das fosfodiesterase tipo 5.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido 20mg – 372 comprimidos.

Comprimido 25mg – 186 comprimidos.

Comprimido 50mg – 93 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: Sildenafil 20mg: I27.0; I27.2; I27.8. Sildenafil 25mg e 50mg: M34.0; M34.1; M34.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: cefaleia.

Sistema Digestório: dispepsia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: rubor e tontura.

Sistema Oftálmico: alterações visuais.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: congestão nasal.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: medicamentos a base de nitratos, Ritonavir, Bosentana e Cetoconazol.

SIROLIMO
Drágea 1 mg (VO)
Drágea 2 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Imunossupressor.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Drágea 1mg – 156 drágeas.

Drágea 2mg – 63 drágeas.

CID 10 – MEDICAMENTO: T86.1; Z94.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipertensão, alteração no exame físico cardiovascular, hemorragia, hipervolemia, hipotensão e taquicardia.

Sistema Digestório: anorexia, flatulência, teste de função hepática anormal, monilíase oral e vômitos, dor abdominal, constipação, diarreia, dispepsia e náusea.

Sistema Endócrino: aumento de creatinina, edema, edema periférico, hipercolesteremia, hiperlipemia, hipofosfatemia, Síndrome de Cushing e diabetes mellitus.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: equimose, leucocitose, leucopenia, anemia e trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artralgia.

Sistema Nervoso: tremor, febre, enxaqueca, agitação, ansiedade, confusão, depressão, tontura, hipestesia, hipotonia, insônia, parestesia e sonolência.

Sistema Oftálmico: visão anormal.

Sistema Renal: albuminúria, dor vesicular, disúria, hematúria, hidronefrose, necrose tubular renal, oligúria, edema escrotal, nefropatia tóxica.

Sistema Reprodutor/Urinário: infecção do trato urinário,

incontinência urinária e retenção urinária.

Sistema Respiratório: dispneia, faringite, aumento de tosse, epistaxe, derrame pleural, pneumonia, alteração no exame físico pulmonar e rinite.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: acne, hirsutismo, prurido, exantema, distúrbio da pele e sudorese.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: inibidores potentes da CYP3A4 (Cetoconazol, Voriconazol, Itraconazol, Telitromicina e Claritromicina, indutores da CYP3A4 (Rifabutina), bloqueadores do canal de cálcio, antifúngicos, antibióticos, agentes procinéticos gastrointestinais (Cisaprida e Metoclopramida), Danazol, inibidores da protease do HIV, anticonvulsivantes, Bosentana e Tacrolimo.

SOMATROPINA HUMANA

Solução Injetável 4 UI (IM)
Solução Injetável 12 UI (IM)

CLASSIFICAÇÃO: Hormônio de Crescimento.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C5 – Port. nº 344/1998.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada:

Ampola 4UI – 93 ampolas.

Ampola 12UI – 31 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: E23.0; Q96.0; Q96.1; Q96.2; Q96.3; Q96.4; Q96.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: hipotireodismo.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dor muscular localizada.

Sistema Nervoso: dor de cabeça.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: retenção hídrica com edemas perféricos.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: reações transitórias no local da injeção (edema leve e transitório, dor e inflamação).

Pele e Anexos: exantema e prurido.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: hormônios adrenocorticoides, glicocorticoides, ACTH, corticosteroides e Insulina.

SULFADIAZINA
Comprimido 500 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antibiótico sistêmico.

RESTRIÇÃO: Medicamento da Resolução SS – 200, de 06 de outubro de 2010.

Dose Recomendada: 3 gramas/dia.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para Toxoplasmose em gestantes (B36).

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Guarulhos, Campinas e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náuseas, vômitos e epigastralgias.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: colestase biliar e hepatite.

Sistema Hematopoiético: leucopenia e trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: febre e cefaleia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nefropatias.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: prurido e reações cutâneas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados concretos disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA
Suspensão Oral 400/80 (VO)
Comprimido 400/80 (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antibiótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: miocardite alérgica.

Sistema Digestório: desconfortos gastrointestinais (anorexia, náusea e vômito).

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: aumento de transaminases, hepatotoxicidade (incluindo hepatite, colestase e necrose hepática) e hiperbilirrubinemia.

Sistema Hematopoiético: agranulocitose, anemia (megaloblástica, hemolítica/autoimune, aplástica), metahemoglobinemia, pancitopenia ou púrpura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artralgia, mialgia e rabdomiólise.

Sistema Nervoso: alucinações, ataxia, confusão mental, crises convulsivas, depressão, febre, icterícia nuclear em neonatos, meningite asséptica e neurite periférica.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: cristalíuria, diurese, insuficiência renal, nefrite intersticial e nefrotoxicidade (em associação com a Ciclosporina).

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: dispneia, infiltrados pulmonares e tosse.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: rash cutâneo e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: diuréticos, Varfarina, Ciclosporina, hipoglicemiantes orais e Amantadina.

SULFASSALAZINA
Comprimido 500 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anti-inflamatório.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 372 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: K50.0; K50.1; K50.8; K51.0; K51.1; K51.2; K51.3; K51.4; K51.5; K51.8; K52.2; M02.3; M05.0; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8; M07.0; M07.3; M07.4; M07.5; M07.6; M08.0; M45; M46.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: anorexia, náuseas, vômitos e distensão

abdominal.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: palidez ou amarelamento nos olhos e pele.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Ácido Fólico e Digoxina.

SULFATO FERROSO
Solução Oral (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antianêmico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: constipação (principalmente em idosos), fezes escuras, náusea, diarreia, dor epigástrica e irritação gastrointestinal.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: soluções orais podem causar manchas nos dentes.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Omeprazol, Levotiroxina, derivados do leite, assim como de sais de cálcio e de magnésio, Ácido Ascórbico, antiácidos e Metildopa.

TACROLIMO
Comprimido 1 mg (VO)
Comprimido 5 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Imunossupressor.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido 1mg – 930 comprimidos.

Comprimido 5mg – 248 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: T86.1; T86.4; Z94.0; Z94.4; N04.0;

N04.1; N04.2; N04.4; N04.5; N04.6; N04.7; N04.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: dor torácica, hipertensão (aumento da pressão sanguínea) e cardiomiopatias hipertróficas.

Sistema Digestório: diarreia e náusea.

Sistema Endócrino: hipocalemia e hipercalemia, hiperuricemia, diminuição dos níveis sanguíneos de cálcio, magnésio, fosfato e sódio.

Sistema Hepático: aumento das enzimas hepáticas e icterícia.

Sistema Hematopoiético: distúrbios da coagulação, trombocitopenia, leucocitose e leucopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: cãimbras nas pernas e dores localizadas.

Sistema Nervoso: insônia, febre, tremor e cefaleia.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: elevação da concentração de creatinina plasmática, disfunção renal leve, síndrome urêmica hemolítica e necrose tubular.

Sistema Reprodutor/Urinário: aumento na frequência de micção (vontade de urinar).

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Diltiazem, Nicardipina,

Claritromicina, Eritromicina, Troleandomicina, Clotrimazol, Fluconazol, Itraconazol, Cetoconazol, Voriconazol, Cisaprida, Metoclopramida, Bromocriptina, Cloranfenicol, Cimetidina, Ciclosporina, Danazol, Etilenoestradiol, Metilprednisolona, Omeprazol, Nefazodona, Azitromicina, Bosentana, Fenobarbital, Rifabutina, Caspofungina, Rifampicina, Sirolimo e Hypericum Perforatum.

TALIDOMIDA
Comprimido 100 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anti-inflamatório, Sedativo e Hipnótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Estratégico.
Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C3 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: diminuição da pressão arterial e batimento cardíaco acelerado.

Sistema Digestório: constipação, diarreia, náusea, secura da boca, aumento do apetite e dor estomacal.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: neutropenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia, neuropatia periférica (tinido, formigamento, queimação, dormência ou dor nas mãos, braços, pés ou pernas e fraqueza muscular), sonolência, vertigem, alterações de humor e hipotensão ortostática.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: ressecamento da pele e rash cutâneo.

Outros: teratogenicidade.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Álcool, barbituratos, ansiolíticos, antidepressivos, anti-histamínicos, relaxantes musculares, outros medicamentos depressores do sistema nervoso central, Reserpina, Cisplatina, Dapsona, Didanosina, Etionamida, Hidralazina, Isoniazida, Lítio, Metronidazol, Nitrofurantoína, Óxido Nitroso, Fenitoína, Estavudina, Vincristina, Zalcitabina, Griseofulvina, Rifabutina, inibidores das proteases e contraceptivos.

TALIGLUCERASE ALFA
Solução Injetável 200 UI (IV)

CLASSIFICAÇÃO: Repositor enzimático.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 48 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: E75.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Campinas e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: irritação na garganta, náusea (enjôo), vômito e dor abdominal.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: artralgia, dor nas extremidades e dor lombar.

Sistema Nervoso: dor de cabeça, tontura e fadiga.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: dor.

Pele e Anexos: erupção cutânea, prurido, rubor e hipersensibilidade.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

TELAPREVIR
Comprimido 375 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiviral.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 186 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: B18.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náusea, diarreia, vômito e candidíase oral.

Sistema Endócrino: hipotireoidismo, hiperuricemia e hipocalemia.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: trompocitopenia, linfopenia e anemia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: prurido e erupção cutânea.

Outros: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Amiodarona, Astemizol, Bepridil, Cisaprida, Pimozida, Quinidina, Terfenadina, Ergonovina, Ergotamina, Metilergonovina, Sinvastatina, Midazolam ou Triazolam, Alfuzosina, Sildenafila, Tadalafila e substratos de polipeptídeos transportadores de ânions orgânicos (Fluvastatina, Pravastatina, Rosuvastatina e Repaglinida)

TENOFOVIR
Comprimido 300 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antirretroviral.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C4 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada: 31 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: B18.1.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: vômitos, diarreia, náusea e gases intestinais.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: tontura, dor de cabeça, depressão e fraqueza.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupção cutânea.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Cidofovir, Aciclovir, Valaciclovir, Ganciclovir e Valganciclovir.

TEOFILINA
Comprimido 100 mg (VO)
Comprimido 200 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Broncodilatador.

RESTRIÇÃO: Medicamento da Resolução SS nº 278 de 26 de julho de 2007.

Quantidade Máxima Dispensada: 999 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: J41.0; J41.1; J41.8; J42; J43.1; J43.2; J43.8; J43.9; J44.0; J44.1; J44.8; J44.9

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: batimentos cardíacos rápidos.

Sistema Digestório: náuseas, vômitos e diarreia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: dor de cabeça persistente, insônia e agitação.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: falência renal aguda.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: reações de hipersensibilidade.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Alopurinol, Aminoglutetimida, barbitúricos (especialmente Pentobarbital), Carbamazepina, Cimetidina, Ciprofloxacino, Claritromicina, Dissulfiram, Diuréticos, Enoxacino, Eritromicina, Estrogênio, Fluvoxamina, Halotano, Imipenem, Interferon-alfa, Isoproterenol, Litio, Josamicina, Esperamicina, Metotrexato, Mexiletina, Moricizina, Pentoxifilina, Fenobarbital, Fenitoina, Primidona, Propafenona, Propanolol, Rifampicina, Sulfimpirazona, Tacrina, Tiabendazol, Ticlopidina, Troleandomicina, Verapamil e Zileuton.

TIAMINA CLORIDRATO
Comprimido 300 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Vitamina.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Dose Certa.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: reações alérgicas.

Outros: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existe registro de interação da vitamina B1 (via oral) com outras drogas.

TIMOLOL MALEATO
Solução Oftálmica 0,5% (TO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiglaucomatoso.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port.

GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 1 frasco.

CID 10 – MEDICAMENTO: H40.1; H40.2; H40.3; H40.4; H40.5; H40.6; H40.8; Q15.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: zumbido.

Sistema Cardiovascular: hipertensão arterial, angina de peito, arritmia, AVC, bloqueio cardíaco, bradicardia, edema, hipotensão arterial, insuficiência cardíaca, isquemia cerebral, palpitação, parada cardíaca e bradicardia.

Sistema Digestório: anorexia, diarreia, dispepsia, náusea e xerostomia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: exacerbação da miastenia grave e parestesia.

Sistema Nervoso: cefaleia, fadiga, tontura, alucinações, ansiedade, confusão mental, depressão, desorientação, insônia, nervosismo, perda de memória, pesadelos e sonolência.

Sistema Oftálmico: catarata, congestão conjuntival, conjuntivite, hiperemia, lacrimejamento, prurido, redução da acuidade visual, sensação de corpo estranho, turvamento da visão ceratite, diplopia, distúrbios da refração, distúrbios visuais, edema macular

cistóide, oftalmalgia, ptose, redução da sensibilidade corneana, ressecamento dos olhos e secreção ocular.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: redução da libido, fibrose retroperitoneal e impotência.

Sistema Respiratório: dispneia, broncoespasmo, congestão nasal, dispneia, edema pulmonar, insuficiência respiratória e tosse.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: alopécia, angioedema, exacerbação da psoríase, rash cutâneo e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Clorpromazina, Delavirdina, Miconazol, Paroxetina, Pergolida, Quinidina, Quinina, Ritonavir, Ropinirol, Prazosina, Terazosina, Epinefrina, Fenilefrina, Insulina, hipoglicemiantes orais, AINEs, barbituratos, Colestiramina, penicilinas (Ampicilina), Sais de Alumínio, Sais de Cálcio, salicilatos, sulfonilureias, Disopiramida e relaxantes musculares não despolarizantes.

TIORIDAZINA
Comprimido 100 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Neuroléptico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Saúde Mental.
Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: alterações eletrocardiográficas, edema periférico, hipotensão arterial e hipotensão ortostática.

Sistema Digestório: constipação, diarreia, ganho de peso, gastralgia, náusea, vômito e xerostomia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: icterícia colestática e hepatotoxicidade.

Sistema Hematopoiético: agranulocitose e leucopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: tremores e crises convulsivas.

Sistema Nervoso: comprometimento da regulação da temperatura, redução do limiar comicial, síndrome neuroléptica maligna, sintomas extrapiramidais (acatisia, discinesia tardia, distonias, pseudoparkinsonismo), sonolência e tontura.

Sistema Oftálmico: alterações da córnea e do cristalino, retinopatia pigmentar e turvamento da visão.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: alterações da libido, alterações do ciclo menstrual, amenorreia, galactorreia, mastalgia, dificuldade miccional, distúrbios da ejaculação, priapismo e retenção urinária.

Sistema Respiratório: congestão nasal.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: alteração da cor da pele (azul-acinzentada), aumento da sensibilidade ao sol e rash cutâneo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Fluvoxamina, Pindolol,

Clorpromazina, Delavirdina, Miconazol, Paroxetina, Pergolida, Quinidina, Quinina, Ritonavir, Ropinirol, agentes depletores de potássio, Metoclopramida, anti-hipertensivos, anfetaminas, antidepressivos tricíclicos, beta-bloqueadores, Dextrometorfano, Lidocaína, Mirtazapina, Nefazodona, Paroxetina, Ritonavir, Venlafaxina, Sais de Alumínio, antipsicóticos, anticolinérgicos, anti-hipertensivos, Levodopa e indutores enzimáticos.

TIOTRÓPIO
Aerossol 2,5 mcg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Broncodilatador.

RESTRIÇÃO: Medicamento da Resolução SS nº 278 de 26 de julho de 2007.

Quantidade Máxima Dispensada: 2 frascos

CID 10 – MEDICAMENTO: J41.0; J41.1; J41.8; J42; J43.1; J43.2; J43.8; J43.9; J44.0; J44.1; J44.8; J44.9.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: taquicardia e palpitações.

Sistema Digestório: boca seca, estomatite, constipação, doença de refluxo gastroesofágico, gengivite, glossite e candidíase orofaríngea.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: vertigem e insônia.

Sistema Oftálmico: visão embaçada e pressão intraocular aumentada.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: dificuldade de urinar e retenção urinária (normalmente em homens com fatores predisponentes) e infecção do trato urinário.

Sistema Respiratório: disfonia, broncoespasmo, tosse, faringite, epistaxe, laringite e sinusite.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupção cutânea, urticária, prurido e reações de hipersensibilidade.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: fármacos anticolinérgicos.

TOBRAMICINA

Solução para Nebulização 300 mg/5 mL (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antibiótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa de Fibrose Cística.
Medicamento Termolábel.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há – Dispensado para E84; E84.0; E84.1; E84.8; E84.9.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: ototoxicidade (auditiva e vestibular), perda da audição, ronco nos ouvidos e zumbido.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: diarreia, náusea, vômito e alteração da cor do escarro.

Sistema Endócrino: redução dos níveis séricos de cálcio, magnésio, potássio e/ou sódio.

Sistema Hepático: aumento do TGO, TGP, bilirrubinas e/ou desidrogenase lática.

Sistema Hematopoiético: anemia, eosinofilia, granulocitopenia, leucocitose, leucopenia e trombocitopenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: cefaleia, confusão mental, desorientação, febre, letargia, tontura, vertigem e mal-estar.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: aumento da creatinina sérica, oligúria e proteinúria.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: alteração da voz.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: dermatite esfoliativa, prurido e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: penicilaminas de amplo espectro, diuréticos de alça, bloqueadores neuromusculares, Anfotericina B e Cefalosporinas.

TOCILIZUMABE
Solução Injetável 20 mg/mL (IV)

CLASSIFICAÇÃO: Agentes imunossupressores.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada: 20 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: M05.0; M05.3; M05.8; M06.0; M06.8; M08.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: aumento da pressão sanguínea.

Sistema Digestório: dor na região abdominal, ulcerações na boca (aftas), diverticulite, estomatite e gastrite.

Sistema Endócrino: ganho de peso e aumento de colesterol e triglicérides.

Sistema Hepático: aumento de enzimas hepáticas.

Sistema Hematopoiético: leucopenia e neutropenia.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: dor de cabeça e tonturas.

Sistema Oftálmico: conjuntivite.

Sistema Renal: nefrolitíase.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: tosse, falta de ar e infecções de vias aéreas superiores.

Local de Aplicação: reação no local da aplicação.

Pele e Anexos: celulite (inflamação dos tecidos abaixo da pele), erupções (lesões de pele avermelhadas), coceira e urticária.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: bloqueadores dos canais de cálcio, Varfarina e benzodiazepínicos.

TOLCAPONE
Comprimido 100 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiparkinsoniano.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada: 186 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G20.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: dor abdominal, náusea, constipação e diarreia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: cãimbras nas pernas.

Sistema Nervoso: tontura, insônia, fadiga, alucinações, cefaleia, boca seca, confusão, queda, hipotensão postural, vertigem e tremor.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: urina anormal.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: fármacos metabolizados pela COMT, Tolbutamida, Varfarina e Benserazida.

TOPIRAMATO

Comprimido 25 mg (VO)
Comprimido 50 mg (VO)
Comprimido 100 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anticonvulsivante e Antiepiléptico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Comprimido 25mg – 372 comprimidos.

Comprimido 50mg – 186 comprimidos.

Comprimido 100mg – 93 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G40.0; G40.1; G40.2; G40.3; G40.4; G40.5; G40.6; G40.7; G40.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: enjoo, perda de peso e diarreia.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: parestesias.

Sistema Nervoso: disfunção cognitiva, sedação e fadiga.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: urolitíase.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Carbamazepina, depressores do sistema nervoso central, anticoncepcionais orais, Metformina, Gliburida, Pioglitazona, Hidroclotiazida, Lítio e Ácido Valproico.

TOXINA BOTULÍNICA TIPO A

Solução Injetável 100 UI (IM)
Solução Injetável 500 UI (IM)

CLASSIFICAÇÃO: Analéptico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Termolábel.

Quantidade Máxima Dispensada:

Ampola 100UI – 8 ampolas.

Ampola 500UI - 5 ampolas.

CID 10 – MEDICAMENTO: G04.1; G24.0; G24.1; G24.2; G24.3; G24.4; G24.5; G24.8; G51.8; G80.0; G80.1; G80.2; G81.1; G82.1; G82.4; I69.0; I69.1; I69.2; I69.3; I69.4; I69.8; T90.5; T90.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Campinas e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: boca seca.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: fraqueza da musculatura cervical.

Sistema Nervoso: nenhum registro em literatura.

Sistema Oftálmico: irritação ocular, fotofobia e lacrimejamento.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: sensação dolorosa e equimoses ou formação de hematomas nos pontos de aplicação e fraqueza excessiva dos músculos injetados.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

Outros: paralisia das cordas vocais.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: antibióticos aminoglicosídicos ou quaisquer outras drogas que interfiram com a transmissão neuromuscular.

TRAVOPROSTA
Solução Oftálmica 0,004% (TO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiglaucomatoso.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada: 1 frasco.

CID 10 – MEDICAMENTO: H40.1; H40.2; H40.3; H40.4; H40.5; H40.6; H40.8; Q15.0.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: diminuição dos batimentos cardíacos e dor no peito.

Sistema Digestório: nenhum registro em literatura.
Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.
Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.
Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.
Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.
Sistema Muscular e Esquelético: artrite e dor nas costas.
Sistema Nervoso: ansiedade, depressão e dor de cabeça.
Sistema Oftálmico: vermelhidão nos olhos, diminuição da acuidade visual, desconforto ocular, sensação de corpo estranho, dor, coceira, visão anormal, inflamação das pálpebras, visão borrada, catarata, conjuntivite, olho seco, distúrbios oculares, alteração de cor da íris, inflamação da córnea, crosta na borda da pálpebra, sensibilidade à luz, hemorragia subconjuntival e lacrimejamento.
Sistema Renal: nenhum registro em literatura.
Sistema Reprodutor/Urinário: distúrbios da próstata, descontrole na eliminação da urina e infecção urinária.
Sistema Respiratório: sinusite, bronquite e sintomas de resfriado.
Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.
Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.

TRIEXIFENIDIL
Comprimido 5 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anticolinérgico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista B1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada: 93 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G20.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: taquicardia.

Sistema Digestório: constipação, secura da boca e náusea leve.

Sistema Endócrino: perda de peso.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: sonolência, vertigem, nervosismo, delírio, alucinações, confusão e prejuízo da memória, fraqueza, cefaleia e alterações no sono.

Sistema Oftálmico: visão turva, dilatação das pupilas e pressão intraocular aumentada.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: retenção urinária.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: erupções cutâneas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: canabinóides, barbitúricos,

opiáceos, Álcool ou outros depressores do sistema nervoso central, inibidores da monoaminoxidase, Clozapina, Codeína e antidepressivos tricíclicos.

TRIPTORRELINA
Solução Injetável 3,75 mg (IM)
Solução Injetável 11,25 mg (IM)

CLASSIFICAÇÃO: Anticolinérgico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Quantidade Máxima Dispensada:

Ampola 3,75mg – 2 ampolas.

Ampola 11,25mg – 1 ampola.

CID 10 – MEDICAMENTO: D25.0; D25.1; D25.2; E22.8; N80.0; N80.1; N80.2; N80.3; N80.4; N80.5; N80.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: náusea.

Sistema Endócrino: aumento da sudorese.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: valores elevados de algumas enzimas sanguíneas (LDH, gamaGT, TGO, TGP) e reação anafilática.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: dor óssea, mialgia e artralgia.

Sistema Nervoso: cefaleia, cansaço, distúrbios do sono, humor depressivo e irritabilidade.

Sistema Oftálmico: distúrbios visuais.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: impotência, disúria, diminuição da libido, sangramento ou secura vaginal e/ou dispareunia e aumento inicial transitório da testosterona no sangue.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: dor e reação no local da injeção.

Pele e Anexos: hiperemia.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: medicamentos contendo estrógeno.

VERAPAMIL
Comprimido 80 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antiarrítmico e Anti-hipertensivo.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Programa Especialidades.

CID 10 – MEDICAMENTO: Não há.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipotensão, edema periférico, bradicardia e insuficiência cardíaca congestiva.

Sistema Digestório: constipação e náusea.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: tontura, cefaleia, fadiga, nervosismo e parestesias.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: ginecomastia.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: nenhum registro em literatura.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Digoxina, betabloqueadores, agentes anti-hipertensivos orais, agentes antiarrítmicos, Cimetidina, Carbamazepina, Lítio, Rifampicina, Teofilina, anestésicos inalatórios, bloqueadores neuromusculares, antibióticos e Álcool.

VIGABATRINA
Comprimido 500 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Anticonvulsivante.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada: 186 comprimidos.

CID 10 – MEDICAMENTO: G40.0; G40.1; G40.2; G40.3; G40.4;

G40.5; G40.6; G40.7; G40.8.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: nenhum registro em literatura.

Sistema Digestório: constipação, secura da boca, náuseas, vômitos e dor de estômago.

Sistema Endócrino: ganho de peso.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: diminuição das células vermelhas do sangue.

Sistema Linfático: nenhum registro em literatura.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: tontura, dor de cabeça, depressão, confusão, nervosismo, dificuldade de concentração, sonolência e cansaço.

Sistema Oftálmico: visão dupla.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: nenhum registro em literatura.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: reações alérgicas de pele.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: como a Vigabatrina não é metabolizada no fígado, não se liga a proteínas, além de não ser indutor do sistema enzimático do citocromo P450, interações com outras drogas são pouco prováveis.

ZIPRASIDONA
Cápsula 40 mg (VO)
Cápsula 80 mg (VO)

CLASSIFICAÇÃO: Antipsicótico.

RESTRIÇÃO: Medicamento do Componente Especializado – Port. GM/MS nº 1554/2013.

Medicamento Sujeito a Controle Especial – Lista C1 – Port. nº 344/1998.

Quantidade Máxima Dispensada:

Cápsula 40mg – 124 cápsulas.

Cápsula 80mg – 62 cápsulas.

CID 10 – MEDICAMENTO: F20.0; F20.1; F20.2; F20.3; F20.4; F20.5; F20.6; F20.8; F25.0; F25.1; F25.2.

UNIDADES DISPONÍVEIS: Maria Zélia, Várzea do Carmo, Campinas, Guarulhos e Vila Mariana.

REAÇÕES ADVERSAS

Sistema Auditivo: nenhum registro em literatura.

Sistema Cardiovascular: hipertensão e hipotensão postural e taquicardia.

Sistema Digestório: diarreia e náusea.

Sistema Endócrino: nenhum registro em literatura.

Sistema Hepático: nenhum registro em literatura.

Sistema Hematopoiético: nenhum registro em literatura.

Sistema Linfático: tromboembolismo venoso.

Sistema Muscular e Esquelético: nenhum registro em literatura.

Sistema Nervoso: sonolência, dor de cabeça, tontura, insônia,

distúrbio extrapiramidal, paralisia facial e fadiga.

Sistema Oftálmico: nenhum registro em literatura.

Sistema Renal: nenhum registro em literatura.

Sistema Reprodutor/Urinário: incontinência urinária e galactorreia.

Sistema Respiratório: nenhum registro em literatura.

Local de Aplicação: nenhum registro em literatura.

Pele e Anexos: reação alérgica.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: antiarrítmicos, Trióxido de arsênio, Halofantrina, Acetato de Levometadil, Mesoridazina, Pimozida, Sparfloxacina, Gatifloxacina, Moxifloxacina, Mesilato de Dolasetrona, Mefloquina, Sertindol ou Cisaprida, Lítio, Clorpromazina e Metoclopramida.

2.2 CLASSIFICAÇÃO TERAPÊUTICA

Colaboradores: Aline de Medeiros Pereira, Andreza Zambelli, Cinthia Cardoso Guimarães, Daniele Pinho Biagio, Geovana Balduino Bispo de Souza, Juliana Santos, Luciene Melo de Miranda, Susana Piacente Gonçalves, Thais Helena Chicaroni Javarez.

AGENTE DE DISSOLUÇÃO DA LITÍASE BILIAR
- Ácido Ursodesoxicólico

AGONISTAS BETA ADRENÉRGICO
- Fenoterol
- Formoterol
- Formoterol + Budesonida

ALFA- BLOQUEADORES
- Sildenafil

ANALÉPTICO
- Toxina Botulínica

ANALGÉSICOS
- Dipirona
- Paracetamol
- Policresuleno

ANALGÉSICOS OPIOIDES
- Codeína
- Metadona
- Morfina

ANÁLOGO DE SOMASTATINA
- Octreotida

ANÁLOGO DA VITAMINA D
- Alfacalcidol

ANDROGÊNICO
- Danazol

ANSIOLÍTICOS
- Clobazam
- Clonazepam
- Diazepam
- Nitrazepam

ANTAGONISTA DE CANAIS DE CÁLCIO
- Diltiazem

ANTAGONISTA H2
- Ranitidina

ANTAGONISTA OPIOIDE
- Naltrexona

ANTIÁCIDO
- Hidróxido de Alumínio

ANTIACNE
- Isotretinoína

ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO
- Iloprosta

ANTIAGROMEGÁLIO
- Lanreotida

ANTIALÉRGICO
- Prometazina

ANTIANGINOSOS
- Nifedipina
- Propatilnitrato

ANTIANDROGÊNICO
- Ciproterona

ANTIANÊMICOS
- Hidróxido de Ferro III
- Sulfato Ferroso

ANTIASMÁTICO
- Salbutamol
- Salmeterol

ANTIBACTERIANOS
- Amicacina
- Amoxacilina
- Amoxacilina + Clavulanato de Potássio
- Azitromicina
- Benzilpenicilina Benzatina
- Cefalexina
- Ciprofloxacino
- Cloranfenicol
- Colimicina
- Espiramicina
- Gentamicina
- Isoniazida
- Isoniazida + Rifampicina
- Linezolida
- Sulfadiazina
- Sulfametoxazol + Trimetoprima
- Tobramicina

ANTICOLINÉRGICOS
- Escopolamina
- Triexifenidil
- Triptorrelina

ANTICOLINESTERÁSICOS
- Donepezil
- Galantamina
- Piridostigmina
- Rivastigmina

ANTICONVULSIVANTES E ANTIEPILÉTICOS
- Ácido Valproico
- Carbamazepina
- Etossuximida
- Fenitoína
- Fenobarbital
- Gabapentina
- Lamotrigina
- Primidona
- Topiramato
- Vigabatrina

ANTIDEPRESSIVO
- Amitriptilina
- Clomipramina
- Fluoxetina
- Imipramina
- Nortriptilina
- Sertralina

ANTÍDOTO
- Calcitonina

ANTIEMÉTICOS
- Bromoprida
- Cinarizina
- Metoclopramida

ANTIFISÉTICO INTESTINAL
- Dimeticona

ANTIFÚNGICO
- Cetoconazol
- Nistatina

ANTI- HELMÍNTICOS
- Mebendazol
- Metronidazol
- Praziquantel

ANTI-HIPERTENSIVOS
- Captopril
- Metildopa
- Propanolol

ANTI-HISTAMÍNICOS
- Cimetidina
- Loratadina

ANTIINFLAMATÓRIOS
- Diclofenaco Sódico
- Mesalazina

- Sulfassalazina
- Talidomida

ANTIMALÁRICOS
- Pirimetamina
- Hidroxicloroquina
- Cloroquina

ANTINEOPLÁSICOS
- Ciclofosfamida
- Gosserrelina
- Hidroxiureia
- Metotrexato
- Pamidronato

ANTIOSTEOPORÓTICO
- Risedronato Sódico

ANTIPARKINSONIANOS
- Amantadina
- Biperideno
- Bromocriptina
- Cabergolina
- Entacapone
- Pramipexol
- Selegilina
- Tolcapone

ANTIPSORIÁTICO
- Acitretina

ANTIPLAQUETÁRIO
- Clopidrogel

ANTIPIRÉTICO
- Dipirona

ANTIPSICÓTICOS
- Aripiprazol
- Carbonato de Lítio
- Clorpromazina
- Clozapina
- Haloperidol
- Levomepromazina
- Olanzapina
- Quetiapina
- Risperidona
- Tioridazina
- Ziprasidona

ANTIRREUMÁTICO
- Abatacepte
- Adalimumabe
- Certolizumabe Pegol
- Etanercepte
- Golimumabe
- Infliximabe
- Leflunomida
- Palivizumabe
- Penicilamina
- Tocilizumabe

ANTIVIRAL
- Adefovir
- Alfainterferona
- Alfapeginterferona
- Betainterferona
- Entecavir
- Lamivudina
- Ribavirina
- Telaprevir
- Tenofovir

BRONCODILATADORES
- Teofilina
- Tiotrópio

CORTICOSTEROIDES
- Beclometasona
- Betametasona
- Budesonida
- Clobetasol
- Dexametasona
- Fludrocortisona
- Fluticasona
- Metilprednisolona

DIURÉTICOS
- Furosemida
- Hidroclorotiazida

ENZIMAS
- Alfadornase
- Alfavelaglicerase
- Enzimas Pancreáticas

FATOR DE CRESCIMENTO
- Alfapoetina Humana
- Filgrastim

HEMODERIVADOS
- Imunoglobulina
- Imunoglobulina anti- hepatite B
- Imunoglobulina contra antígeno D

HIPOGLICEMIANTES
- Desmopressina
- Glibenclamida

HIPOLIPEMIANTES
- Ácido Nicotínico
- Atorvastatina
- Bezafibrato
- Ciprofibrato
- Etofibrato
- Fenofibrato
- Fluvastatina
- Genfibrozila
- Lovastatina
- Pravastatina

HORMÔNIO
- Estrogênios Conjugados

HORMÔNIO LUTEINIZANTE
- Leuprorrelina

INIBIDOR DE PROTEASE
- Boceprevir

IMUNOMODULADORES E SUPRESSORES
- Azatioprina
- Ciclosporina
- Everolimo
- Glatirâmer
- Micofenolato de Sódio
- Micofenolato Mofetila
- Molgramostim
- Natalizumabe
- Sirolimo
- Somatropina
- Tacrolimo

MUCOLÍTICO
- Ambroxol

NUTRIÇÃO
- Complemento Alimentar para paciente Fenilcetonúrico maior de 1 ano
- Complemento Alimentar para paciente Fenilcetonúrico maior de 8 anos
- Complemento Alimentar para paciente Fenilcetonúrico menor de 1 ano
- Dieta em pó Sacarose
- Dieta em pó padrão para crianças de 1 a 6 anos normo cal e prote ica
- Dieta Líquida para crianças de 1 a 6 anos normo cal e proteica
- Fórmula com Aminoácidos Livres
- Fórmula de Hidrolisado Proteico
- Fórmula de Proteína Isolada de Soja
- Polivitamínico
- Sais de Reidratação Oral

OFTALMOLOGIA – ANTIGLAUCOMATOSOS
- Acetazolamida
- Bimatoprosta

- Brimonidina
- Brinzolamida
- Dorzolamida
- Latanoprosta + Cloreto de Benzalcônio
- Pilocarpina
- Timolol
- Travaprosta

QUELANTES
- Deferasirox
- Deferiprona
- Desferoxamina
- Sevelâmer

REGULADOR DO CANAL DE CÁLCIO
- Raloxifeno

REGULADOR MOTOR
- Riluzol

REPOSITOR ENZIMÁTICO
- Imiglucerase
- Miglustate
- Taliglucerase

TUBERCULOSTÁTICO
- Estreptomicina
- Etambutol
- Etionamida
- Pirazinamida
- Rifampicina
- Pirazinamida+Etambutol

VASODILATADORES
- Bosentana
- Isossorbida
- Nifedipina

VASOCONSTRITORES
- Ambrisentana

VITAMINAS
- Ácido Folínico
- Calcipotriol
- Calcitriol
- Polivitamínico
- Tiamina

2.3 PRINCIPAIS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Colaboradores: Aline de Medeiros Pereira, Andreza Zambelli, Cinthia Cardoso Guimarães, Daniele Pinho Biagio, Geovana Balduino Bispo de Souza, Juliana Santos, Luciene Melo de Miranda, Susana Piacente Gonçalves, Thais Helena Chicaroni Javarez.

A			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Abatacepte	Infliximabe	NEL	NP
	Vacinas (inativadas)		
Acetazolamida	Ciclosporina	NEL	Suco de Frutas
	Hipoglicemiantes		
	Salicilatos		
Ácido Folínico	Fluoropirimidinas	NEL	NEL
Ácido Nicotínico	Sequestradores de ácidos biliares	À noite	Evitar o uso de álcool
Ácido Ursodesoxicólico	Antiácidos contendo alumínio e clofibrato	NEL	NP
	Contraceptivos Orais		
	Colestiramina		
Ácido Valproico	Ácido acetilsalicílico	Com as principais refeições	Evitar o uso de álcool
	Antibióticos		
	Antidepressivos tricíclicos		
	Carbamazepina		
	Clonazepam		
	Clorpromazina		
	Clozapina		
	Diazepam		
	Fenitoína		
	Fenobarbital		
	Lamotrigina		
	Oxcarbamazepina		
	Risperidona		
	Topiramato		
	Zidovudina		

Acitretina	Metotrexato	Com as principais refeições	Evitar o uso de álcool
	Tetraciclina		
	Vitamina A		
Adalimumabe	Vacinas Vivas	NEL	NP
Adefovir	Entecavir	NEL	NP
Adek's	Não há interações clinicamente significativas com outros fármacos	NEL	NEL
Alfacalcidol	Antiácidos de magnésio ou laxantes	Manhã e noite	NEL
	Colestipol		
	Colestiramia		
	Diuréticos tiazídicos		
	Óleo mineral		
	Vitamina D		
Alfadornase	Não foram realizados estudos formais de interação medicamentosa	NEL	NP
Alfapoetina Humana	Não foram encontradas evidências de interações com o uso de Alfaepoetina	NEL	NP
Alfainterferona	Deferiprona	Alfainterferona 2B deve ser administrada entre o fim da tarde e o começo dà noite, se possível	NEL
Alfapeginterferona	Substratos da CYP 1A2	Sempre no mesmo dia e horário	NEL
Alfavelaglicerase	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.	NEL	NP
Amantadina	Sulfametoxazol + Trimetropima	NEL	Evitar o uso de álcool

Ambroxol	Cefuroxima	Após as refeições	NEL
	Eritromicina		
Amicacina	Anfotericina	NEL	NEL
	Bloqueadores Neuromusculares		
Ambrisentana	Ciclosporina	NEL	NEL
Amitriptilina	Ácido Valproico	NEL	Suco de toranja (grapefruit) e evitar o uso de álcool
	Clorpromazina		
	Medicamentos para aliviar a dor		
	Sedativos		
Amoxicilina	Alopurinol	Com as principais refeições	NP
	Anticoagulantes		
	Anticoncepcionais		
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio	Alopurinol	Com as principais refeições	NEL
	Anticoagulantes		
Aripiprazol	Anti-hipertensivos	NEL	Evitar a administração com refeição rica em gorduras
Atorvastatina	Cetoconazol	Com as principais refeições	Suco de toranja (grapefruit)
	Colchicina		
	Colestipol		
	Itraconazol		
Azatioprina	Alopurinol	Após as refeições	Evitar suplementos nutricionais
	Mesalazina		
	Varfarina		
Azitromicina	Bromocriptina	Com as principais refeições, exceto suspensão oral de liberação prolongada, que deve ser administrada com o estômago vazio	NP
	Ciclosporina		
	Digoxina		
	Tacrolimo		
	Varfarina		

B			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Beclometasona	Beta bloqueadores	NEL	NP
Benzilpenicilina	Ácido Valproico	30 a 60 minutos antes das refeições ou de 2 a 3h depois	Evitar a ingestão de alimentos ácidos
	Contraceptivos orais		
	Varfarina		
Betainterferona	Natalizumabe	NEL	NP
Betametasona	Anticoncepcionais orais	NEL	NP
	Efedrina		
Bezafibrato	Anticoagulantes cumarinicos	Deve ser administrado pela manhã ou à noite, com ou após as refeições	NP
	Glibenclamida		
	Insulinas		
	Sulfonilureias		
Bimatoprosta	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	De preferência à noite	NP
Biperideno	Antiácidos	Deve ser administrado com líquidos, de preferência durante ou após a refeição	Evitar o uso de álcool
	Antidiarreicos		
	Depressores do SNC		
	Levodopa + Carbidopa		
	Quinidina		
Boceprevir	Amiodarona	Deve ser administrado com alimentos	NEL
	Midazolam		
	Quinidina		
	Sinvastatina		
	Triazolam		

Bosentana	Anticoncepcionais Ciclosporina Itraconazol Rifampicina Ritonavir Sildenafil Sirolimo Tacrolimo	Pode ser administrada com ou sem alimentos, uma vez pela manhã e outra à noite	Evitar suco e a fruta toranja (grapefruit)
Brimonidina	Antidepressivos Beta-bloqueadores Depressores do SNC	NEL	NP
Brinzolamida	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.	NEL	NP
Bromocriptina	Antibióticos macrolídeos Antifúngicos Octreotida	Pode ser administrado com alimentos	Evitar o uso de álcool
Bromoprida	Bromperidol Derivados atropínicos	NEL	NEL
Budesonida	Cetoconazol	NEL	Suco de toranja (grapefruit)
C			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Cabergolina	Fenotiazina Prometazina	Com as principais refeições	NP
Calcipotriol	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.	NEL	NEL
Calcitonina	Fórmulas contendo cálcio Vitamina D	NEL	Dieta pobre em cálcio para pacientes com Doença de Paget

Calcitriol	Diuréticos	Com as principais refeições	Seguir orientações médicas
Captopril	Carbonato de Lítio	Deve ser tomado pelo menos 1 hora antes ou 2 horas após a refeição	Alimentos em geral
	Clorpromazina		
	Diuréticos		
Carbamazepina	Ácido valproico	Com as principais refeições ou com bastante líquido	Suco de toranja (grapefruit)
	Anticoncepcional hormonal		
	Cetoconazol		
	Ciclosporina		
	Cimetidina		
	Danazol		
	Diltiazem		
	Doxiciclina		
	Etossuximida		
	Fenitoína		
	Fenobarbital		
	Haloperidol		
	Isoniazida		
	Lamotrigina		
	Mebendazol		
	Metadona		
	Teofilina		
	Topiramato		
	Varfarina		
	Verapamil		
Carbonato de Lítio	Aminofilina	Seguir orientações médicas	Evitar café, chá ou outras bebidas com cafeína
	Anti-inflamatório não-esteroides		
	Bicarbonato de sódio		
	Diuréticos tiazídicos		
	Inibidores de ECA		

Cefalexina	Diuréticos de alça	Com ou sem alimentos	Alimentos em geral
	Probenicida		
Certolizumabe Pegol	Analgésicos	NEL	NEL
	Anti-inflamatórios não-esteroides (AINE)		
	Corticosteroides		
Cetoconazol	Atorvastatina	Administrar com alimentos para diminuir efeitos gastrointestinais indesejados	Os níveis séricos máximos do cetoconazol podem ser prolongados quando tomados com alimentos
	Budesonida		
	Carbamazepina		
	Ciclosporina		
	Ciproterona		
	Diazepam		
	Digoxina		
	Fenitoína		
	Metilprednisolona		
	Rifampicina, rifabutina e isoniazida		
	Sildenafil		
	Sirolimo		
	Tacrolimo		
Ciclofosfamida	Agentes antidiabéticos	Devem ser adminstrados durante ou após as refeições	Se ocorrer desconforto gástrico, as doses devem ser ingeridas com alimentos
	Alopurinol		
	Anticoagulantes		
	Barbiturato		

Ciclosporina	Amiodarona	Sempre no mesmo horário e com as refeições	Suco de toranja (grapefruit)
	Antibióticos macrolídeos		
	Anticoncepcionais orais		
	Barbitúricos		
	Bosentana		
	Carbamazepina		
	Cetoconazol		
	Fluconazol		
	Itraconazol		
	Voriconazol		
	Colchicina		
	Danazol		
	Diclofenaco		
	Digoxina		
	Diltiazem		
	Fenitoína		
	Fenobarbital		
	Imatinibe		
	Lovastatina		
	Metilprednisolona		
	Metoclopramida		
	Metotrexato		
	Octreotida		
	Oxcarbazepina		
	Ranitidina		
	Rifampicina		
	Tacrolimo		
	Verapamil		

Cimetidina	Anticoagulantes	Com as refeições	Cafeína
	Carbamazepina		
	Cloroquina		
	Fenitoína		
	Metoprolol		
	Nifedipina		
	Propranolol		
	Teofilina		
Cinarizina	Antidepressivos tricíclicos	Após as refeições	NP
	Depressores do SNC		
Ciprofibrato	Varfarina	Após as refeições	NEL
Ciprofloxacino	Antiácidos	Tomá-lo sem levar as refeições em consideração (o fabricante prefere que o comprimido de liberação imediata seja tomado 2 horas após as refeições)	NEL
	Fenitoína		
	Glibenclamida		
	Sevelâmer		
	Teoflina		
	Varfarina		
Ciproterona	Cetoconazol	Tomar com as refeições	NEL
	Itraconazol		
	Ritonavir		

Clobazam	Analgésicos	Pode ser administrado com ou sem alimento	Suco de toranja (grapefruit)
	Antidepressivos cíclicos		
	Antifúngicos		
	Anti-histamínicos		
	Claritromicina		
	Doxiciclina		
	Eritromicina		
	Fluconazol		
	Imatinibe		
	Omeprazol		
	Propofol		
	Quinidina		
Clobetasol	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	NEL	NEL
Clomipramina	Antiarrítmicos	Com as refeições	Suco de toranja (grapefruit)
	Antidepressivos tricíclicos		
	Codeína		
	Diuréticos		
	Metilfenidato		
	Rifampicina		
Clonazepam	Ácido valproico	NEL	NEL
	Clozapina		
	Ranitidina		

Clopidogrel	AAS (ácido acetilsalicílico)	NEL	NP
	Enoxaparina		
	Heparina		
	Ibuprofeno		
	Meloxicam		
	Omeprazol		
	Pantoprazol		
	Piroxicam		
	Ranitidina		
	Varfarina		
Cloranfenicol	Anticoagulantes orais	NEL	Vitamina B12
	Clorpropamida		
	Deferiprona		
	Fenitoína		
	Fenobarbital		
	Rifampicina		
Cloreto de Sódio	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	NEL	NP
Cloroquina	Amiodarona	Com as refeições	NEL
	Ampicilina		
	Carbonato de cálcio		
	Cimetidina		
	Clorpromazina		
	Colestiramina		
	Levotiroxina		
	Praziquantel		
	Ranitidina		
	Sais de alumínio		
	Valproato de sódio		

Clorpromazina	Ácido Valproico	Podem ser administrados com ou sem alimentos	NEL
	Amiodarona		
	Amitriptilina		
	Anlodipino		
	Atenolol		
	Atropina		
	Captopril		
	Claritromicina		
	Cloroquina		
	Enalapril		
	Fluconazol		
	Fluoxetina		
	Glicazida		
	Haloperidol		
	Hidróxidos de magnésio, Hidróxidos de alumínio e Hidróxido de cálcio		
	Levodopa		
	Levofloxacino		
	Metformina		
	Metoprolol		
	Propranolol		
	Quetiapina		
	Risperidona		
	Tamoxifeno		
	Timolol		
	Tioridazina		
	Tramadol		
	Ziprasidona		

Clozapina	Acido Valproico	Podem ser administrados com ou sem alimentos	Evitar o uso de álcool
	Alprazolam		
	Bromazepam		
	Cafeína		
	Clonazepam		
	Eritromicina		
	Fenitoína		
	Fluoxetina		
	Loratadina		
	Metoclopramida		
	Midazolam		
	Omeprazol		
	Paroxetina		
	Tioridazina		
	Triexifenidil		
Codeína	Atropina	Seguir orientações médicas	NP
	Butilbrometo de esco-polamina		
	Clomipramina		
	Dexclorfeniramina		
	Fentanila		
	Fluoxetina		
	Imipramina		
	Ipatropio		
	Metadona		
	Morfina		
	Oxicodona		
	Paroxetina		
	Triexifenidil		
Colimicina	Ácido Valproico	NEL	NEL
	Antibióticos		
Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	NEL	NEL

D			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Danazol	Anticoagulante oral	Após as refeições	Refeições ricas em gorduras aumentam as concentrações plasmáticas
	Carbamazepina		
	Ciclosporina		
	Sirolimo		
	Tacrolimo		
Deferasirox	Antiácido contendo alumínio	Deve ser tomado 30 minutos antes das refeições	Alimentos em geral
	Quelante de ferro		
Deferiprona	Cloranfenicol	Com as refeições	NP
	Interferon		
Desferoxamina	Vitamina C	NEL	Suplementos com vitamina C
Desmopressina	Epinefrina	NEL	Restringir líquidos em geral
	Polietilenoglicol		
Dexametasona	Ácido acetilsalicílico	Com as refeições	Cálcio e cafeína
	Anti-inflamatórios não-esteroides (AINE)		
	Diuréticos espoliadores de potássio		
	Fenitoína		
Diazepam	Ácido valproico	NEL	Suco de toranja (grapefruit) e alimentos em geral
	Anticoagulantes orais		
	Anticoncepcionais orais		
	Cetoconazol		
	Claritromicina		
	Fenobarbital		
	Fentanila ou sufentanila		
	Fluoxetina		
	Isoniazida		
	Rifampicina		
	Sertralina		

Diclofenaco Sódico	Anticoagulantes e agentes antiplaquetários	Com as refeições	NP
	Antidiabéticos (exceto insulina)		
	Carbonato de Lítio		
	Ciclosporina		
	Diuréticos e agentes anti-hipertensivos		
	Lítio		
Dieta em Pó	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.	NEL	NEL
Digoxina	Azitromicina	Após as refeições	NP
	Cetoconazol		
	Ciclosporina		
	Claritromicina		
	Diltiazem		
	Hidróxido de Alumínio		
	Itraconazol		
	Sulfassalazina		
	Verapamil		
Diltiazem	Betabloqueadores	À noite	NP
	Carbamazepina		
	Ciclosporina		
	Digoxina		
	Tacrolimo		
Dimeticona	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	NEL	NP

Dipirona	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	NEL	NP
Donepezil	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	À noite	NP
Dorzolamida	Anfetamina	NEL	NEL
	Quinidina		
E			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Entacapone	Adrenalina	NEL	NP
	Alfa-metildopa		
	Dobutamina		
	Dopamina		
	Isoprenalina		
	Noradrenalina		
Entecavir	Adefovir	Pelo menos 2 horas antes das refeições	Seguir orientação médica quanto à dieta
Enzimas Pancreáticas	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas.	Com as refeições	NP
Escopolamina	Atropina	NEL	NP
	Dexclorfeniramina		
	Fentanila		
	Hidroxizina		
	Ipatrópio		
	Quinidina		
Espiramicina	Levodopa	NEL	NP

Estreptomicina	Agentes usados em quimioterapia	NEL	NEL
	Neomicina		
	Neostigmina		
Estrógenos Conjugados	Claritromicina	NEL	NEL
	Itraconazol		
	Levotiroxina		
Etambutol	Sais de Alumínio	NEL	NEL
Etanercepte	Bloqueadores do fator de Necrose Tumoral	Seguir orientações médicas	NP
Etionamida	Anticonvulsivantes	NEL	NP
	Psicotrópicos		
Etofibrato	Pode aumentar o efeito anticoagulante dos medicamentos	NEL	NEL
Etossuximida	Antidepressivos triciclicos	NEL	NP
	Carbamazepina		
	Fenotiazinicos		
	Inibidores da MAO		
	Loxapina		
Everolimo	Vacinas de virus vivos	Seguir orientações médicas	Refeições ricas em lipídeos

F			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Fenitoína	Amiodarona	Com as refeições	NP
	Ácido valproico		
	Antiácido contendo alumínio, magnésio ou carbonato de cálcio		
	Anticoagulante (cumarínico e derivado da indandiona)		
	Anticoncepcional oral, injetável ou implante subdérmico, contendo progestogênio.		
	Carbamazepina		
	Cetoconazol		
	Ciclosporina		
	Cimetidina		
	Ciprofloxacino		
	Cloranfenicol		
	Clozapina		
	Dexametasona		
	Fenobarbital		
	Fluconazol		
	Isoniazida		
	Itraconazol		
	Metadona		
	Miconazol		
	Quetiapina		
	Rifampicina		
	Sulfonamida		

Fenobarbital	Ácido valproico	NEL	NEL
	Aminofilina		
	Amiodarona		
	Analgésicos opioides		
	Antidepressivos e benzodiazepínicos		
	Bloqueadores do canal de cálcio		
	Carbamazepina		
	Ciclosporina		
	Citalopram		
	Claritromicina		
	Cloranfenicol		
	Contraceptivos orais		
	Diazepam		
	Efavirenz		
	Fenitoína		
	Fluconazol		
	Fluoxetina		
	Inibidores da MAO		
	Losartana		
	Metadona		
	Omeprazol		
	Petidina		
	Primidona		
	Propranolol		
	Selegilina		
	Tacrolimo		
	Teofilina		
	Varfarina		
Fenofibrato	Fenindiona	Seguir orientações médicas	NP
	Varfarina		

Fenoterol	Agentes simpaticomiméticos (ex. Anfetamina, dopamina, dobutamina)	Seguir orientações médicas	NP
	Antidepressivos tricíclicos		
	Beta bloqueadores adrenérgicos		
	Diuréticos		
	Inibidores da MAO		
	Ipratrópio inalatório		
Filgrastim	5-fluorouracil	NEL	NP
	Lítio		
	Quimioterapia		
Fingolimode	Atenolol	NEL	NEL
	Terapias Antineoplásicas e Imunossupressoras		
Fludrocortisona	Anfotericina B	Seguir orientações médicas	NP
	Diuréticos		

Fluoxetina	Ácido acetilsalicílico	Seguir orientações médicas	NP
	Aminofilina		
	Anfetaminas		
	Antidepressivos tricíclicos		
	Anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs)		
	Citalopram		
	Clorpromazina		
	Clozapina		
	Codeína		
	Diazepam		
	Diuréticos de alça		
	Fenobarbital		
	Fluconazol		
	Genfibrozila		
	Inibidores não seletivos da MAO		
	Lidocaína		
	Lítio		
	Miconazol		
	Nefazodona		
	Olanzapina		
	Paroxetina		
	Pergolida		
	Quinidina		
	Risperidona		
	Ritonavir		
	Selegilina		
	Varfarina		
Fluticasona + Salmeterol	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	Seguir orientações médicas	NP

Fluvastatina	Anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs)	Seguir orientações médicas	NP
	Colestiramina		
	Fluconazol		
	Omeprazol		
	Sulfonamida		
Formoterol	Antidepressivos tricíclicos	Seguir orientações médicas	NP
Formoterol + Budesonida	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	Seguir orientações médicas	NP
Fórmula com Aminoácidos Livres	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	Seguir orientações médicas	NP
Fórmula de Hidrolisado Protéico	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	Seguir orientações médicas	NP
Fórmula de Proteína Isolada de Soja	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	Seguir orientações médicas	NP
Furosemida	Antibióticos	Com estômago vazio	NP
	Anti-hipertensivos diuréticos		
	Anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs)		
	Hidrato de Cloral		
	Medicamentos que inibem a enzima conversora da angiotensina (ECA)		
	Sais de lítio		

G			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Gabapentina	Hidróxido de Magnesio	Seguir orientações médicas	NP
Galantamina	Paroxetina	Pela manhã	NP
	Quinidina		
Genfibrozila	Anticoagulantes	Antes do jantar	Alimentos em geral
	Fluoxetina		
Gentamicina	Cefalosporinas	NEL	NEL
	Diurético de alça		
	Furosemida		
	Penicilinas		
Glatirâmer	Natalizumabe	NEL	NEL
Glibenclamida	Atenolol	Em jejum e antes do jantar	NEL
	Benzofibrato		
	Ciprofloxacino		
	Enalapril		
	Fenotiazínicos		
	Glucagon		
	Miconazol		
	Tetraciclina		
Golimumabe	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	NEL	NEL
Gosserrelina	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	NEL	NEL

H			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Haloperidol	Itraconazol	NEL	NEL
	Adrenalina		
	Alprazolam		
	Carbamazepina		
	Clorpromazina		
	Levodopa		
	Lítio		
	Paroxetina		
	Quinidina		
	Tioridazina		
	Venlafaxina		
Hidroclorotiazida	Anti-hipertensivos	De preferência pela manhã	NEL
	Diclofenaco		
	Lítio		
	Metformina		
Hidroxicloroquina	Antiácidos	NEL	NEL
Hidróxido de Alumínio	Ácido Acetilsalicílico	De preferência uma hora após as refeições e ao deitar	NEL
	Antibióticos contendo tetraciclina		
	Atenolol		
	Benzodiazepínicos		
	Ciprofloxacino		
	Clorpromazina		
	Digoxina		
	Fenotiazinas		
	Levodopa		
	Lítio		
	Propranolol		
	Quinolonas		
Hidróxido de Ferro	Enalapril	Durante ou imediatamente após as refeições	NEL
Hidroxiureia	Radioterapia	NEL	NEL

I			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Iloprosta	Corticosteroides	NEL	NEL
Imiglucerase	Não foram conduzidos estudos para avaliar o potencial de interações medicamentosas deste medicamento	NEL	NEL
Imipramina	Ácido Valproico	NEL	NEL
	Antiarrítmicos		
	Anticolinérgicos		
	Antifúngicos orais		
	Antipsicóticos		
	Bloqueadores do canal de cálcio		
	Codeína		
	Depressores do Sistema Nervoso Central		
	Estrógenos		
	Inibidores da enzima monoamina oxidase (MAO)		
	Inibidores seletivos da recaptação de serotonina		
	Metilfenidato		
	Serotonérgicos		
Imunoglobulina Anti-Hepatite B	Vacinas contra rubéola, varicela, sarampo e caxumba	NEL	NEL
Imunoglobulina Humana	Vacinas constituídas por vírus vivos atenuados	NEL	NEL
Imunoglobulina Humana Contra Antígeno D	Vacinas contra rubéola, varicela, sarampo e caxumba	NEL	NEL
Infliximabe	Abatacepte	NEL	NEL

Isoniazida	Antiácido	Pela manhã, em jejum, ou 2 horas após as refeições	Alimentos em geral
	Anticoagulante oral		
	Benzodiazepínico		
	Carbamazepina		
	Diazepam		
	Fenitoína		
	Laxante contendo alumínio		
	Teofilina		
Isoniazida + Rifampicina	Antiácidos	Pela manhã, em jejum, ou 2 horas após as refeições	NEL
	Antidiabéticos		
	Haloperidol		
	Levotiroxina		
	Metadona		
	Quinidina		
	Varfarina		
	Verapamil		
Isossorbida	Antidepressivos tricíclicos	NEL	NEL
	Anti-hipertensivos		
	Ergotamina		
Isotretinoína	Tetraciclina	Administrar após as refeições	NEL
	Polivitamínico		
	Vitamina A		
L			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Lamivudina	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	NEL	NEL
Lamotrigina	Ácido valproico	NEL	NEL
	Carbamazepina		
	Contraceptivos orais		

Lanreotida	Os efeitos farmacológicos gastrintestinais da lanreotida podem reduzir a absorção intestinal de fármacos administrados concomitantemente	NEL	NEL
Latanoprosta + Cloreto de Benzalcônio	Antagonistas beta-adrenérgico (timolol)	NEL	NEL
	Agonistas adrenérgicos inibidores da anidrase carbônica (acetazolamida)		
Leflunomida	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	Administrar após as refeições	NEL
Leuprorrelina	Antagonistas da dopamina	NEL	NEL
	Espironolactona		
	Fenotiazínicos		
	Hormônios sexuais		
	Levodopa		
Levomepromazina	Hipotensores	NEL	NEL
	Anti-hipertensivos		
	Depressores do Sistema Nervoso Central		
	Imipramina		
	Levodopa		
	Quinidina		
	Tioridazina		

Lidocaína	A lidocaína deve ser usada com precaução em pacientes recebendo agentes estruturalmente relacionados aos anestésicos locais, uma vez que os efeitos tóxicos são aditivos	NEL	NEL
	Fluoxetina		
	Propanolol		
	Verapamil		
Linezolida	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	NEL	NEL
Loratadina	Eritromicina	NEL	NEL
	Fluconazol		
	Quinidina		
Lovastatina	Anticoagulantes Cumarínicos	Administar à noite com a refeição	NEL
	Ciclosporina		
	Claritromicina		
	Eritromicina		
M			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Mebendazol	Carbamazepina	NEL	Administrar junto com alimentos gordurosos (melhor absorção)
	Hipoglicemiantes orais		
	Insulina		
Mesalazina	Azatioprina	NEL	NEL
	Espironolactona		

Metadona	Amitriptilina	NEL	NEL
	Carbamazepina		
	Codeína		
	Fenitoína		
	Fenobarbital		
	Indutores da CYP3A4		
Metildopa	Lítio	NEL	NEL
	Outras drogas anti-hipertensivas		
	Sulfato ferroso ou gluconato ferroso		
Metilprednisolona	Ácido acetilsalicílico	NEL	NEL
	Agentes hipoglicemiantes orais e estrogênios		
	Anti-inflamatórios não hormonais		
	Cetoconazol		
	Ciclosporina		
	Diuréticos depletores de potássio		
	Tacrolimo		
Metoclopramida	Agentes anticolinérgicos	NEL	NEL
	Agentes antipsicóticos		
	Analgésicos opioides		
	Ciclosporina		

Metotrexato	Acitretina	Administrar em jejum	Alimentos em geral
	Anti-inflamatórios não esteroidais		
	Ciclosporina		
	Colestiramina		
	Corticosteroides		
	Penicilinas		
	Retinoides		
	Salicilatos		
	Sulfonamidas		
	Teofilina		
	Tetraciclinas		
	Vacinas com vírus vivos		
Metronidazol	Lítio	Ingerir após as refeições	NEL
	Varfarina		
Micofenolato Mofetila	Aciclovir	Ingerir antes das refeições	NEL
	Antiácidos		
	Contraceptivos orais		
	Vacinas de vírus vivos		
Micofenolato de Sódio	Aciclovir	Ingerir antes das refeições	NEL
	Antiácidos		
	Colestiramina		
	Contraceptivos orais		
	Salicilatos		
	Vacinas com organismos vivos		
Miglustate	Informe ao seu médico caso esteja usando ou recentemente fez uso de algum outro medicamento	Ingerir antes das refeições	NEL

Morfina	Amitriptilina	NEL	NEL
	Codeína		
	Depressores do Sistema Nervoso Central		
	Naltrexona		
	Zidovudina		
N			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Naltrexona	Analgésico opioide	NEL	NEL
	Tioridazina		
Naproxeno	Ácido acetilsalicílico	Deve ser ingerido com alimento à noite ou pela manhã	NEL
	Anticoagulante oral		
	Anti-inflamatório não-esteróide		
	Heparina		
	Varfarina		
Natalizumabe	Acetato de glatirâmer	NEL	NEL
	Betainterferona		
Nifedipina	Betabloqueadores	Administrar uma hora antes ou 2 horas após as refeições	Suco de toranja (grapefruit)
	Cimetidina		
	Quinidina		
Nistatina	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	NEL	NEL
Nitrazepam	Itraconazol		
Nortriptilina	Clonidina	NEL	NEL
	Epinefrina		
	Hormônio tireoideano		
	Nafazolina oftálmica		
	Norepinefrina		

O			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Octreotida	Bromocriptina	Administrar entre as refeições ou ao deitar	NEL
	Ciclosporina		
	Glucagon		
	Hipoglicemiante oral		
	Hormônio do crescimento		
	Insulina		
Olanzapina	Carvão Ativado	NEL	NEL
	Fluoxetina		
	Imipramina		
P			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Palivizumabe	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	NEL	NEL
Pamidronato	Cálcio	Pode ser administrada em qualquer horário	NEL
	Vitamina D		
Paracetamol	Barbituratos	Pode ser administrada em qualquer horário	NEL
	Rifampicina		
Penicilamina	Hidroxido de Ferro	Pelo menos 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições	NEL
	Hidroxido de Magnesio		
Pilocarpina	Alcaloides da Beladona	NEL	NEL
Pirazinamida	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	NEL	NEL

Piridostigmina	Aminoglicosídeos	Administrar o medicamento ao acordar ou durante as refeições	NEL
	Beta-bloqueadores		
	Quinidina		
	Quinolonas		
	Tetraciclinas		
Pirimetamina	Anfetaminas	Com as refeições	NEL
	Antidepressivos tricíclicos		
	Antipsicóticos		
	Beta-bloqueadores		
	Losartana		
	Oxicodona		
	Paroxetina		
	Ritonavir		
	Sulfonamidas		
	Tramadol		
	Trimetoprima		
	Varfarina		
	Venlafaxina		
	Zidovudina		
Policresuleno Cin-chocaina	Evitar o emprego de outros medicamentos no mesmo local.	Ao deitar.	NEL
Polivitamínico	Anticoncepcionais orais	Pode ser administrada em qualquer horário	NEL
	Colestiramina		
	Hipoglicemiantes orais		
	Isotretinoína		
	Varfarina		
Pramipexol	Antagonistas da dopamina (antipsicóticos e metoclopramida)	Pode ser administrado em qualquer horário	NEL
	Depressores do Sistema Nervoso Central		
	Prometazina		

Pravastatina	Colestiramina	De preferência, à noite	NEL
	Varfarina		
Praziquantel	Albendazol	Deve ser administrado durante as refeições.	NEL
	Cloroquina		
	Eritromicina		
	Itraconazol		
	Rifampicina		
Primidona	Anticoagulante oral	Ao deitar	Evitar ingestão de álcool
	Anticoncepcional oral contendo estrogênios		
	Antidepressivo tricíclico		
	Corticosteroide		
	Fenobarbital		
	Inibidor da monoamina-oxidase		
Prometazina	Anticolinérgicos	Pode ser administrada em qualquer horário	NEL
	Antidepressivos imipramínicos		
	Antidepressivos tricíclicos e tranquilizantes		
	Antiespasmódicos atropínicos		
	Antiparkinsonianos		
	Atropina		
	Neurolépticos fenotiazínicos		
Propatilnitrato	Antidepressivos tricíclicos	Pode ser administrado em qualquer horário	NEL
	Anti-hipertensivos		
	Bloqueadores beta-adrenérgicos (atenolol e metildopa)		
	Bloqueadores de canais de cálcio (anlodipino, sitagliptina, imatinibe, finasterida e enalapril)		

Propanolol	Fenobarbital	Administra-ção deve ser feita antes das refeições ou ao deitar	Evitar ingestão de álcool
	Cimetidina		
	Clorpromazina		
	Fenobarbital		
	Hidróxido de Alumínio e Magnésio		
	Ibuprofeno		
	Lidocaína		
	Piroxicam		
	Rifampicina		
	Teofilina		
	Verapamil		

Q			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Quetiapina	Clorpromazina	Pode ser administrado em qualquer horário	NEL
	Fenitoina		

R			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Raloxifeno	Ampicilina	Pode ser administrado em qualquer horário	NEL
	Colestiramina		
Ranitidina	Cefalosporinas	Administrar, de preferência, à noite	NEL
	Ciclosporina		
	Itraconazol		
	Varfarina		
Ribavirina	Zidovudina	Ingerir 2 horas antes ou 3 horas após as refeições	NEL

Rifampicina	Antiácidos	NEL	Chás ou álcool
	Bosentana		
	Cetoconazol		
	Ciclosporina		
	Cloranfenicol		
	Diazepam		
	Estrogênios combinados a progestogênios ou progestogênios		
	Fenitoína		
	Fluconazol		
	Itraconazol		
	Levotiroxina		
	Paracetamol		
	Praziquantel		
	Propranolol		
	Quinidina		
	Tacrolimo		
	Teofilina		
	Varfarina		
	Verapamil		
Riluzol	Não foram realizados até o momento estudos clínicos para avaliar as interações de riluzol com outros fármacos	NEL	Tabaco e alimentos grelhados
Risedronato Sódico	Medicamentos contendo cátions polivalentes	NEL	Evitar a ingestão de álcool
Risperidona	Ácido Valproico	Administrar no horário das refeições ou entre elas	NEL
	Clorpromazina		
	Fluoxetina		
Rituximabe	Atualmente não existem dados disponíveis sobre as interações medicamentosas	NEL	NEL

Rivastigmina	Anticolinérgicos	Deve ser administrado com as refeições da manhã ou noite	Evitar a ingestão de álcool
	Medicamentos com ação colinérgica		
	Relaxante muscular		
S			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Sais para Reidratação Oral	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	NEL	NEL
Salbutamol	Antidepressivo tricíclico	NEL	NEL
	Betabloqueador		
	Bloqueador alfaadrenergico		
	Diurético mercurial		
	Halotano		
	IMAO (inibidor da monoamino-oxidase)		
	Quinidina		
Salmeterol	Antidepressivo tricíclico	NEL	NEL
	Beta-agonista		
	Betabloqueador		
	Bloqueador alfa-adrenérgico		
	IMAO (inibidor de monoamina-oxidase)		
	Teofilina		
Selegilina	Antidepressivos triciclicos	NEL	Evitar queijo, vinho, licores, peixes e leveduras
	Fenobarbital		
	Fluoxetina		
	Levodopa		

Sertralina	Lítio	Pela manhã ou à noite, com ou sem alimentos, de preferência no mesmo horário todos os dias	Evitar ingestão de álcool
	Diazepam		
	Varfarina		
Sevelâmer	Ciprofloxacino	Com as refeições	NEL
Sildenafil	Bosentana	NEL	NEL
	Cetoconazol		
	Ritonavir		
Sirolimo	Antibióticos	NEL	Alimentos em geral e suco de grapefruit
	Anticonvulsivantes		
	Antifúngicos		
	Bloqueadores do canal de cálcio		
	Bosentana		
	Cetoconazol		
	Claritromicina		
	Danazol		
	Itraconazol		
	Tacrolimo		
Somatotrofina Humana	Corticosteroides	De preferência à noite em locais alternados	NEL
	Glicocorticoides		
	Hormônios adrenocorticoides		
	Insulina		
Sulfadiazina	Não existem dados concretos disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	NEL	NEL
Sulfametoxazol + Trimetoprima	Amantadina	Após as refeições com bastante líquido	NEL
	Ciclosporina		
	Diuréticos		
	Hipoglicemiantes orais		
	Varfarina		

Sulfassalazina	Ácido folico	Qualquer horário com bastante líquido	Alimentos em geral
	Digoxina		
Sulfato Ferroso	Ácido ascórbico	Com as refeições	NEL
	Antiácidos		
	Levotiroxina		
	Metildopa		
	Omeprazol		
T			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Tacrolimo	Azitromicina	NEL	Suco de toranja (grapefruit) e alimentos em geral
	Bosentana		
	Cetoconazol		
	Ciclosporina		
	Claritromicina		
	Danazol		
	Diltiazem		
	Eritromicina		
	Fenobarbital		
	Fluconazol		
	Itraconazol		
	Metilprednisolona		
	Omeprazol		
	Rifampicina		
	Sirolimo		

Talidomida	Ansiolíticos	Preferencial-mente ao deitar	Alimentos gordurosos
	Antidepressivos		
	Anti-histamínicos		
	Barbituratos		
	Etionamida		
	Inibidores das proteases como indinavir, nelfinavir, ritonavir ou saquinavir		
	Lítio		
	Relaxantes musculares		
Taliglucerase	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	NEL	NEL
Telaprevir	Amiodarona	Com as refeições	NEL
	Antiarrítmicos da Classe Ia ou III, com a exceção de lidocaína intravenosa		
	Cisaprida		
	Ergotamina		
	Midazolam		
	Sinvastatina		
Tenofovir	Aciclovir	NEL	Alimentos gordurosos.
	Ganciclovir		
	Valaciclovir		

Teofilina	Alopurinol	NEL	NEL
	Barbitúricos		
	Carbamazepina		
	Cimetidina		
	Ciprofloxacino		
	Claritromicina		
	Diuréticos		
	Eritromicina		
	Estrogênio		
	Fenobarbital		
	Halotano		
	Litio		
	Metotrexato		
	Propanolol		
	Rifampicina		
	Verapamil		
Tiamina	Não existe registro de interação da vitamina B1 (via oral) com outras drogas.	NEL	NEL
Timolol	Alfa-bloqueadores	NEL	NEL
	Anti-inflamatórios não-esteroidais		
	Barbituratos		
	Clorpromazina		
	Colestiramina		
	Ergotamina		
	Estimulantes alfa-adrenérgicos (epinefrina, fenilefrina)		
	Miconazol		
	Paroxetina		
	Penicilinas (ampicilina)		
	Pergolida		
	Quinidina		
	Sais de alumínio, sais de cálcio e salicilatos		

Tioridazina	Agentes depletores de potássio	NEL	Evitar ingestão de álcool
	Anfetaminas		
	Anticolinérgicos		
	Antidepressivos tricíclicos		
	Anti-hipertensivos		
	Antipsicóticos		
	Beta-bloqueadores		
	Clorpromazina		
	Fenotiazinas		
	Levodopa		
	Llidocaína		
	Miconazol		
	Paroxetina		
	Pergolida		
	Quinidina		
	Ritonavir		
	Sais de alumínio		
	Venlafaxina		
Tiotropio	Fármacos anticolinérgicos	Fazer inalações sempre no mesmo horário	NEL
Tobramicina	Anfotericina B	NEL	NEL
	Bloqueadores neuromusculares		
	Cefalosporinas		
	Diuréticos de alça		
	Penicilaminas		
Tocilizumabe	Benzodiazepínicos	NEL	NEL
	Bloqueadores dos canais de cálcio		
	Varfarina		

Tolcapone	Fármacos metabolizados pela COMT	NEL	Evitar ingestão de álcool, Centella asiática, erva de são joão, kava kava e valeriana.
	Benserazida		
	Tolbutamida		
	Varfarina		
Topiramato	Ácido Valproico	NEL	Evitar ingestão de álcool
	Anticoncepcionais orais		
	Carbamazepina		
	Depressores do Sistema Nervoso Central		
	Lítio		
	Metformina		
Toxina Botulinica	Antibióticos	NEL	NEL
Travaprosta	Não existem dados disponíveis, em literatura, sobre interações medicamentosas	NEL	NEL
Triexifenidil	Antidepressivos tricíclicos	Antes ou após as refeições	Evitar ingestão de álcool
	Barbitúricos		
	Clozapina		
	Codeína		
	Depressores do Sistema Nervoso Central		
	Inibidores da monoaminoxidase		
	Opiáceos		
Triptorrelina	Medicamentos contendo estrógeno	NEL	NEL

V			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Verapamil	Agentes antiarrítmicos	De preferência com a alimentos e deglutidas com um pouco de água, sem ser mastigada	Cafeína e álcool
	Agentes anti-hipertensivos orais		
	Anestésicos inalatórios		
	Antibióticos		
	Betabloqueadores		
	Bloqueadores neuromusculares		
	Carbamazepina		
	Ciclosporina		
	Digoxina		
	Lítio		
	Rifampicina		
	Teofilina		
Vigabatrina	Interações com outras drogas são pouco prováveis.	Antes ou após as refeições	NEL
Z			
MEDICAMENTO	INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	MELHOR HORÁRIO	INTERAÇÃO COM ALIMENTOS
Ziprasidona	Antiarrítmicos classe IA e III	NEL	Alimentos em geral
	Cisaprida		
	Clorpromazina		
	Lítio		
	Metoclopramida		

3

MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

3

MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

(PORT. Nº 344/98/MS)

Colaborador: Daniele Pinho Biagio

A Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), é a principal legislação nacional sobre o comércio de medicamentos sujeitos a controle especial. Nela, as substâncias estão distribuídas em listas que determinam a forma sobre como devem ser prescritas e dispensadas.

Essas listas são atualizadas por meio de Resoluções de Diretoria Colegiada (RDC), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e devem ser acessadas por todos os profissionais que trabalham com substâncias sujeitas a controle especial.

3.1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

Notificação de Receita, de acordo com o Artigo nº35 da Portaria SVS nº 344/98, é o documento padronizado que, acompanhado de receita, autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias constantes divididas por categorias.

3.1.1 ENTORPECENTES

Notificação de Receita – cor amarela – Listas A1, A2 e A3. Válida por 30 dias a contar da data de sua emissão em todo o território nacional.

As Notificações de receita "A" procedentes de outras Unidades Federativas devem ser obrigatoriamente apresentadas pelas farmácias e drogarias à autoridade sanitária local em até 72 horas, para averiguação e visto.

Poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas. Para as demais apresentações, poderá conter a quantidade correspondente de, no máximo, 30 (trinta) dias de tratamento.


NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF NÚMERO

A

Data ____ de _____ de _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESPECIALIDADE FARMACÊUTICA

Nome: _____

Quantidade e Apresentação

Forma Farm. Concent. /Unid. Posologia

Paciente _____

Endereço _____

Assinatura do Emitente

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

Identidade Nº: _____ Órgão Emissor: _____ Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Nome

___/___/___

Data

Dados da Gráfica: Nome - Endereço Completo - CGC

3.1.2 PSICOTRÓPICOS

Notificação de Receita – cor azul - Lista B1 e B2.

B1 - PSICOTRÓPICAS

De cor azul, impressa às expensas do profissional ou da instituição, conforme modelos anexos da portaria SVS nº 344 / 1998 ou RDC nº 58/2007.

Válida por 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão e somente dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração (art. 45).

A Notificação de Receita "B" poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas, e para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente, no máximo para 60 (sessenta) dias (art. 46).

B2 - PSICOTRÓPICAS ANOREXÍGENAS

De cor azul, impressa às expensas do profissional ou da instituição, conforme modelos anexos da portaria SVS nº 344 / 1998 ou RDC nº 58/2007.

Validade de 30 (trinta) dias contados a partir da sua emissão e somente dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração (art. 1º, § 2º da RDC nº 58/2007).

Cada Notificação de Receita "B2" deve ser utilizada para tratamento igual ou inferior a 30 (trinta) dias.

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA
UF NÚMERO
B2
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Medicamento ou Substância
Quantidade e Forma Farmacêutica
Dose por Unidade Posológica
Posologia
_____ de _____ de _____
Paciente: _____
Endereço: _____
Assinatura do Emitente
IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR
Nome: _____
Endereço: _____
Telefone: _____
Identidade Nº: _____ ÓrgãoEmissor: _____
CARIMBO DO FORNECEDOR
Nome do Vendedor
Data
Dados da Gráfica: Nome - Endereço Completo - CGC
Numeração desta impressão: de _____ a _____

3.1.3 OUTRAS SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL

C1 - OUTRAS SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL

Válida por 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua emissão e em todo o território nacional.

C1 e C5: limitada a 5 (cinco) ampolas e, para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente a no máximo 60 (sessenta) dias.

No caso de substâncias ou medicamentos antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, a quantidade ficará limitada a 6 (seis) meses de tratamento.

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Nome Completo: .....
CRM ..... UF ..... Nº .....
Endereço Completo e Telefone: .....
Cidade: ..... UF: .....

1ª VIA FARMÁCIA
2ª VIA PACIENTE

Paciente: _____

Endereço: _____

Prescrição: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
Nome:	
Ident.: ..... Órg. Emissor:	
End.:	
Cidade: ..... UF:	
Telefone:	_____ ASSINATURA DO FARMACÊUTICO DATA: ____/___/____

C2 - RETINOIDES DE USO TÓPICO – RECEITA COMUM (SEM RETENÇÃO).
RETINOIDES DE USO SISTÊMICO – NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL.

Válida por 30 (trinta) dias contados a partir de sua emissão e somente dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração.

Poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas e, para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente no máximo a 30 (trinta) dias.

É importante lembrar que as referidas notificações só podem ser dispensadas quando acompanhadas do Termo de Consentimento Pós Informação.


NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL
RETINÓIDES SISTÊMICOS
(Verificar Termo de Conhecimento)

UF NÚMERO

Data ____ de _____ de ____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITETENTE

Paciente _____

Idade _____ Sexo _____

Prescrição: Inicial ☐ Subsequente ☐

_____ Endereço _____
Assinatura

ESPECIALIDADE / SUBSTÂNCIA

Nome

☐ Isotretinoína

☐ Tretinoína

☐ Acitretina

GRAVIDEZ PROIBIDA
Risco de graves defeitos na face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto.

Posologia

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

Identidade Nº: _____ Órgão Emissor: _____ Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

_____
Nome

___/___/___
Data

Dados da Gráfica: Nome - Endereço Completo - CCG: Numeração desta impressão de _____ até _____

(2 Vias) 1ª Via Farmácia 2ª Via Médico

C3 - TALIDOMIDA

Notificação de receita de Talidomida.

Válida por 20 (vinte) dias contados a partir da data de sua emissão e somente dentro da Unidade Federativa onde foi emitida.

A quantidade de Talidomida por prescrição, em cada Notificação de Receita, não poderá ser superior à necessária para o tratamento de 30 (trinta) dias (art. 21, §3º da RDC nº 11 / 2011).

C4 - ANTIRRETROVIRAIS

Próprio do programa de DST/AIDS do Ministério da Saúde.

Não há modelo ou cor definida.

Não há prazo de validade determinado e nem proibição de uso em várias Unidades Federativas.

Não há quantidade determinada pela legislação.

4

DISPENSAÇÃO AMBULATORIAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO

4 DISPENSAÇÃO AMBULATORIAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO

Colaborador: Daniele Pinho Biagio

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), regulamentado por meio da Portaria GM/MS nº 2981, de 26 de novembro de 2009, é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Foi construído pela necessidade da ampliação do acesso aos medicamentos e do aumento da cobertura do tratamento medicamentoso para outras doenças importantes do ponto de vista clínico-epidemiológico.

Caracteriza-se pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicadas pelo Ministério da Saúde.

Documentos para solicitação de medicamento:

- Receita médica.
- Laudo para solicitação, avaliação e autorização de medicamentos do CEAF.
- Termo de Esclarecimento e Responsabilidade.
- Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de endereço e cartão do SUS).
- Cópia dos exames necessários.

4.1 FORMULÁRIOS UTILIZADOS

Disponíveis no Capítulo 8 – Anexos

Anexo 4 – Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos (LME).

Anexo 5 – Modelo de Termo de Esclarecimento e Responsabilidade.

4.2 CASOS ESPECÍFICOS

4.2.1 PALIVIZUMABE

• Laudo específico para Solicitação de Palivizumabe, devidamente preenchido por profissional responsável pelo paciente, com data, carimbo e assinatura.

• Cópia da certidão de nascimento do paciente, do comprovante

de residência com CEP e do cartão SUS.

• Para pacientes prematuros: cópia do relatório de alta hospitalar do berçário.

• Para pacientes prematuros, entre 1 e 2 anos de idade e com Doença Pulmonar da Prematuridade: relatório médico atualizado.

• Para pacientes cardiopatas: relatório médico atualizado, com a descrição da cardiopatia, o grau de hipertensão pulmonar e os medicamentos utilizados.

Anexo 6 – Formulário para solicitação de Palivizumabe.

4.2.2 LEITE

• Ficha de avaliação para fornecimento de Fórmulas Infantis Especiais preenchida pelo médico.

• Relatório médico completo com todos os critérios da Resolução SS nº 336, de 27 de novembro de 2007.

• Cópia dos exames (quando houver).

• Receita médica.

• Cópia da certidão de nascimento do paciente, comprovante de endereço, CPF e RG dos pais e cartão do SUS.

Anexo 7 – Formulário para solicitação de Leite.

4.2.3 ARIPIPRAZOL

• Fornecimento do medicamento descontinuado - Resolução SS nº121 de 27 de novembro de 2015.

• Formulário para solicitação de Aripiprazol.

• Receita médica.

• Cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e cartão do SUS.

• Relatório médico detalhado descrevendo o quadro clínico e a falha terapêutica ou reação adversa limitante.

Anexo 8 – Formulário para solicitação de Aripiprazol.

4.2.4 IMUNOGLOBULINA ANTI-RH

• Receita médica.

• LME simples.

• Exames: ureia, creatinina, tipagem sanguínea com fator Rh, resultado de Coombs indireto negativo, relatório médico informando tempo da gestação, BHCG e exame de ultrassom que comprove gravidez.

• Cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e cartão do SUS.

5

POLO DE TRIAGEM

PROTOCOLO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

5

POLO DE TRIAGEM PROTOCOLO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Colaborador: Karoline Pereira

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) – CODES implementou no AME Maria Zélia – SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) – a unidade de Protocolo de Processos Administrativos em 10 de agosto de 2009.

A solicitação de medicamento ou nutrição enteral para SES/SP consiste no requerimento de medicamento ou nutrição enteral e quando não disponibilizado pelo SUS, em caráter de excepcionalidade, esgotadas todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas, sendo importante apresentar na literatura científica forte nível de evidência para sua utilização.

Em 11 de maio de 2012, foi publicada a Resolução SS nº 54/2012, que aprova a estrutura e funcionamento da Comissão de Farmacologia da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP) e define normas e procedimentos para a solicitação de medicamento ou nutrição enteral.

Nesta Resolução, foi definido que, a partir de 11 de julho de 2012, é de responsabilidade da Instituição de Saúde Pública ou Privada (onde o paciente é acompanhado) encaminhar à Comissão de Farmacologia da SES/SP via correio a documentação necessária para solicitação de medicamento ou nutrição enteral que não faz parte do elenco estadual de medicamento.



Deste modo, desde essa data, o AME Maria Zélia e os Departamentos Regionais de Saúde (DRS) não mais receberam novas solicitações de medicamento ou nutrição enteral.

Em 1º de novembro de 2012, foi publicada a Resolução SS nº106, que altera o item - 57, da Resolução SS nº54, de 11 de maio de 2012, e dá outras providências:

Item - 57 – Os documentos referentes ao processo de solicitação de medicamentos ou nutrição enteral por paciente deverão ser encaminhados preferencialmente para a Comissão de Farmacologia da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, podendo ser protocolados nos Departamentos Regionais de Saúde.

57.1 – Os documentos protocolados nos Departamentos Regionais de Saúde deverão ser encaminhados para a Comissão de Farmacologia da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo.

Em 10 de junho de 2013, a Secretaria Estadual de Saúde – Comissão de Farmacologia, em parceria com o AME Maria Zélia - SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) – OSS, implementou a unidade de Polo de Triagem das Solicitações da Comissão de Farmacologia, as solicitações enviadas para SES são encaminhadas ao AME para realização de triagem, cadastro, ordem de dispensação, envio de telegrama, digitalização e arquivo.

5.1 NORMAS GERAIS PARA SOLICITAÇÃO

1- Pacientes residentes no Estado de São Paulo.

2- Tratamento de doença crônica, em caráter ambulatorial.

3- Não será avaliada solicitação de fórmula de manipulação.

4- Não será avaliada solicitação de medicamento de associações de substâncias que são disponibilizadas de maneira isolada pelo SUS.

5- Somente será avaliada solicitação de medicamento ou nutrição enteral com registro na ANVISA, com autorização e comercialização no país.

6- Não será avaliada solicitação de medicamentos utilizados no tratamento das doenças relacionadas na Resolução Normativa ANS nº262, de 1º de agosto de 2011.

5.2 ORIENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS / NUTRIÇÃO ENTERAL NÃO DISPONÍVEL NO SUS

1- Paciente/Médico faz o download do Formulário para avaliação de solicitação de nutrição enteral para paciente de Instituições Públicas e Privadas na página da Comissão de Farmacologia no site da SES/SP:(http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/comissao-de-farmacologia/solicitacao-de-medicamento-ou-nutricao-enteral-por-paciente-de-instituicao-de-saude-publica-ou-privada).

2- Médico preenche, assina e carimba o Laudo para Avaliação de Solicitação de Medicamento ou Nutrição Enteral, anexa às cópias de exames que justifiquem a necessidade do medicamento ou nutrição enteral, que não faz parte do elenco estadual de medicamentos. Faz a receita do medicamento ou nutrição enteral, em duas vias.

3- Diretor da Instituição assina e carimba o laudo.

4- Paciente/Responsável assina o Laudo para Avaliação de Solicitação de Medicamento ou Nutrição Enteral, preenchido pelo médico. Anexa cópia dos documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência com CEP, sendo obrigatório o CNS. Em caso de solicitação para menores de idade que não possuam CPF ou RG, apresentar a cópia da certidão de nascimento e documento do responsável. Confere os documentos utilizando a lista de verificação, disponível na página da Comissão de Farmacologia no site da SES/SP (www.saude.sp.gov.br).

5- Documentação é devidamente encaminhada para a Comissão de Farmacologia da SES/SP pela unidade na qual o paciente é tratado.

VIA CORREIO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188
Cerqueira César - São Paulo/SP
CEP: 05403-000
ou Pessoalmente no Departamento Regional de Saúde (DRS) de sua cidade.

Aguardar resposta por telegrama/email da CF-SES/SP, em até 30 (trinta) dias após a data de entrada dos documentos na SES/SP.

Em caso de dúvidas, encaminhar e-mail para: comissaofarmacologia@saude.sp.gov.br

5.3 FORMULÁRIOS UTILIZADOS

Disponíveis no Capítulo 8 – Anexos.

Anexo 9 – Laudo para Solicitação de Medicamento – Protocolo Administrativo.

Anexo 10 – Laudo para Solicitação de Nutrição Parenteral – Protocolo Administrativo.

6

INFORMAÇÕES ÚTEIS

6 INFORMAÇÕES ÚTEIS

Colaborador: Geovana Balduino Bispo de Souza

6.1 FARMÁCIAS DE DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO

F.M.E. CS I VILA MARIANA
Endereço: Av. Dr. Altino Arantes, 1344 - Vila Clementino
CEP: 04042-005 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 5074-4700
E-mail: vilamariana@ceaf.spdm.org.br

F.M.E. FRANCO DA ROCHA
Endereço: Av. dos Coqueiros, 300 - Centro
CEP: 07800-000 - Franco da Rocha/SP
Tel.: (11) 4449-5111 - Ramal 526
E-mail: chj-farmacia@saude.sp.gov.br

F.M.E. GUARULHOS
Endereço: Av. Emilio Ribas, 1126/1130 - Gopoúva
CEP: 07020-010 - Guarulhos/SP
Tel.: (11) 2408-5886
E-mail: fac-guarulhos@saude.sp.gov.br

F.M.E. HOSPITAL DAS Clínicas – USP
Endereço: Av. Eneas de Carvalho Aguiar, 155 - Térreo - Jardim Paulista
CEP: 05403-000 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 3069-7172
E-mail: asforsin@hcnet.usp.br | estoque.caf@hcnet.usp.br | fa38673@hcnet.usp.br

F.M.E. HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Endereço: Rua Pedro de Toledo, 1800 - Térreo - Vila Mariana
CEP: 04039-034 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 5088-8424
E-mail: farmacia_amb@iamspe.sp.gov.br

F.M.E. MOGI DAS CRUZES
Endereço: Av. Francisco Rodrigues Filho, 143 - Mogilar
CEP: 08773-380 - Mogi das Cruzes/SP
Tel.: (11) 4791-3775
E-mail: fac-mogi@saude.sp.gov.br

F.M.E. OSASCO - (hoje na sede do DRS I)
Endereço: Rua Conselheiro Crispiniano, 20 - 3º andar - Centro
CEP: 02037-000 - Osasco/SP
Tel.: (11) 3017-2056
E-mail: fac-osasco@saude.sp.gov.br. | mkakida@saude.sp.gov.br

F.M.E. MARIA ZÉLIA
Endereço: Rua Jequitinhonha, 368 - Catumbi
CEP: 03021-040 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 3583-1900
E-mail: fac-mariazelia@saude.sp.gov.br |
farmaciamz@amemz.spdm.org.br

F.M.E. VÁRZEA DO CARMO
Endereço: Rua Leopoldo Miguez, 327 - Cambuci/Glicério
CEP: 01518-020 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 3555-0155
E-mail: fac-varzea@saude.sp.gov.br |
varzeadocarmo@ceaf.spdm.org.br

F.M.E. SANTO ANDRÉ - HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS
Endereço: Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321 - Paraíso
CEP: 09190-610 - Santo André/SP
Tel.: (11) 2829-5030/5000 - ramal 5212
E-mail: farmaciamariocovas@gmail.com

F.M.E. DRº GERALDO BOURROUL - SANTA CASA DE SÃO PAULO
Endereço: Rua Martins Fontes, 208 - Consolação
CEP: 01050-000 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 2141-6227/6240
E-mail: aegb.farmacia@santacasasp.org.br

F.M.E. CRT – AIDS
Endereço: Rua Santa Cruz, 81 - Subsolo - Vila Clementino
CEP: 04121-000 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 5087-9827
E-mail: gumizuno@ig.com.br

F.M.E. CSI DE PINHEIROS
Endereço: Rua Ferreira de Araujo, 789 - Pinheiros
CEP: 05428-002 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 3031-8407
E-mail: csp-farmacia@saude.sp.gov.br

F.M.E. INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
Endereço: Av. Dante Pazzanese, 500 - Vila Mariana
CEP: 04012-909 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 5085-6131
E-mail: ligiao@dantepazzanese.org.br

F.M.E. INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS
Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 165 - Pacaembu
CEP: 01246-900 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 3082-1161/3896-1275
E-mail: ana.campos@emilioribas.sp.gov.br

F.M.E. HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA
Endereço: Rua João Francisco de Moura, 251 - Vila Campo Grande
CEP: 04455-170 - Pedreira/SP
Tel.: (11) 5613-5897
E-mail: renato.cruz@pedreira.org.br |
farmaceuticos@pedreira.org.br

F.M.E. HOSPITAL HELIÓPOLIS
Endereço: Rua Conego Xavier, 276 - Sacomã
CEP: 04231-000 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 2067-0453/0442
E-mail: marcia.ppuerro@gmail.com |miriamhabenchus@gmail.com

F.M.E. ARAÇATUBA
Endereço: Rua Afonso Pena, 1537 - Vila Mendonças
CEP: 16015-030 - Araçatuba/SP
Tel.: (18) 3622-5266 / 99655-8633
E-mail: fac-aracatuba@saude.sp.gov.br

F.M.E. ARARAQUARA
Endereço: Av. Espanha, 188 - 3º e 4º andar - Centro
CEP: 14801-130 - Araraquara/SP
Tel.: (16) 3301-1876
E-mail: fac-araraquara@saude.sp.gov.br

F.M.E. ASSIS - HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 289 - Centro
CEP:19806-150 - Assis/SP
Tel.: (18) 3302-6081
E-mail: drs9-nafassis@saude.sp.gov.br

F.M.E. BARRETOS
Endereço: Av. Vinte e Um, 1238 - Centro
CEP: 14780-310 - Barretos/SP
Tel.: (17) 3321-7314
E-mail: fac-barretos@saude.sp.gov.br

F.M.E. BAURU - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coub, 1-100 - Geisel
CEP: 17033-360 - Bauru/SP
Tel.: (14) 3235-0174/0214
E-mail: fac-bauru@saude.sp.gov.br | drs6-farm@saude.sp.gov.br

F.M.E. BOTUCATU
Endereço: Distrito Rubião Jr, s/nº - Jd. Nossa Senhora das Graças
CEP: 18607-621 - Botucatu/SP
Tel.: (14) 3811-6207
E-mail: fac-botucatu@saude.sp.gov.br

F.M.E. CAMPINAS
Endereço: Rua Coronel Setembrino de Carvalho, 123 - Ponte Preta
CEP: 13041-480 - Campinas/SP
Tel.: (19) 3233-6972 / 3232-5118
E-mail: fac-campinas@saude.sp.gov.br

F.M.E. CAMPINAS - (Unicamp)
Endereço: Rua Zeferino Vaz, s/nº - Cidade Universitária
CEP: 13086-002 - Campinas/SP
Tel.: (19) 3249-0575
E-mail: fac-unicamp@saude.sp.gov.br

F.M.E. FRANCA
Endereço: Av. Wilson Sabio de Melo, 1833 - Distrito Industrial
CEP: 14405-215 - Franca/SP
Tel.: (16) 3724-4867/3722-0140
E-mail: fac-franca@saude.sp.gov.br

F.M.E. MARÍLIA
Endereço: Rua XV de Novembro, 1151 - Centro
CEP: 17015-100 - Marília/SP
Tel.: (14) 3402-8862
E-mail: drs9-farmacia@saude.sp.gov.br

F.M.E. PIRACICABA
Endereço: Rua do Trabalho, 602 - Vila Independência
CEP: 13418-220 - Piracicaba/SP
Tel.: (19) 3437-7431
E-mail: drs10-naf@saude.sp.gov.br

F.M.E. PRESIDENTE PRUDENTE
Endereço: Rua José Bongiovani, 1297 - Bloco VII - Cidade Universitária
CEP: 19050-680 - Presidente Prudente/SP
Tel.: (18) 3226-6743/3918-9850 ramal 524
E-mail: drs11-farmacia@saude.sp.gov.br

F.M.E. REGISTRO
Endereço: Rua Pariquera-Açu, 41 - Vila Tupi
CEP: 11900-000 - Registro/SP
Tel.: (13) 3828-2949/2968
E-mail: drs12-fm@saude.sp.gov.br

F.M.E. RIBEIRÃO PRETO
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1112 - Centro
CEP: 14048-900 - Ribeirão Preto/SP
Tel.: (16) 3602-2386
E-mail: fac-ribeiraopreto@saude.sp.gov.br

F.M.E. SANTOS
Endereço: Av. Epitacio Pessoa, 415 - Bairro Aparecida
CEP: 11030-601 - Santos/SP
Rua Alexandre Martins, 70 - Bairro Aparecida
CEP: 11025-201 - Santos/SP
Tel.: (13) 3278-7776 / 3278-7719 / 3278-7716 / 3278-7700
E-mail: fac-santos@saude.sp.gov.br

F.M.E. SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Endereço: Rua Dr. Teofilo Ribeiro de Andrade, 869 - Jd. Santa Helena
CEP: 13870-210 - São João da Boa Vista/SP
Tel.: (19) 3634-2803
E-mail: drs14-afarm@saude.sp.gov.br

F.M.E. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Endereço: Av. Olivio Gomes, 100 - Santana
CEP: 12211-420 - São José dos Campos/SP
Tel.: (12) 3941-7211 ramal 213
E-mail: drs17-naf@saude.sp.gov.br

F.M.E. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Endereço: Rua Bernardino de Campo, 4441 - Redentora
CEP: 15015-300 - São José do Rio Preto/SP
Tel.: (17) 3222-4634
E-mail: fac-sjrp@saude.sp.gov.br

F.M.E. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Endereço: Av. Lino José de Seixas, 1455 - Jd. Fuscaldo
CEP: 15061-061 - São José do Rio Preto/SP
Tel.: (17) 3202-1717 - ramal 749
E-mail: fac-larsfran@saude.sp.gov.br

F.M.E. SOROCABA
Endereço: Comendador Pereira Inácio, 564 - Lajeado
CEP: 18030-005 - Sorocaba/SP
Tel.: (15) 3332-9517/9100
E-mail: fac-sorocaba@saude.sp.gov.br

F.M.E. VOTUPORANGA
Endereço: Rua Antonio Murassi, 2680 - Residencial Parque Saúde
CEP: 15502-326 - Votuporanga/SP
Tel.: (17) 3422-6157
E-mail: fac-votuporanga@saude.sp.gov.br

F.M.E. TAUBATÉ
Endereço: Rua Alcaide Mor Camargo, 100 - Jardim Russi
CEP: 12010-240 - Taubaté/SP
Tel.: (12) 3625-2377 / 3625-2380
E-mail: drs17-farm@saude.sp.gov.br

UNIDADES MUNICIPAIS

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

STS PIRITUBA/PERUS

AMA Especialidade Vila Zatt
Endereço: Rua Monsenhor Manuel Gomes, 77 – Vila Zatt
Tel.: (11) 3975-2116 / 2905-7164
Atendimento de 2ª a sábado das 07 às 19 horas

AMA UBS Perus
Endereço: Praça Vigário João Gonçalves de Lima, 239 - Vila Perus
Tel.: (11) 3917-6245 / 3978-7588
Atendimento de 2ª a sábado das 07 às 19 horas

AMA UBS Parque Maria Domitila
Endereço: Av. do Anastácio, 2421 - City América
Tel.: (11) 3903-4825 / 3902-2303
Atendimento de 2ª a sábado das 07 às 19 horas

STS FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA

Ambulatório de Especialidades da Freguesia do Ó
Endereço: Rua Bonifácio Cubas, 304 - Freguesia do Ó
Tel.: (11) 3936-3177
Atendimento de 2ª a sábado das 07 às 19 horas

STS CASA VERDE / CACHOEIRINHA

AMA Especialidades Parque Peruche
Endereço: Rua Engenheiros José Rangel de Camargo, 500 - Parque Peruche
Tel.: (11) 3858-9865
Atendimento de 2ª a sábado das 07 às 19 horas

STS SANTANA / TUCURUVI / JAÇANÃ / TREMEMBÉ

Ambulatório de Especialidades Tucuruvi
Endereço: Av. Nova Cantareira 1467 - Tucuruvi
Tel.: (11) 2952-6700 / 2204-5311
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

CAPS III Mandaqui
Endereço: Rua Luiz Lustosa da Silva, 369 - Mandaqui
Tel.: (11) 2979-0923
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

CAPS Jaçanã
Endereço: Rua Paulo Lincon Valle Pontin, 323 - Jaçanã
Tel.: (11) 2242-3884
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

STS M´BOI MIRIM

AE Jardim Ibirapuera
Endereço: Rua Philipe de Vitry, 280 – Jd. Santa Josefina
Tel.: (11) 5891-3236 / 5897-3017
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

AMA Parque Figueira Grande
Endereço: Rua Daniel Klein, 211 – Pq. Figueira Grande
Tel.: (11) 5514-6609 / 5809-4788
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

AMA Parque Novo Santo Amaro
Endereço: Rua Porta do Prado, 18 – Pq. Novo Sto Amaro
Tel.: (11) 5511-4249
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

STS CAPELA DO SOCORRO

AE Jardim Cliper
Endereço: Rua Dr. Carlos Pezzolo x Rua Aida Gomes, s/n° - Jd. Esmeralda
Tel.: (11) 5971-2532 / 5928-5703
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

AE Doutor Miltom Aldred
Endereço: Rua São Caetano do Sul, 381 - Grajaú
Tel.: (11) 5932-2015 / 5528-1475
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

STS CAMPO LIMPO

A E Jardim Pirajussara
Endereço: Av. Amadeu da Silva Samelo, 423 - Jd. Martinica
Tel.: (11) 5842-6257
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

AMA Vila Prel – Professor Antônio Bernardes de Oliveira
Endereço: Rua Tereza Maia Pinto, 11- Vila Prel
Tel.: (11) 5817-8002
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

STS PARELHEIROS

AMA Jardim Campinas
Endereço: Rua Pleiades, s/n° - Jd. Maria Amelia
Tel.: (11) 5527-3589
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

AMA Parelheiros
Endereço: Rua Mario Trappe, 100 - Jd. Novo Parelheiros
Tel.: (11) 5921-5361
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

STS SANTO AMARO / CIDADE ADEMAR

AE Dr Antunes da Rocha – Pedreira
Endereço: Rua Córrego Azul, 433 - Pedreira
Tel.: (11) 5614-7473 / 5611-8656
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

AMA Especialidade Vila Constância
Endereço: Rua Hermenegilo Martini, s/n° - Vila Constância
Tel.: (11) 5678-7444 / 5563-7877
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

STS TIRADENTES UBS - Prefeito Prestes Maia
Endereço: Rua Inácio Pinto Lima, 35 - Cidade Tiradentes
Tel.: (11) 2555-2676 / 2555-5587
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

UBS Cidade Tiradentes I
Endereço: Rua dos Têxteis, 512 - Cidade Tiradentes
Tel.: (11) 2282-0250 / 2282-5151
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

STS Guaianases II
Endereço: Rua Comandante Carlos Rhul, 189 - Guaianases
Tel.: (11) 2557-8132 / 2554-4064
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

UBS Chabilândia
Endereço: Estrada do Lageado Velho, 76 - Vila Minerva
Tel.: (11) 2557-9571 / 2552-5015
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

UBS ITAQUERA

UBS Itaquera
Endereço: Rua Américo Salvador Novelli, 265 - Itaquera
Tel.: (11) 2286-0015
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 20 horas e sábado das 07 às 19 horas

STS SÃO MATEUS

UBS Tietê II
Endereço: Rua Augusto Ferreira Ramos, 09 - Jd. Tietê
Tel.: (11) 2017-0093
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

STS ERMELINO MATARAZZO

UBS AMA Jardim Popular
Endereço: Rua Jaime Torres, 679 - Jd. Popular
Tel.: (11) 2685-0439 / UBS – 2685-0469 / AMA
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

STS SÃO MIGUEL

AMA Tito Lopes
Endereço: Rua Professor Antonio Gama de Cerqueira, 347 - Vila Americana
Tel.: (11) 2296-9099
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

STS ITAIM PAULISTA

AMA / A E. Texima
Endereço: Av. Marechal Tito, 6577 - Itaim Paulista
Tel.: (11) 2572-2319 / 2572-2573
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

UBS Atualpa Girão Rabelo
Endereço: Rua Ilha do Arvoredo, 10 - Itaim Paulista
Tel.: (11) 2693-2634 / 2963-1436
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO OESTE

STS LAPA / PINHEIROS

UBS Dr. José de Barros Magaldi
Endereço: Rua Salvador Cardoso, 177 - Itaim Bibi
Tel.: (11) 3168-6571
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

UBS Vila Romana
Endereço: Rua Vespasiano, 676 - Vila Romana
Tel.: (11) 3672-0911
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

AMA Especialidades Vila Zatt
Endereço: Rua Monsenhor Manuel Gomes, 77 - Vila Zatt
Tel.: (11) 3975-2116 / 2905-7164
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

STS BUTANTÃ

SAE DST / AIDS Butantã
Endereço: Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3596 - Butantã
Tel.: (11) 3768-2168
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

AMA / UBS Vila Sônia
Endereço: Rua Abraão Calil Rezek, 91 - Vila Sônia
Tel.: (11) 3742-9844 / 3742-1487
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

STS SÉ UBS Doutor Humberto Pascalli – Santa Cecília
Endereço: Rua Vitorino Carmilo, 599 - Santa Cecília
FAX: (11) 3825-5745 / 3666-2034 Gerência
Atendimento de 2ª a sábado das 07 às 19 horas

UBS República
Endereço: Praça da Bandeira, 15 - Centro
Tel.: (11) 3101-0812
Atendimento de 2ª a 6ª das 07 às 19 horas

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

STS VM / JABAQUARA

AMA Santa Cruz
Endereço: Rua Pedro de Toledo, 309 - Vila Mariana
Tel.: (11) 5082-1072
Atendimento de 2ª a 6ª das 08 às 17 horas

AMA Dr. Geraldo da Silva Ferreira
Endereço: Av. Engenheiro Armando Arruda Perreira , 2944 - Vila do Encontro.
Tel.: (11) 5021-5973
Atendimento de 2ª a 6ª das 08 às 17 horas

STS IPIRANGA

AMA / AE Flávio Gianotti
Endereço: Rua Xavier de Almeida, 210 - Ipiranga
Tel.: (11) 2061-9330
Atendimento de 2ª a 6ª das 08 às 17 horas

AMA / Parque Bristol
Endereço: Rua François Bunel, 194 - Parque Bristol
Tel.: (11) 2264-9357
Atendimento de 2ª a 6ª das 08 às 17 horas

STS VP / SAPOPEMBA

AMA / AE Sapopemba
Endereço: Rua João Lospes de Lima, 1151 - Jardim Sapopemba
Tel.: (11) 2962-3481
Atendimento de 2ª a 6ª das 08 às 17 horas

AE Vila Prudente
Endereço: Praça do Centenário de Vila Prudente, 108 - Vila Prudente
Tel.: (11) 2273-1665
Atendimento de 2ª a 6ª das 08 às 17 horas

A E PENHA AE Maurice Paté (AE Penha)
Endereço: Praça Nossa Senhora da Penha, 55 - Penha
Tel.: (11) 2097-6826
Atendimento de 2ª a 6ª das 08 às 17 horas

AMA Padre Manoel da Nóbrega
Endereço: Av. Padre Francisco de Toledo, 545 - Jd. Artur Alvim
Tel.: (11) 2254-5023
Atendimento de 2ª a 6ª das 08 às 17 horas

STS MOOCA / ARICANDUVA

AMA Água Rasa
Endereço: Rua Serra de Jairé, 1480 - Quarta Parada
Tel.: (11) 2268-3542
Atendimento de 2ª a 6ª das 08 às 17 horas

AMA V. Guarani
Endereço: Rua Teresinha, 123 - Chácara Belenzinho
Tel.: (11) 2717-2732
Atendimento de 2ª a 6ª das 08 às 17 horas

LINKS INFORMATIVOS:

Lista de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - Secretaria Estadual de Saúde – SP:
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/lista-de-medicamentos-do-componente-especializado

Formulário LME:
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/lme-solicitacao-pt-1554-ago-2013.pdf

Comissão de Farmacologia – Solicitação Administrativa – Secretaria Estadual de Saúde:
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/comissao-de-farmacologia/

Informações sobre Assistência Farmacêutica – Ministério da Saúde:
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1000

RENAME 2013 – 8ª Edição:
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Rename_2013_Livro.pdf

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde:
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=35490&janela=1

Informações sobre o acesso aos Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – Site do Ministério da Saúde:
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=31033&janela=1

Protocolos e Resoluções Estaduais:
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/protocolos-e-normas-tecnicas-estaduais/quais-sao

Link para acesso aos exames e documentos:
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/links-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento

7

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

7

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

4BIO MEDICAMENTOS LTDA
Tocilizumabe. Disponível em: <www.4bio.com.br/download/pdf/167/167-actemra.pdf/> Acesso em 18/ago/2014

ABOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
Nossas Bulas. Akineton. Disponível em: <https://www.abbottbrasil.com.br/abbott/upload/bulario/1396273911akineton_bula_paciente.pdf> Acesso em 17/nov/2013

Nossas Bulas. Creon® Pancreatina. Disponível em: <https://www.abbottbrasil.com.br/abbott/upload/bulario/1370536727bu_27_creon_profissional_jun.2013.pdf> Acesso em 17/nov/2013

ACCORD - INTAS PHARMACEUTICALS LTDA
Micofenolato. Disponível em: <http://accordfarma.com.br/wp-content/uploads/2012/10/micofenolato.pdf> Acesso em 23/jan/2014 e 17/nov/2013

ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S. A
Furosemida. Disponível em: <http://www.ache.com.br/Downloads/LeafletText/147/BU_FUROSEMIDA_OUT2011.pdf> Acesso em 29/jul/2014

Bissulfato de Clopidrogel. Disponível em: <http://www.news-medical.net/health/Beta-Blockers-What-are-Beta-Blockers-(Portuguese).aspx> Acesso em 21/nov/2013

Diclofenaco sódico. Disponível em: <http://www.ache.com.br/Downloads/LeafletText/103/BU_DICLOFENACOSODICO_DEZ09.pdf> Acesso em 11/dez/2013

Dimeticona. Disponível em: <http://www.ache.com.br/Downloads/LeafletText/105/BU%20dimeticona%20com%202631600.pdf> Acesso em 14 /nov/2013

Dimeticona. Disponível em: <http://www.ache.com.br/Downloads/LeafletText/400/BISSULFATO_CLOPIDOGREL_NOV2011.pdf > Acesso em 21 /nov/2013

Diosmin - Diosmina. Disponível em: <http://www.ache.com.br/Downloads/LeafletText/108/BU_DIOSMIN_COMP_AGO2012.pdf> Acesso em 21/nov/2013

Dipirona Monoidratada. Disponível em: <http://www.ache.com.br/Downloads/LeafletText/109/BU_DIPIRONA-MONOIDRATADA_SET2013.pdf> Acesso em 21/ nov/2013

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. SAI. Bultilbrometo de Escopolamina. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=8013322013&pIdAnexo=1799500> Acesso em 12/jan/2014

<http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM[25229-1-0].PDF> Acesso em 17/nov/2013

<http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM[36072-1-10418].PDF> Acesso em 18/nov/2013

<http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM[25399-1-0].PDF> Acesso em 18/nov/2013

<http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM[26161-1-0].PDF> Acesso em 21/nov/2013

<http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM[25302-2-0].PDF> Acesso em 21/nov/2013

<http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM[26227-1-0].PDF > Acesso em 21/nov/2013

Metri® Ácido Nicotínico. Disponível em: <http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM[25803-2-0].PDF> Acesso em 14/nov/2013

TALIDOMIDA. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/talidomida/bula_talidomida.pdf>. Acesso em 23/jul/2014

Tecnovorin®. Disponível em: <http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM[26346-1-0].PDF> Acesso em 14/nov/2013

<http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=8335692013&pIdAnexo=1813288 > Acesso em 20/mai/2014

ALELERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. Botox® Toxina Botulínica. Disponível em: <http://www.allergan.com.br/Bulas/Documents/botox_profissional.pdf.> Acesso em 31/jul/2014

APSEN FARMACÊUTICA S. A. Primid.
Disponível em: <http://www.apsen.com.br/novas_bulas/aberta/

PRIMID_Bula_Paciente.pdf> Acesso em 22/ jul/2014
Trexifenidil. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/657/artane.htm> Acesso em 29/jul/2014

ARBEX, M. A.; VARELLA, M. C. L.; SIQUEIRA, H. R.; MELLO, F. A. F. Drogas antituberculose: Interações medicamentosas, efeitos adversos e utilização em situações especiais. Parte 2: Fármacos de segunda linha*. Jornal Brasileiro de Pneumologia, Brasília, v. 36, n.5, p. 641-656, Nov./Dez. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v36n5/v36n5a17.pdf> Acesso em 20/nov/2013

ARISTON INDS. QUÍMS. E FARM. LTDA. Verapamil. Disponível em: <http://www.blau.com.br/uploads/produtos/bula_pdf/43vasoton.pdf> Acesso em 30/jul/2014

ÁVILA, L. C. Dicionário de Administração de Medicamentos na Enfermagem. Rio de Janeiro. Ed. EPUB – Editora de Publicações Médicas, 2011. p. 316.

BAU FARMACÊUTICA S. A. ALFAINTERFERONA 2A, Recombinante. Disponível em: <http://www.blau.com.br/uploads/produtos/bula_pdf/101 alfainterferona-2a.pdf> Acesso em 25/out/2013

BIOLO, A. Antitrombóticos e trombolíticos. In: BARROS, E.; BARROS, H.M.T. (Org). Medicamentos na prática clínica. São Paulo: Ed. ARTMED, 2010. p 221-232.

BISAGLIA, J. B. et al. Atualização terapêutica em tuberculose: principais efeitos adversos dos fármacos. Boletim de Pneumologia Sanitária, Rio de Janeiro, v.11, n.2, p. 53-59, Dec. 2003. Disponível em: <http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?pid=S0103-460X2003000200008&script=sci_arttext> Acesso em 20/nov/2013

BLAUSIEGEL INDÚSTRIA E COMÉRICO LTDA. Imunoglobulin® Imunoglobulina Humana. Disponível em: <www.4bio.com.br/download/pdf/65/65-imunoglobulina.pdf/> Acesso em 22/jan/2014

Imunoglobulina Humana. Disponível em: <www.4bio.com.br/download/pdf/65/65-imunoglobulina.pdf/> Acesso em 22/jan/2014

BLOG - EFEITOS COLATERAIS. Fernegan – Cloridrato de Prometazina. Disponível em: <http://www.efeitoscolaterais.blog.br/2009/03/bula-de-remedio-fenergan-cloridrato-prometazina-aventis/> Acesso em 22/jul/2014

BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA. Cardizem. Disponível em: <http://www.boehringer-ingelheim.com.br/arquivos/Cardizem_CD_paciente.pdf> Acesso em 11/dez/2013

BRASIL. Medida provisória no 1.569-9, de 11 de novembro de 2012.

BRISTOL – MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA S. A. Hydrea® Hidroxiureia. Disponível em: <http://www.bristol.com.br/Files/Bulas/HYDREA_CAP_VP1_Rev0713.pdf> Acesso em 22/jan/2014

Orencia® Abatacepte. Acesso em: <http://www.bristol.com.br/Files/Bulas/ORENCIA_SOLINJ_VP3_Rev1013.pdf> Acesso em 14/nov/2013

Orencia® Abatacepte. Advertências e Interações Medicamentosas. Acesso em: <http://www.bristol.com.br/Files/Bulas/ORENCIA_POLIOF_101800390_VP2.pdf> Acesso em 27/jul/2014

Sustrate® Propatilnitrato. Disponível em: <http://www.bristol.com.br/Files/Bulas/SUSTRATE_paciente.pdf> Acesso em 22/jul/2014

BULA CERTOLIZUMABE PEGOL. Disponível em: <http://www.ema.europa.eu/docs/pt_PT/document_library/EPAR__Product_Information/human/001037/WC500069763.pdf> Acesso em 14/nov/2013

BULÁRIOS – BULAS DE MEDICAMENTOS. Primidona. Disponível em: <http://bulario.net/primidona/ Acesso em 20 e 22/jul/2014 e nov/2013

Trusopt. Disponível em: <http://bulario.net/trusopt/> Acesso em: 20/nov/2013

Victrelis. Disponível em: <http://bulario.net/victrelis/> Acesso em: 20/nov/2013

Cloroquina. Disponível em: <http://bulario.net/cloroquina/> Acesso em: 25/nov/2013

CAETANO, N. BPR - GUIA DE REMÉDIOS – EDIÇÃO ATUALIZADA. Ed. Escala. 2012.

CASTRO, S. R. Sistema Cardiovascular: antiarrímicos, vasodilatadores e digitálicos. Disponível em: <http://fit2.fit.br/sitedoprofessor/professor/ ink/20101204101600Farmacos%20do%20Sistema%20

CARDIOVASCULAR.pdf> Acesso em 21/nov/2013

CENTRALX. Bulário de Medicamentos Tolcapone. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/10790/tasmar.htm> Acesso em jul/2014

Tolcapone. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/5780/comtan.htm> Acesso em 31/jul/2014

Topamax. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/63977/topamax.htm> Acesso em 31/jul/2014

Trexifenidil. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/7881/triexidyl+5mg+20+blist+10cps.htm> Acesso em30/jul/2014

Akineton. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/5680/akineton.htm> Acesso em 17/nov/2013

Amplictil. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/1920/amplictil.htm> Acesso em 25/nov/2013

Azopt. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/7715/azopt.htm> Acesso em 19/nov/2013

Azopt. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/5751/cloroquina.htm> Acesso em 25/nov/2013

Bromocriptina. Disponível em: http://www.bulas.med.br/bula/5125/bromocriptina.htm. Acesso em 21/nov/2013

Ciclofosfamida. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/4937/genuxal.htm> Acesso em 14/nov/2013

Filgastrin. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/52733/filgrastim.htm> Acesso em 14/nov/2013

Hidrafix Solução Hidratante Oral. Disponível em <http://www.bulas.med.br/bula/2829/hidrafix+solucao+hidratante+oral.htm> Acesso em 27/ago/ 2014

Hipnóticos e Sedativos. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/p/hipnoticos+e+sedativos-72912> Acesso em 25/nov/2013

Mabthera. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/10789/mabthera.htm> Acesso em 20/mai/2014

Metilprednisolona. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/5699/unimedrol.htm> Acesso em 29/jul/2014

Propanolol. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/10834/propranolol.htm> Acesso em 22/jul/2014

Provacol. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/3370/pravacol.htm> Acesso em 22/jul/2014

Residronato Sódico. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/23660/actonel+35+mg.htm> Acesso em 20/mai/2014

Ribavirina. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/10859/ribavirina.htm> Acesso em 20/mai/2014
Ribavirina. Disponível em: <http://www.bulas.med.br/bula/6634/pilocarpina.htm> Acesso em 19/mai/2014

Trusopt. Disponível em: <http://app.centralx.com/bulas/#reader&id=5092&k=bulas> Acesso em 14/nov/2013
COMPANHIA DE INTERNET BIBLIOMED. Botox®. Disponível

em: <https://www.bibliomed.com.br/bulario/exibir_farmaco.cfm?id=972> Acesso em 31/jul/2014

CONSULTA REMÉDIOS. Cloridrato de Dorzolamida. Disponível em: <http://consultaremedios.com.br/medicamento/cloridrato-de-dorzolamida> Acesso em 21/nov/2013

Cloridrato de Propanolol. Disponível em: <http://consultaremedios.com.br/medicamento/cloridrato-de-propranolol# > Acesso em 22/jul/2014

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. Pamergan® - Cloridrato de Prometazina. Disponível em: <http://www.2cristalia.com.br/bulas/pamergan_bula_paciente.pdf > Acesso em 22/jul/2014

Cloridrato de Lidocaína. Disponível: <http://www.2cristalia.com.br/bulas/Cloridrato_de_lidocaina_geleia_Bula_Paciente.pdf> Acesso em 20/ago/2014

DEG IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. Estrogênios Conjugados. Disponível em: <http://cdn.fagron.com.br/doc_prod/docs_5/doc_415.pdf> Acesso em 27/ago/2014

DILTIAZEM. Disponível em < http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/diltiazem.pdf > São Paulo, Brasil. Acesso em 11/dez/2013

E.M.S. S. A. Verapamil. Disponível em: <http://www.germedpharma.com.br/site/uploads/tx_productspharma/087916_clorverapamil.pdf> Acesso em 30/jul/2014

ELI LILLY DO BRASIL LTDA. Evista® Cloridrato de Raloxifeno. Disponível em: <https://www.lilly.com.br/Inserts/Patients/Bula_Evista_Pac_CDS18OCT06.pdf> Acesso em 20/mai/2014

EMBRAFARMA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA. IT. Biperideno HCL. Disponível em: <http://www.embrafarma.com.br/novo/modules/pdf/9c838d2e45b2ad1094d42f4ef36764f6.pdf> Acesso em 14/nov/2013

EMS S.A. Dimeticona. Disponível em: http://www.germedpharma.com.br/site/uploads/tx_productspharma/088365_dimeticona.pdf> Acesso em 14/nov/2013

F. HOFFMANN-LA ROCHE LTDA. Tocilizumabe. Disponível em: <http://www.dialogoroche.com.br/content/dam/dialogo/pt_br/Bulas/A/Actemra/Bula-Actemra-Paciente.pdf> Acesso em 18/ago/2014

FARMOQUÍMICA S.A. Sustrate® – Propatilnitrato. Acesso em: <http://www.fqm.com.br/Adm/Publicacao/MostrarArquivo.aspx?Codigo=209> Acesso em 22/jul/2014

FERREIRA, V. J. A. Manifestações neurológicas na intoxicação de lactentes pela associação dimeticona e homatropina. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422006000600017&script=sci_arttext>.

FIO CRUZ - FARMANGUINHOS – INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS. Disponível em: <http://www.far.fiocruz.br/farmanguinhos/images/stories/phocadownload/praziquantel.pdf> Acesso em 22/jun/2014

FOLHETOS, BULAS DE MEDICAMENTOS COM ACESSIBILIDADE. Disponível em: <http://www.folheto.net/bromocriptina-generis-25-mg-comprimidos-bula-do-medicamento/> Acesso em 21/nov/2013

FRAGON. Topiramato. Disponível em: <http://www.fagron.com.br/Literaturas/LITERATURAS%20FARMACEUTICAS/T/TOPIRAMATO.PDF> Acesso em 31/jul/2014

FUTURO PUBLICIDADE – BUSCA REMÉDIO. Metildopa. Disponível em: <http://www.buscaremedio.com.br/bula/metildopa> Acesso em 23/jan/2014

GERMED FARMACÊUTICA LTDA. Diazepam. Disponível em: http://www.germedpharma.com.br/site/uploads/tx_productspharma/088399_Diazepam.pdf> Acesso em 11/dez/2013

GUIA informativo de medicamentos genéricos. In: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/genericos/profissionais/guia_genericos.PDF> Acesso em 25/nov/2013

HELP SAUDE. Remédio. Azopt. Disponível em: <http://www.helpsaude.com/Remedio/Azopt> Acesso em 19/nov/2013
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Termo de Consentimento Informado. Disponível em: <http://www.hcrp.fmrp.usp.br/sitehc/arqs/pdf/termo_consentimento_informado_glaucoma.pdf> Acesso em 30/jul/2014

INFARMED - AUTORIDADE NACIONAL DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE, I. P. Antidiarreicos. Disponível em: <http://www.infarmed.pt/formulario/navegacao.php?paiid=134> Acesso em 21/nov/2013

I. P. Lanreotida. Disponível em: <http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=30892&tipo_doc=rcm>. Acesso em: 21 nov. 2013.

I. P. Folheto Informativo: Informação para o Utilizador – Iloprost Ibigen 50 microgramas/0,5 ml concentrado para solução para perfusão iloprost. Disponível em: < www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=51437&tipo> Acesso em 22/jan/2014

I. P. Alafacaldidol. Disponível em: <www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=47533&tipo_doc=rcm> Acesso em 25/jul/2014

I. P. Ziprasidona. Disponível em: <http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=53925&tipo_doc=rcm> Acesso em 30/jul/2014

INFARMED – PARQUE DE SAÚDE DE LISBOA – GOVERNO DE PORTUGAL/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Alafad. Disponível em: <www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=47533&tipo_doc=rcm> Acesso em 14/nov/2013

INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO (IMESC). Infodrogas. Anticolinérgicos. Disponível em: <http://www.imesc.sp.gov.br/infodrogas/antcmed.htm> Acesso em 16/nov/2013

JACOMINI, L. C. L.; SILVA, T. M. Interações Medicamentosas. In: PORTO, C.C. . Interações Medicamentosas. Rio de Janeiro: Ed. GUANABARA KOOGAN, 2011. p 223-226.

JACOMINI, L. C. L.; SILVA, T. M. Interações Medicamentosas. In: PORTO, C.C. . Interações Medicamentosas. Rio de Janeiro: Ed. GUANABARA KOOGAN, 2011. p 784.

JANSSEN – CILAG FARMACÊUTICA. Incivo Telaprevir. Disponível em: <http://sbhepatologia.org.br/pdf/incivo_bula.pdf> Acesso em 23/jul/ 2014

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DE PERNAMBUCO. Hidróxido de Alumínio. Disponível em: <http://www.lafepe.pe.gov.br/LAFEPE/medicamentos/antiacidos/hidroxido_aluminio.html> Acesso em 22/jan/2014

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO VITAMED LTDA. Geriplus Polivitamínico e Polimineral. Disponível em:< http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=496042014&pIdAnexo=1943518> Acesso em 27/ago/2014

LABORATÓRIOS FERRING LTDA. Gonapeptyl Depot 3,75mg – Acetato de Triptorrelina. Disponível em: <http://www.ferring.com.br/bulas/produtos_bula_Gonapeptyl%20depot.pdf> Acesso em 29/jul/2014

Geodon ® Ziprasidona. Bula do medicamento. Disponível em:<https://stagecorporatesitebr.pfizer.edrupalgardens.com/sites/g/files/g10010996/f/201403/GeodonIM_PS.pdf> Acesso em 30/jul/2014

LABORATÓRIOS PFIZER LTDA. Taliglucerase. Disponível em: <http://www.pfizer.com.br/arquivoPdf/Uplyso.pdf> Acesso em 23/jul/2014

LACY F.C. et.al. Medicamentos Lexi-Comp Manole: Uma fonte abrangente para médicos e profissionais da saúde. São Paulo. Ed. Lexi Comp INC, 2009.

LES LABORATORIES SERVIER DO BRASIL LTDA. Daflon. Disponível em: <http://servier.com.br/sites/default/files/microsoft_word_-_14.06.17_bula_profissional_sem_marcacao_daflon_1000_aprovada_anvisa_aprovada_claire_2.pdf> Acesso em 21/nov/2013

MARCOLIN, M. A.; CANTARELLI; M. G.; GARCIA JUNIOR; M. Interações farmacológicas entre medicações clínicas e psiquiátricas. Revista Psiquiatria Clínica. São Paulo. n. 31, p. 70-81. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rpc/v31n2/a03v31n2.pdf> Acesso em 29/nov/2013

MEDICAMENTOS E SAÚDE. Praziquantel. Disponível em: <http://www.medicamentosesaude.com/bula-de-remedio-praziquantel/> Acesso em 22/jul/2014

MEDICINANET INFORMAÇÕES DE MEDICINA S. A. Sulfato Ferroso. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/conteudos/conteudo/3129/sulfato_ferroso.htm> Acesso em 23/jul/2014
Topiramato.Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/5089/topiramato.htm> Acesso em 31/jul/2014

Travaprosta. Disponível em: <http:// www.medicinanet.com.br/bula/5128/travatan.htm> Acesso em 30/jul/2014

Vigabatrina. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/detalhes/4589/interacoes_medicamentosas_sabril.htm> Acesso em 31/jul/2014

Ziprasidona. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/detalhes/83/interacoes_medicamentosas_geodon.htm> Acesso em 30/jul/2014

Alafacaldidol. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/conteudos/medicamentos/140/alfacalcidol.htm> Acesso em 25/jul/2014

Alfacaldidol. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/conteudos/medicamentos/140/alfacalcidol.htm> Acesso em 14/nov/2013

Ambroxol. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/459/ambroxol.htm> Acesso em 25/out/2013

Amitriptilina. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/484/amitriptilina.htm> Acesso em 25/out/2013

Biperideno. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/8041/biperideno.htm> Acesso em 15/nov/2013

Busonid Aerossol Nasal. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/1062/busonid_aerossol_nasal.htm> Acesso em 21/nov/2013

Busonid Aerossol Nasal. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/1563/clonazepam.htm> Acesso em 21/nov/2013

Busonid Cápsula. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/1064/busonid_capsulas.htm> Acesso em 21/nov/2013

Cefalexina. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/1238/cefalexina.htm> Acesso em 14/nov/2013

Cimetidina. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/1405/cimetidina.htm> Acesso em 14/nov/2013

Cloridrato de Pilocarpina. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/conteudos/conteudo/3919/cloridrato_de_pilocarpina.htm> Acesso em 23/jan/2014

Cloroquina. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/detalhes/7453/interacoes_medicamentosas_cloroquina> Acesso em 25/nov/ 2013

Codein. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/1608/codein.htm> Acesso em29/nov/2013

Colomycim. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/7462/colomycin.htm> Acesso em 25/jul/2014

Creon. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/1686/creon.htm> Acesso em 14/nov/2013

Efeitos colaterais de digoxina. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/detalhes/1931/reacoes_adversas_digoxina.htm> Acesso em 14/nov/2013

Estrogênios Conhugados. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/conteudos/conteudo/3855/estrogenios_conjugados.htm> Acesso em 27/ago/2014

Fernegan. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/2423/fenergan.htm> Acesso em 22/jul/2014

Interações Medicamentosas de Clozapina. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/detalhes/8107/interacoes_medicamentosas_clozapina.htm> Acesso em 29/nov/2013

Levopromazina. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/conteudos/medicamentos/641/levomepromazina.htm> Acesso em 14/jan/ 2014

Lidocaína. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/8224/lidocaina_geleia_2.htm> Acesso em 20/ago/2014

Lidocaína. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/8224/lidocaina_geleia_2.htm> Acesso em 20/ago/2014

Mebendazol. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/8234/mebendazol_100.htm > Acesso em 20/ago/2014

Policresuleno Cinchocaina. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/4269/proctyl.htm> Acesso em 27/ago/2014

Pravastatina. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/detalhes /8307/interacoes_medicamentosas_pravastatina.htm> Acesso em 22/jul/2014

Praziquantel. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/conteudos/conteudo/2772/praziquantel.htm> Acesso em 22/jul/2014

Primidona. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/conteudos/medicamentos/1121/primidona.htm> Acesso em 22/jul/2014

Propanolol. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/4322/propranolol.htm> Acesso em 22/jul/2014

Riluzol. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/4530/rilutek.htm> Acesso em 20/jan/2014

Riluzol. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/detalhes/3357/interacoes_medicamentosas_metildopa.htm> Acesso em 23/jan/2014

Sais para Hidratação Oral. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/conteudos/conteudo/3111/sais_para_reidratacao_oral.htm> Acesso em 27/ago/ 2014

Sulfametoxazol + Trimetoprima. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/801/bactrim.htm> Acesso em 05/ago/2014

Sustrate®. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/4870/sustrate.htm> Acesso em 22/jul/2014

Tiotrópio. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/8335/tiotropio.htm> Acesso em 15/ago/2014

Xalatan. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/5494/xalatan.htm> Acesso em 14/jan/2014

MEDLEY INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. AMOXICILINA. Disponível em: <http://www.medley.com.br/portal/bula/amoxicilina_500mg_caps.pdf> Acesso em 25/out/2013

Cetoconazol. Disponível em: <http://www.medley.com.br/portal/bula/cetoconazol_comprimidos.pdf> Acesso em 14/nov/2013

Dexametasona. Disponível em: http://www.medley.com.br/portal/bula/dexametasona.pdf> Acesso em 11/dez/2013

Dipirona Monoidratada. Disponível em: <http://www.medley.com.br/portal/bula/dipirona_sodica_comprimidos.pdf> Acesso em 14/nov/2013

Mebendazol. Disponível em: <http://www.medley.com.br/portal/bula/mebendazol_comprimidos.pdf> Acesso em 20/ago/2014

Policresuleno + Cloridrato de Cinchocaína. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=10882592013&pIdAnexo=1917203> Acesso em 27/ago/2014

Pravastatina. Disponível em: <http://www.medley.com.br/portal/bula/pravastatina.pdf> Acesso em 22/jul/2014

MISODOR. Isossorbida. Disponível em: <http://www.misodor.com/FARMACON/ISOSSORBIDA%20DINITRATO.html> Acesso em 14/nov/2013

Sulfadiazina. Disponível em: <http://www.misodor.com/FARMACON/SULFADIAZINA.html> Acesso em 29/jul/2014

Tiotrópio. Disponível em: <http://www.misodor.com/FARMACON/TIOTROPIO.html> Acesso em 15/ago/2014

MONTENEGRO, C. A. et al. Análise de interações entre medicamentos e alimentos. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 11. 2008, João Pessoa. UFPB – PRG - 6CCSDFPMT01-P. Disponível em: <http://www.prac.ufpb.br/anais/xenex_xienid/xi_enid/monitoriapet/RESUMOS/Area6/6CCSDFPMT01-P.pdf> Acesso em 11/dez/2013

Nota Técnica a ABS N° 122/2012/ NUT/ CODAJUD/ CONJUR NUT/ CODAJUD/CONJUR NUT/ CODAJUD/ CONJUR MS. Brasília, maio de 2012. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/Abatacepte%20Orencia.pdf>

Nota Técnica a ABS N° 122/2012/ NUT/ CODAJUD/ CONJUR NUT/ CODAJUD/CONJUR NUT/ CODAJUD/ CONJUR MS. Brasília, maio de 2012. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/Abatacepte%20Orencia.pdf>

NOVARTIS BIOCIÊNCIA S. A. BRASIL. Sandimmun Neoral. Disponível em: <http://www.portal.novartis.com.br/UPLOAD/ImgConteudos/1774.pdf> Acesso em 14/nov/2013

Tofranil® Pamoato. Disponível em: <http://www.portal.novartis.com.br/UPLOAD/ImgConteudos/2247.pdf> Acesso em 22/jan/2014

OTIMIZE LTDA. Taliglucerase. Disponível em: <https://www.prescrevo.com/conteudo/bulas/bula_taliglucerase_portugues.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2014.

OTIMIZE LTDA. Tiamina. Disponível em: <https://www.prescrevo.com/conteudo/bulas/cloridratodetiamina.pdf> Acesso em 23/jul/2014

PIVATTO JÚNIOR, F.; BERNARDI, R. B.; BARROS, H. M. T. Interações Medicamentosas. In: BARROS, E.; BARROS, H.M.T. (Org). Medicamentos na prática clínica. São Paulo: Ed. ARTMED, 2010. p 101-116.

PORTAL EDUCAÇÃO – CONHECIMENTO PARA MUDAR SUA VIDA. Artigos Farmacologia – História das Drogas Antimuscarínicas. Disponível em: <http://www.portaleducacao.com.br/farmacia/artigos/46771/historia-das-drogas-antimuscarinicas>.Acesso em: 17 nov. 2013.

PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S. A. Rivotril. Disponível em: <http://www.dialogoroche.com.br/content/dam/dialogo/pt_br/Bulas/R/Rivotril/Bula-Rivotril-Paciente.pdf> Acesso em 22/nov/2013

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS – MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS. Medida provisória no 1.569-9, de 11 de novembro de 202. Disponível em:<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/dsra/protocolos/do_e15_06.pdf> Acesso em 31/jul/2014

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Toxina Tipo A de Clostridium Botulinum. Disponível em: http://dtr2001.saude.gov.br/sas/dsra/protocolos/do_d08_01.pdf Acesso em 31/jul/2014

SANOFI AVANTIS FARMACÊUTICA LTDA. Dextrotartarato de Brimonidina. Disponível em: <http://www.medley.com.br/portal/bula/dextrotartarato_de_brimonidina.pdf> Acesso em 19/nov/2013

SANOFI NO BRASIL. Medical Services. Amplictil. Disponível em: <http://www.medicalservices.com.br/meuconsultorio/bulas/bulas_f/Amplictil_Comp_IB130711.pdf> Acesso em 25/nov/2013

Hidróxido de Alumínio. Disponível em: <hhttp://www.sanofi.com.br/produtos/Notice_Pepsamar.pdf> Acesso em 22/jan/2014

SEIZI, O.; BASILE, A. C.; CARVALHO, M. F. Guia Zanini-Oga de Interações Medicamentosas. São Paulo: Ed. Atheneu; 2002. P. 186.

SHIRE FARMACÊUTICA BRASIL LTDA. Alfavelaglicerase. Disponível em: <http://www.shire.com.br/documents/VPRIV_Bula_Paciente.pdf> Acesso em 25/out/2013

SILVA, E. P.; FREITAS R. M. Vigabatrina: mecanismo de ação, efeitos farmacológicos, estudos clínicos e reações. Revista Eletrônica de Farmácia, v. 6, nº 3. 2009. Disponível em: http://www.revistas.ufg.br/index.php/REF/article/view/7593/5377. Acesso em 31/jul/2014

SILVA, M. M. Medicina Laboartorial, Terapia Medicamentosa e Tabelas de Referência. In. NELSON. Tratado de Pediatria. Ed. Richard E. Behrman. Rio de Janeiro, 2005. p. 2608. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=CcwFEyAXGR8C&pg=PA2608&lpg=PA2608&dq=%22+enzimas+pancreaticas%22+intera%C3%A7%C3%A3o+medicamentosa&source=bl&ots=xb9vAwmPgu&sig=OC_wOAnOoJrgSaltZ1AqDdXwwRI&hl=ptBR&sa=X&ei=jrvSUtmODsT5kQe79YD4Bg&ved=0CF4Q6AEwBg#v=onepage&q=%22%20enzimas%20pancreaticas%22%20intera%C3%A7%C3%A3o%20medicamentosa&f=false> Acesso em 24/nov/2013

TEVA UK LIMITED. AlfaD® Alfacalcidol. Disponível em: < http://www.tevauk.com/mediafile/id/12275.pdf> Acesso em 14/nov/2013

AlfaD®. Disponível em: <http://www.tevauk.com/mediafile/id/5737.pdf> Acesso em 25/jul/2014

TUA SAÚDE. Cloridrato de Dorzolamida (Cosopt). Disponível em: <http://www.tuasaude.com/cloridrato-de-dorzolamida-cosopt/> Acesso em 20/ nov/2013

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Guia de Interações Medicamentosas. Hospital das Clínicas. Goiânia. 2011. Disponível em: <http://www.hc.ufg.br/uploads/138/original_Guia_de_Interacoes_Medicamentosas.pdf> Acesso em 14/nov/2013

VALEANT FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA. Tolcapone. Disponível em: <http://www.medicinanet.com.br/bula/4924/tasmar.htm> Acesso em 31/ jul/2014

WIKIPÉDIA, A ENCICLOPÉDIA LIVRE. Antidepressivo Tricíclico. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Antidepressivo_tric%C3%ADclico>. Acesso em 21/nov/2013

WIKIPÉDIA, A ENCICLOPÉDIA LIVRE. Anti-inflamatório. Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Anti-inflamat%C3%B3rios_n% C3%A3o_esteroides> Acesso em 21/nov/2013

WIKIPÉDIA, A ENCICLOPÉDIA LIVRE. Portal de Farmácia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal:Farm%C3%A1cia> Acesso em 21/nov/2013

8

ANEXOS

ANEXO 1 - FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE REAÇÃO ADVERSA

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF

OSS / SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Unidade : _____

Ficha de Notificação de Reação Adversa a medicamento

1	Dados do paciente				
1.1	Nome completo				
1.2	Sexo	O masculino O feminino O Ignorado			
1.3	Número do CNS				
1.4	Peso (kg)				
1.5	Idade				
1.6	Gestante	O Sim O Não	Período de Gestação(meses)		

2	Dados inerentes ao estado de saúde do paciente			
2.1	Diagnóstico (Conclusivo - confirmação do médico solicitante)		CID-10:	
2.2	Hipótese diagnóstica (Quando não estiver formalizada pelo médico)			
2.3	História pregressa da doença atual			

3	Medicamentos utilizados pelo paciente							
	Nome do P.A	Dose	Via de administração	Data do início do uso	Data do término uso	Motivo do uso	Lote	Fabricante

4	Descrição da Reação Adversa a medicamento		
	Reação	Data de início da reação	Data do fim da reação

5	Descrição da RAM e evolução do quadro

6	Doenças concomitantes			
	Tabagismo	O Sim O Não		
	Etilismo	O Sim O Não		
	Doença crônica	O Sim O Não	Qual?	
	Possui histórico de alergia a algum medicamento?	O Sim O Não	Qual?	

7	Algoritmo - Relação causa e efeito	
	Score	

_____

Farmacêutico Responsável

Anexar o endereço da Unidade.

Exemplo :

Rua Leopoldo Miguez, 327 - Cambuci - São Paulo/SP. CEP. 01518-020

ANEXO 2 - FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DESVIO DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS - SES

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF

OSS / SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Unidade : _____

Ficha de Notificação de Desvios de Qualidade

1	Dados do notificador	
1.1	Nome:	_____
1.2	Nº de inscrição no CRF:	_____

2	Quebra técnica	
2.1	Nome do medicamento (P.A)	
2.2	Nome do fabricante	
2.3	Nº do lote	
2.4	Validade	
2.5	Forma Farmacêutica	

3	Descrição do desvio de qualidade

4	Rastreabilidade	
4.1	Nº do protocolo	
4.2	Data da notificação	

_____

Farmacêutico Responsável

Anexar o endereço da Unidade.

Exemplo :

Rua Leopoldo Miguez, 327 - Cambuci - São Paulo/SP. CEP. 01518-020

ANEXO 3 - FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DESVIO DE QUALIDADE DE MATERIAS E MEDICAMENTOS - SPDM

COMITÊ TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
OSS / SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº_____

RECEBIDO EM:_____

FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA INTERNA

Afiliado:	Unidade:	Data:

01. Complete com o produto para saúde ou medicamento envolvido (Preencher todos os campos)

Produto	CA	Apresentação	Lote	Validade	Nº de Registro do produto no M.S

Fabricante:		CNPJ:	
Fornecedor:		CNPJ:	

02. Descrição da Ocorrência (o que aconteceu)

Reportado por:	telefone/Email:

03. Possui amostra do desvio ☐ **SIM** ☐ **NÃO**
Possui foto da Amostra ☐ **SIM** ☐ **NÃO**
Amostra enviada ao CTQF ☐ **SIM** ☐ **NÃO**

04. Proposta/Resolução (Preenchimento exclusivo do CTQF)

05. Decisão Final (Preenchimento exclusivo do CTQF)

Data:	Responsável:

DÚVIDAS?
Entre em contato com a Equipe do CTQF.
Fone: (11) 3170 6335/3170 6157/3170-6162
E-mail: ctqf.afiliados@spdm.org.br

ANEXO 4 - LME

SUS

Sistema Único de Saúde
Ministério da Saúde
Secretaria de Estado da Saúde

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTO(S)

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO(S)

CAMPOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO MÉDICO SOLICITANTE

1-Número do CNES*

2- Nome do estabelecimento de saúde solicitante

3- Nome completo do Paciente*

5-Peso do paciente* kg

4- Nome da Mãe do Paciente*

6-Altura do paciente* cm

7- Medicamento(s)*		8- Quantidade solicitada*		
		1º mês	2º mês	3º mês
1				
2				
3				
4				
5				

9- CID-10*

10- Diagnóstico

11- Anamnese*

12- Paciente realizou tratamento prévio ou está em tratamento da doença?*

☐ SIM. Relatar:

☐ NÃO

13- **Atestado de capacidade***

A solicitação do medicamento deverá ser realizada pelo paciente. Entretanto, fica dispensada a obrigatoriedade da presença física do paciente considerado incapaz de acordo com os artigos 3º e 4º do Código Civil. O paciente é considerado incapaz?

☐ NÃO ☐ SIM. Indicar o nome do responsável pelo paciente, o qual poderá realizar a solicitação do medicamento

Nome do responsável

14- Nome do médico solicitante*

15- Data da solicitação* / /

17- Assinatura e carimbo do médico*

16- Número do documento do médico solicitante*

☐ CPF ou ☐ CNS

18 - **CAMPOS ABAIXO PREENCHIDOS POR*:** ☐ Paciente ☐ Mãe do paciente ☐ Responsável (descrito no item 13) ☐ Médico solicitante

☐ Outro, informar nome:_____ e CPF

19- Raça/Cor/Etnia informado pelo paciente ou responsável*

☐ Branca ☐ Amarela
☐ Preta ☐ Indígena. Informar Etnia: _____
☐ Parda ☐ Sem informação

20- Telefone(s) para contato do paciente

21- Número do documento do paciente

☐ CPF ou ☐ CNS

22- Correio eletrônico do paciente

23- Assinatura do responsável pelo preenchimento*

*** CAMPOS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**

ANEXO 5 - MODELO DE TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE

Termo de Consentimento Informado
Beclometasona, Budesonida, Fenoterol, Formoterol, Salbutamol, Salmeterol

Eu, _____ (nome do(a) paciente), abaixo identificado(a) e firmado(a), declaro ter sido informado(a) claramente sobre todas as indicações, contra-indicações, principais efeitos colaterais e riscos relacionados ao uso do(s) medicamento(s) beclometasona, budesonida, fenoterol, formoterol, salbutamol, salmeterol, preconizado(s) para o tratamento da **asma grave**.

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso o tratamento seja interrompido.

Os termos médicos foram explicados e todas as minhas dúvidas foram esclarecidas pelo médico_____(nome do médico que prescreve).

Expresso também minha concordância e espontânea vontade em submeter-me ao referido tratamento, assumindo a responsabilidade e os riscos por eventuais efeitos indesejáveis decorrentes.

Assim, declaro que:

Fui claramente informado(a) de que o(s) medicamento(s) pode(m) trazer os seguintes benefícios:

- alívio dos sintomas;
- melhora da função pulmonar;
- redução nas hospitalizações;
- redução nas visitas à emergência;
- melhora na qualidade vida;
- redução do risco de morte.

Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contra-indicações, potenciais efeitos colaterais e riscos:

- medicamentos classificados na gestação como:
  - **categoria B** (pesquisas em animais não mostraram anormalidades nos descendentes, porém não há estudos em humanos; risco para o bebê muito improvável): fenoterol
  - **categoria C** (pesquisas em animais mostraram anormalidades nos descendentes, porém não há estudos em humanos; o risco para o bebê não pode ser descartado, mas um benefício potencial pode ser maior que os riscos): beclometasona, budesonida, formoterol, salbutamol, salmeterol
- efeitos adversos podem ocorrer, de acordo com os diferentes medicamentos:
  - **beclometasona e budesonida:** podem ocorrer problemas na fala, que são reversíveis com a suspensão do tratamento, infecções na boca (candidíase), boca seca, alteração do paladar, irritação na garganta, tosse, infecções urinárias, inchaço, fadiga, cansaço, alergias de pele, palpitação, taquicardia, dor abdominal, vertigem, tontura, ganho de peso. Outros efeitos adversos mais raros incluem náuseas, vômitos, coceira, aumento da pressão intra-ocular, catarata, conjuntivite, glaucoma, agitação, depressão, insônia, faringite, sinusite, alteração do ciclo menstrual, diarréia ou constipação, febre, dores de cabeça, infecções virais, supressão da função hipotalâmica-pituitária-adrenal, redução da velocidade do crescimento em crianças, aumento dos níveis de glicose no sangue, reações de hipersensibilidade, sangramento anal e osteoporose (em caso de tratamento longo).
  - **fenoterol, formoterol, salbutamol e salmeterol:** os efeitos adversos mais comuns incluem ansiedade, agitação, insônia, náuseas, vômitos, dores abdominais, constipação, tonturas, dores de cabeça, diminuição dos níveis de potássio no sangue, tremores, palpitações, taquicardia, tosse, respiração curta, alergias de pele, alteração do paladar, secura da boca, dor muscular, reações alérgicas de pele.Também podem ocorrer fibrilação, angina, isquemia do miocárdio, aumento ou diminuição severa da pressão arterial, inchaço dos pés e mãos, cansaço, infecções do trato respiratório, falta de ar, insônia, depressão, dor de dente, alteração no ciclo menstrual e problemas de visão.

ANEXO 6- FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE PALIVIZUMABE

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Laudo para Solicitação de Palivizumabe
Prevenção do Vírus Sincicial Respiratório (VSR)

Identificação do Estabelecimento de Saúde (solicitante)		
NOME DO ESTABELECIMENTO:		
CNES:		
Identificação do Paciente		
NOME DO PACIENTE:		
ENDEREÇO:		
CEP:	**MUNICÍPIO:**	**UF: SP**
CNS:	**DATA DE NASCIMENTO:**	**SEXO: M ☐ F ☐**
NOME DA MÃE:		
TELEFONE: DDD ( )	**CELULAR: : DDD ( )**	
Informações Complementares		
IDADE GESTACIONAL POR OCASIÃO DO NASCIMENTO: semanas		
GESTAÇÃO: Única ☐ Múltipla ☐		
PESO DE NASCIMENTO: g	**ESTATURA DE NASCIMENTO:** cm	
TIPO DE PARTO: Normal ☐ Cesárea ☐ Fórceps ☐		
APGAR 1' :	**APGAR 5' :**	**DATA DA ALTA:**

Condições Atuais do Paciente

PESO ATUAL: g **ESTATURA ATUAL:** cm

- MENOR DE UM ANO DE IDADE, QUE NASCEU PREMATURO (IDADE GESTACIONAL MENOR OU IGUAL A 28 SEMANAS), APÓS ALTA HOSPITALAR: SIM ☐ NÃO ☐
- MENOR DE DOIS ANOS, PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR CRÔNICA DA PREMATURIDADE: SIM ☐ NÃO ☐

TERAPÊUTICA NOS ÚLTIMOS SEIS MESES:

Oxigênio	SIM ☐	NÃO ☐	Broncodilatador	SIM ☐	NÃO ☐
Diurético	SIM ☐	NÃO ☐	Corticóide inalatório	SIM ☐	NÃO ☐

- MENOR DE DOIS ANOS COM CARDIOPATIA CONGÊNITA CIANÓTICA: SIM ☐ NÃO ☐
- MENOR DE DOIS ANOS COM CARDIOPATIA E HIPERTENSÃO PULMONAR GRAVE OU EM TRATAMENTO PARA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA (ICC): SIM ☐ NÃO ☐

OBS: Além da entrega do xerox da certidão de nascimento, comprovante de residência e do cartão SUS:
- *para os pacientes prematuros anexar cópia xerox do relatório de alta hospitalar do berçário*
- *para os pacientes cardiopatas anexar cópia xerox do relatório médico com a descrição da cardiopatia, o grau de hipertensão pulmonar e os medicamentos utilizados.*

Solicitação		
NOME DO PROFISSIONAL SOLICITANTE:		
CRM:	**CPF:**	**E-MAIL:**
TELEFONE: DDD ( )	**CELULAR: DDD ( )**	

Data: _____
Assinatura e Carimbo

Autorização (para uso da SES)

☐ Autorizo a liberação do Palivizumabe para aplicação na Unidade Responsável do DRS
☐ Não autorizo a liberação do Palivizumabe
- ☐ Por não atender a critério estabelecido (Resolução SS 249 de 13/07/2007)
- ☐ Por falta de informações necessárias para análise da solicitação

Data: _____
Assinatura e Carimbo do Médico Autorizador

ANEXO 7 - FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE LEITE

FORMULAS INFANTIS ESPECIAIS
FICHA DE AVALIAÇÃO PARA FORNECIMENTO

(Deve ser preenchida pelo médico que acompanha a criança até o item E)

Data da primeira consulta:_____/_____/_____

A) Identificação:

a. Nome:_____ Data de nascimento: ____/____/_____

Nome da mãe:_____CNS do paciente: _____

b. Nome do profissional:_____

c. Nome da instituição:_____ **CNES:**_____

d. Solicitação: _____ Quantidade/mês: _____

CID: _____ **DIAGNÓSTICO:**_____

B) Sinais e sintomas clínicos presentes:

	Idade inicial	Tempo latência	Duração	Freqüência	Ultimo episódio	Tratamento recebido
Sintomas cutâneos						
( ) urticária						
( ) prurido						
( ) rush						
( ) angioedema						
( ) dematite						
Sintomas gastrintestinais						
( ) dor abdominal						
( ) diarréia						
( ) constipação intestinal						
( ) vômito/ náusea						
( ) distensão abdominal						
( ) flatulência						
( ) sangue nas fezes						
( ) refluxo						
Sintomas respiratórios						
( ) broncoespasmo						
( ) tosse						
( ) prurido orofaringe						
( ) rinite e coriza nasal						
( ) edema de laringe						
Outros						
( ) anafilaxia						
( ) cefaléia						
( ) edema labial						
( ) otite						
( ) edema ocular						

* Tempo necessário entre a ingestão do alimento e o aparecimento dos sintomas

Especifique os sintomas mais exacerbados

_____

_____

_____

C) Exames subsidiários realizados (mais recentes):

Tipo		Data	Resultado
Hipersensibilidade			
( ) Sim ( ) Não	Prick-test leite de vaca		
( ) Sim ( ) Não	Prick-test soja		
( ) Sim ( ) Não	RAST leite de vaca		
( ) Sim ( ) Não	RAST alfa-lactoalbulina		
( ) Sim ( ) Não	RAST beta-lactoglobulina		
( ) Sim ( ) Não	RAST caseína		
( ) Sim ( ) Não	RAST soja		
Avaliação gastrointestinal			
( ) Sim ( ) Não	Sangue oculto		
( ) Sim ( ) Não	Alfa-1 antitripsina fecal		
( ) Sim ( ) Não	Relação albumina/globulina		
Anatomopatológico			
( ) Sim ( ) Não	Estômago		
( ) Sim ( ) Não	Esôfago		
( ) Sim ( ) Não	Duodeno		
( ) Sim ( ) Não	Reto		
Outros	**Provocação**		

D) Avaliação da condição nutricional:

a. Peso: _____ kg

b. Estatura: _____ cm

c. Criança no percentil de peso inferior a 10: ( ) Não ( ) Sim

d. Desaceleração da curva de peso: ( ) Não ( ) Sim. Há quanto tempo? _____

Caso **SIM** anote os últimos pesos e datas:

1. Data: ____/____/_____ Peso: _____ kg
2. Data: ____/____/_____ Peso: _____ kg
3. Data: ____/____/_____ Peso: _____ kg

DATA:____/____/____	**CNS / MÉDICO RESPONSÁVEL**
Carimbo:	**CPF / MÉDICO RESPONSÁVEL**
	_____ **Assinatura**

F) Conduta: (uso restrito a SES-SP)

a. ( ) No momento, não preenche os critérios

b. ( ) Liberado o fornecimento de fórmula especial de _____ latas, por _____ (meses):
(quantidade)

( ) Proteína isolada de soja
( ) Fórmula extensamente hidrolisada
( ) Fórmula de aminoácidos

c. Data do retorno: _____/_____/_____ Previsão do teste de provocação: _____/_____/_____

Avaliador: _____
Assinatura e carimbo

ANEXO 8 - FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ARIPIPRAZOL

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Formulário de Solicitação do Aripiprazol

CID Principal:_____**CID Secundário**_____

Identificação do Estabelecimento de Saúde (solicitante)		
NOME DO ESTABELECIMENTO:		
CNES:		
Identificação do Paciente		
NOME DO PACIENTE:		
ENDEREÇO:		
CEP:	**MUNICÍPIO:**	**UF:**
CNS:	**DATA DE NASCIMENTO:** / /	**SEXO: M ☐ F ☐**
NOME DA MÃE:		
TELEFONE:	**CELULAR:**	

Informações Complementares		
Diagnóstico		
↑ CID 10 - F20		
Motivo da solicitação:	↑ Efeito colateral ☐	↑ Falha terapêutica ☐
Antipsicóticos usados anteriormente:		
Qtdd.prescrita/mês	**Medicamento**	**Qtdd. dispensada**
	Aripiprazol 15mg - Comprimido	
	Aripiprazol 20mg - Comprimido	
	Aripiprazol 30mg - Comprimido	
Solicitação		
NOME DO PROFISSIONAL SOLICITANTE:		
CRM:	**CPF:**	**CNS:**
TELEFONE:		
DATA:	Assinatura e Carimbo	
Autorização (para uso da SES)		
Data: / /	**CNS / médico autorizador:**	
Carimbo:	CPF / médico autorizador:	
	Assinatura:	

RECIBO

Data: / /	**Assinatura do paciente / responsável:**	

ANEXO 9 - LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Laudo para Avaliação de Solicitação de Medicamento por Paciente de Instituições Públicas ou Privadas

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo:			
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino		Data de nascimento: _____ / _____/_____	
CPF:	RG:	CNS:	
Endereço:			Nº
Complemento:	Bairro:		
Município:		UF: SP	CEP:
Telefone (s): ( )			
E-mail:			
Possui Plano de Saúde: ( ) Não ( ) Sim. Qual: _____			

2. INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA

2.1 Doença Principal:	*CID:*
Há quanto tempo:	
Outro (s) Diagnóstico (s):	*CID (s):*
2.2 Casos Oncológicos: • Anexar cópia do anatomopatológico e, quando aplicável, PSA ou imunohistoquímica.	
Informar o estadiamento clínico TNM quando aplicável:	
2.3 Informar datas e resultados dos exames complementares relevantes (anexar cópia):	

3. AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO

3.1 Informar os tratamentos já realizados em ordem cronológica:

3.2 Descrever o atual planejamento terapêutico:
3.3 Informar a meta terapêutica proposta:
3.4 Informar como se dará o acompanhamento da resposta terapêutica e a frequência de avaliação:
4. MEDICAMENTO SOLICITADO
Denominação genérica / Dosagem:
Via da administração / Posologia / Duração do tratamento:
Peso: Altura:

5. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E MÉDICO SOLICITANTE			
Nome da instituição de saúde:			
CNES:			
Endereço:			Nº
Complemento:	Bairro:		
Município:		UF: SP	CEP:
Telefone (s): ( )			
Nome do médico:			
CPF:	CRM Nº:		UF:
E-mail:			

Data: _____ / _____ / _____

Assinatura e carimbo do médico prescritor

Assinatura e carimbo do Diretor/ Responsável da Instituição

Assinatura do paciente ou responsável

7. USO RESTRITO DA SES/SP

ANEXO 10 - LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Laudo para Avaliação de Solicitação de Nutrição Enteral por Paciente de Instituições Públicas ou Privadas

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo:			
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino		Data de nascimento: _____ / _____/_____	
CPF:	RG:	CNS:	
Endereço:			Nº
Complemento:	Bairro:		
Município:		UF: SP	CEP:
Telefone (s): ( )			
E-mail:			
Possui Plano de Saúde: ( ) Não ( ) Sim. Qual: _____			

2. INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA

2.1 Doença Principal:	CID:
Há quanto tempo:	
Outro (s) Diagnóstico (s):	CID (s):
2.2 Casos Oncológicos:	• Anexar cópia do anatomopatológico e, quando aplicável, PSA ou imunohistoquímica.
Informar o estadiamento clínico TNM quando aplicável:	
2.3 Informar data e resultados da realização dos exames complementares relevantes (anexar cópia):	

2.4 Assinalar o agravo que justifica a indicação da terapia nutricional:

( ) Afagia / Disfagia por alteração mecânica da deglutição ou trânsito digestivo.
( ) Afagia / Disfagia por doença neurológica.
( ) Transtorno de motilidade intestinal.
( ) Síndrome de má absorção.
( ) Desnutrição moderada à grave.
( ) Outro(s): _____

3. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL

Peso: Atual ( ) Estimado ( )	Peso há 6 meses:	IMC:
Altura: Atual ( ) Estimado ( )	Perda de peso nos últimos 6 meses: %	
Circunferência do braço:	Prega cutânea triciptal:	

Possui úlcera por pressão? ( ) Sim ( ) Não

Locais: Grau:

Observações complementares:

3.1 Para crianças - Curvas de crescimento (especificar percentis):

P/I: E/I: P/E:

4. ADMINISTRAÇÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL

4.1 Tipo de vias de administração da alimentação:

( ) VO (Crianças) ( ) TNE + VO ( ) TNE exclusiva ( ) TNE + NPP

4.2 Via de acesso:

Por Sonda: ( ) Nasogástrica ( ) Nasoduodenal ( ) Nasojejunal
Por Estomia: ( ) Gastrostomia ( ) Jejunostomia

4.3 Caso não utilize estomia para alimentação, justificar:

4.4 Nutrição enteral utilizada:

Denominação Genérica	Posologia	Tempo de tratamento

5. TIPO DE FÓRMULA SOLICITADA

A - Fórmula padrão para lactentes:

( ) Polimérica até 06 meses de idade (de partida)

( ) Polimérica maiores de 06 meses de idade (seguimento)

B - Fórmula padrão (isenta de sacarose):

( ) Normocalórica, normoproteica

( ) Hipercalórica, hiperproteica

C - Fórmula especializada para lactentes:

( ) Elementar ( ) Metabólica

( ) Semielementar

D - Fórmula especializada:

( ) Elementar

( ) Semielementar

6. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E MÉDICO SOLICITANTE			
Nome da instituição de saúde:			
CNES:			
Endereço:			Nº
Complemento:	Bairro:		
Município:		UF: SP	CEP:
Telefone (s): ( )			
Nome do médico:			
CPF:	Nº CRM:		
E-mail:			

Data: _____ / _____ / _____

_____ Assinatura e carimbo (Nutricionista)

_____ Assinatura e carimbo (Médico)

_____ Assinatura e carimbo do Diretor/ Responsável da Instituição

_____ Assinatura do paciente ou responsável

7. USO RESTRITO DA SES/SP